

ليركاپرس ١٠ ليركاپرس ٢٠ أقراص مطلية

التركيب:

كل قرص من ليركاپرس ١٠ يحتوي على:

ليركانيديبين هيدروكلوريد ١٠ ملغ

Lercanidipine hydrochloride 10 mg

كل قرص من ليركاپرس ٢٠ يحتوي على:

ليركانيديبين هيدروكلوريد ٢٠ ملغ

Lercanidipine hydrochloride 20 mg

لائحة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦ «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.
هذا الدواء غير مخصص عادة للاستعمال لدى الأطفال والمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل الدواء لعلاج ضغط الدم المرتفع.

الفصيلة العلاجية: حاجب قنوات الكالسيوم من مشتقات ديهيدروبيبريدين.

٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergic) لليركانيديبين، لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦: «معلومات إضافية») أو لأدوية أخرى من هذه الفصيلة مثل أملوبيبين، نيكارديبيين، فيلوديبين، إيسراديبين، نيفيديبيين أو لاسيديبيين.
- لا تستعمل الدواء إذا كنت في فترة الحمل، تخططين للحمل، كنت في سن الخصوبة ولا تستعمل وسائل منع حمل ملائمة أو كنت في فترة الرضاعة.
- كنت تعاني من أمراض قلبية معينة: فشل قلبي خارج عن السيطرة، إعاقة في جريان الدم من القلب، ذبحة صدرية غير مستقرة (ذبحة صدرية أثناء الراحة أو تزداد تدريجياً) ولم ينضي شهر من التوبة القلبية.
- كنت تعاني من مرض شديد في الكبد أو الكلى.
- كنت تتناول بالتزامن: سيكلوسبيورين، أدوية مضادة للفطريات مثل كيتوكونازول أو إيتراكونازول، مضادات حيوية من فصيلة ماكروليدات مثل إريتروميسين أو ترولاندوميسين، أدوية مضادة للفيروسات مثل ريتونافير.
- كنت تستهلك الچريفون أو شراب الچريفون.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا.

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص واحد من

ليركاپرس ١٠ في اليوم.

إذا دعت الحاجة من شأن الطبيب أن يزيد الجرعة الدوائية إلى

قرص واحد من ليركابرس ٢٠ في اليوم.
لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب تناول الدواء في نفس الساعة كل يوم. يجب بلع القرص مع القليل من الماء، يستحسن في الصباح ١٥ دقيقة على الأقل قبل تناول وجبة الصباح. يمكن شطر أو سحق القرص للإستعمال الفوري.

الدواء غير مخصص عادة للأطفال وللمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

فحوصات ومتابعة

يجب إجراء فحوصات ضغط الدم، التخطيط الكهربائي للقلب ونظم القلب أثناء فترة العلاج بهذه الدواء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، عليك التوجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء معك. إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر قد تظهر العلامات التالية: إنخفاض كبير جداً في ضغط الدم، نظم قلب غير منتظم أو سريع، فقدان للوعي.

لا تسبب التق�ؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يجب تناول جرعة دوائية حالاً عند تذكرك بذلك، لكن إذا اقترب موعد تناول الجرعة الدوائية التالية فقم بتفويت الجرعة الدوائية المنسية وتتناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت. لا يجوز في أي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائين معاً.

حتى ولو طرأ تحسن على حالي الصحية لا يجوز التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ بدون إستشارة الطبيب، إذا توقفت عن إستعمال الدواء قد يرتفع ضغط دمك ثانية.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ليركابرس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً عند ظهور:

إنفاس في الكاحلين أو الرجلين، ضربات قلب سريعة (خفقان)، آلام عضلية، ذبحة صدرية، زيادة في حجم أو و蒂رة التبول (نادرًا): تضخم اللثة، هبوط ضغط الدم، ألم في الصدر (نادر جداً): إغماء ورد فعل تحسسي (قد تظهر أعراض مثل: حكة، طفح، شرى).

بلغ في حالات نادرة بأن أدوية أخرى من هذه الفصيلة تسبب تضخماً في اللثة. لدى مرضى يعانون من ذبحة صدرية، فإن أدوية أخرى من هذه الفصيلة قد تزيد من وتيرة، فترة أو شدة التوبات. تم ملاحظة حالات منفردة لإحتشاء عضلة القلب. في حال قاسيت من إحدى تلك المشاكل عند إستعمال ليركابرس، يجب إبلاغ الطبيب حالاً.

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠ - ١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠): صداع؛ دوار؛ تبض سريع؛ ضربات قلب؛ أحمرار مفاجئ للوجه، الرقبة أو الصدر.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى ١٠ - ١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠): إضطرابات في الجهاز الهضمي تشمل صعوبات في الهضم، حرقة، إسهال، غثيان، تقيؤ وألم في البطن؛ الميل إلى النوم؛ ضعف؛ إرهاق؛ طفح؛ زيادة في التبول؛ ألام عضلية.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقىؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين الدواء دون ٢٥ درجة مئوية في مكان محمي من الضوء.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا:

Microcrystalline cellulose, Lactose, Sodium starch glycollate, Povidone, Magnesium stearate, Opadry white Y-1-7000, Opadry yellow OY-6478.

يحتوي كل قرص من ليركابرس ١٠ على:
ما يقارب ٣٩ ملغ لكتوز وما يقارب ٥ ملغ صوديوم.

يحتوي كل قرص من ليركابرس ٢٠ على:
ما يقارب ٧٨ ملغ لكتوز وما يقارب ١ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ليركابرس معبأً ضمن لوحيات (بليستر) حيث يتم إدخالها إلى داخل علبة كرتون. في كل علبة من ليركابرس يوجد ٣٠ قرصاً.

ليركابرس عبارة عن أقراص مطلية، مستديرية، محدبة من كلا الجانبين، لونها أصفر، مع شق للشطر من جانب واحد.

إسم صاحب الإمتياز وعنوانه: يونيفارم.ض.، ص.ب. ٢١٤٢٩
تل . أبيب ٦١٢١٣٠١.

إسم المنتج وعنوانه: تريما.ض.، كيبوتيس معبروت.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فحص ورخص في تاريخ: آب ٢٠١٤

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ليركابرس ١٠ : ٤١٠ - ٥١ - ٣١٨٤٨
ليركابرس ٢٠ : ١٤٣ - ٦٧ - ٣٢٩٧٥ - ٠٠٠

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.