

וגירוד: הפסיק/י הטיפול וכנהו/י לרופא, בכל מקרה שבו הין מריש/ה תופעת לואוי שלא צוין בדוחן, אך גם חל שנייה בהגשהן הכלילית עליך להתייעץ עם הרופא מדי.

**תופעות לואוי ותגובה בין תרופות:**  
על ההורים לדוחו לרופא המטפל על כל תופעת לואוי וכן על כל תרופה נוספת נספת הנינית בלבד/ה!

**מנון:**  
מנון לפי הוראות הרופא בלבד.  
אם לא חל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש לפנות לרופא.

יש להשתרש בתרופת זו בזמןים קצרים כפ"י שנקבע ע"ד הרופא המטפל.

**שים, ל'ב:**  
לא לצלעינו תרופה זו מיועדת לשימוש לאוזניים בלבד.

**אפקט השם:**  
רחני/ידי. שבבי או הטה/אי את ראשך כך שהאוזן המטופלת תפונה כלפי מעלה.

בחוליות מוגבר: אוחז/בי באפרכסת והטה/י מעת לעמלה ואחרורה, כדי לישר את תעלת האוזן.

בילדים: אוחז/בי באפרכסת והטה/י מעת למיטה ואחרורה, כדי לישר את תעלת האוזן.

טפסון/ה הרופאה על רען האוזן והשאר במצב שקבוע לפחות מספר דקות, כדי לאפשר לרופאה להגעה לפנים האוזן.

למיניטות ייחומי: קנדף/שיפוי קרבוקן או קצה המזולף לא גע בשום שטח (כולל יגנו/מי ובפתח נייר נקייה וסגורו/ המיל היבט).

אל תרחקו/ המלמד!/יגנו/מי/בגנו/מי/בגנו/מי נקייה וסגורו/ המיל היבט.

### [כיצד תכלך לסייע להצלחת הטיפול?]

על להליכים את הטיפול שוחמלן על-ידי הרופא.

גם חל שיפור נרחב בידי אורתן או להפסיק הטיפול בתרופה

לאו התייעץ עם רופא.

**מניעי הרעלנה:**

תרופה זוigel רופאה אחרת יש לשמר במקום סגור לחישג ידים של ילודים/או תאנקוט ועל-ידי תר. תמן/ה הרעלנה.

אם נסלת מנת יתר או אם בסעות בול/יל/ה מן התרופה, פנה/י מיד לחדר רפואי פון להקהן לא הרופאה.

אין להרים להקהן לא הרופאה או רשותה לשלב בחלמות, במקרה של קרבובן, שנרכן או מרכן.

אין לטלול תרופות בחשונו שיש לבזק התיוות והכמה בכל פעם שהוקן נסולט תרופה יש להרכיב משקפים אם הין דירקוק/ה להם.

**אחסנה:**  
אתoxicין ניתן מתחת ל- 25°C. אין לשמר במקורה.

חי מdry לאחר פתיחת התכשיר: חדשיים. גם מdry לאחר כביסה המומלכיזם, תרופות נשמרות לתרופת מוגבלת בלבד. אן לשם לב לאירוע התפונה של התכשיר. בכל מקרה של ספק, על להזיזו ברקח שספק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באוויה אריהה.

**מס' רישום תרופה:** 1586.24749.

**ישראל:** תרכז תעשייה רוקחים בע"מ,

ת.ד. 10347. מפרט חיפה 2624761.

74306.0315

קראי/ בעין את העלון עד סוף בטרכם תשתמש/י בתרופה  
פומרט עלון הרקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר על ידי

**אוטומיצין®**

טיפול אוזניים

**הרכב:**

Neomycin (as sulphate)	0.35%
Phenylephrine HCl	0.25%
Sodium propionate	5.00%
Benzocaine	3.00%

חומרם בלתי פעילים:

Purified water, propylene glycol, PEG 400, glycerin, benzyl alcohol, propionic acid, sodium metabisulphite

**קבוצה תרפואיית:**

זה אנטימיקובי מסוכ אמינוולוקוז (as sulphate)

זה חורס סיפטומיטי (HCl)

זה אנטיפיריטרי (Sodium propionate)

זה מאלחש מוקמי (Benzocaine)

**פניות:**

טיפול מוקמי בלבד/קט באוזן החיצונית ובאזור התיכון ממוקם חיידי/ או פסורי.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש בתרופה זו אם יש נזק בוור התווך.  
אל להשתמש/ בתרופה אם דועה ולר גשות לאחד מרכיביה.

**אי להשתמש בתרופה מבל להיעוץ בפומping התחלת**  
**הטיפול:**

אם הנר ברוון או מינקה.  
אם הנר סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקיד: הכליה/מערכת השתן, מחולות באבר השמיעה.

**אזהרות:**

אין להשתמש בתרופה זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת בלבד/הורשע ברופא. אם הנר רגש/ה לוון לשחו או לתרופה כלשהו, עליך להודיע על-כך לרופא לפני טיפול התרופה.

**תגובה בין-תרופתיות:**

אם הנר נסולט/ת לרופאה, או אם גרתת זה עתה טיפול בהרופה אחרת עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנגע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובה בין-תרופתיות.

**תופעות לויאן:**

בוסף לפועלות הרווחה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע התופעות לאין כוון: הרגשות הקשצין או צריבה.  
תופעות אלו כוללות בדרכן-כללו תון מין קוצר לאחר תקופת ההסתגלות לתשיש.

**תגובה המחייבת התיחסות מיוחדת:**  
סימנים המעידים על ריגושת לתרופה כמו אDEMוויות, פריחה בעור

