

**Инструкция по применению
в соответствии с
Фармацевтическими
Стандартами (препараты) - 1986**

Препарат отпускается без
рецепта врача

Тамс Смутис ЕХ со вкусом лесных ягод

Жевательные таблетки

Каждая таблетка содержит 750 мг
карбоната кальция
(300 мг элементарного кальция)
Calcium Carbonate 750 mg
(elemental calcium 300 mg)

Кислотонейтрализующая
способность одной таблетки:
15 mEq.

Список дополнительных веществ
приводится в разделе 6.

**Внимательно и полностью
прочтите данную инструкцию
перед применением препарата.**
Данная инструкция содержит
основные сведения о
препарате. Если у Вас имеются
дополнительные вопросы,
обратитесь к врачу или к
фармацевту.

1. Для чего предназначен препарат?

Для облегчения изжоги и
желудочной кислотности.

Фармакологическая группа:
Антациды.

2. Перед применением препарата

Не применять препарат:

- Если у Вас имеется повышенная чувствительность (аллергия) к карбонату кальция или к какому-либо из дополнительных веществ, содержащихся в препарате (подробности в разделе 6)
- Пациентам с повышенным содержанием кальция в крови (гиперкальциемия) или в моче (гиперкальциурия)
- Пациентам, соблюдающим диету с низким содержанием фосфатов
- Пациентам с нарушением функции паращитовидной железы
- Пациентам с заболеванием почек (таким, как камни в почках)
- Пациентам с синдромом Золлингер-Элисона
- Пациентам с заболеванием сердца, принимающим дигоксин.

Не применять препарат без консультации врача перед началом лечения:

- детям до 12 лет
- если Вы страдаете сахарным диабетом (препарат содержит сахар).

Если Вы принимаете или недавно
принимали другие препараты,
включая препараты, отпускаемые
без рецепта врача, и пищевые
добавки, сообщите об этом врачу
или фармацевту. В особенности,
если Вы принимаете:

диуретики типа тиазидов,
бисфосфонаты для лечения
остеопороза, тетрациклины и
ципрофлоксацин (антибиотики).
Рекомендуется соблюдать
интервал в 2-3 часа между
приемом данного препарата и
приемом других пероральных
препараторов.

Беременность и кормление грудью

Посоветуйтесь с врачом или
фармацевтом перед применением
препарата. См. раздел 3 «Принятая
дозировка».

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

- Препарат содержит сахар. Если Ваш врач уведомил Вас о непереносимости Вами некоторых сахаров, обратитесь к Вашему врачу перед приемом данного препарата.
- Препарат содержит сою. Если у Вас есть аллергия на сою, не применяйте данный препарат.

3. Как следует применять препарата?

Посоветуйтесь с врачом или
фармацевтом, если Вы не
уверены.

Принятая дозировка для взрослых и детей старше 12 лет:

Разжевывать по 2-4 таблетки при
возникновении симптомов, или в
соответствии с рекомендациями
врача.

Не принимайте более 10 таблеток
в течение 24 часов.

Если Вы беременны, не
принимайте более 6 таблеток в
течение 24 часов.

Не применяйте максимальную дозу
более двух недель, кроме как по
рекомендации и под наблюдением
Вашего врача.

Не применяйте препарат, если
симптомы продолжаются более
двух недель, кроме как по
рекомендации врача.

Не превышайте рекомендуемую дозу

Препарат не предназначен детям
младше 12 лет.

Если Вы приняли избыточную дозу
или ребенок по ошибке проглатил
препарат, немедленно обратитесь
к врачу или в приемное отделение
больницы и возьмите с собой
упаковку препарата.

Не принимайте препараты в темноте!
Каждый раз при применении
препарата проверяйте этикетку и
дозировку. В случае необходимости
пользуйтесь очками.

Если у Вас имеются
дополнительные вопросы
относительно применения
препарата, посоветуйтесь с
врачом или фармацевтом.

4. Побочные явления

Как и при лечении любым
лекарством, применение Тамса
может вызывать побочные явления
у части пациентов. Не тревожьтесь
при чтении списка побочных
явлений. Возможно, Вы не будете
страдать ни одним из них.

Побочные явления включают:
запор, метеоризм, тошноту,
отрыжку.

Если появилось побочное
явление, если одно из побочных
явлений становится более
выраженным, или Вы страдаете
от побочного явления, не
упомянутого в данной инструкции,
Вам следует посоветоваться с
врачом или фармацевтом.

5. Как следует хранить препарат?

- Избегайте отравления! Этот
препарат, как и любой другой,
надлежит хранить в закрытом,
недоступном для детей и/или
младенцев месте, и вне поля
их зрения, во избежание
отравления. Не вызывайте
рвоту без получения точных
указаний врача.

- Не применяйте препарат по
истечении срока его годности
(exp. date), указанного на
упаковке. Датой истечения срока
годности является последний
день указанного месяца.

- Хранить при температуре ниже
+25°C.

6. Дополнительная информация

- В дополнение к активному веществу, препарат также содержит:
Sorbitol, dextrose monohydrate, sucrose, microcrystalline cellulose, magnesium stearate, natural and artificial flavors, corn starch, guar gum, maltodextrin, adipic acid, red 40 (E140) lake, blue 1 lake.
- Как выглядит препарат и каково содержимое упаковки – пластиковый флакон, содержащий 12, 60 или 72 жевательные таблетки. Флакон закрыт внутренней пленкой и крышкой.

Возможно, что не все размеры упаковок будут в продаже.

- Владелец лицензии:
ГлаксоСмитКлейн (Израиль) Лтд.,
Ул. Базель 25, Петах Тиква.
- Производитель:
ГлаксоСмитКлейн Консьюмер
Хелскейр Л.Р., Сент Луис,
США.
- Данная инструкция проверена
и утверждена Министерством
Здравоохранения в Ноябре
2014 года.
- Регистрационный номер
препарата в Государственном
Реестре лекарственных
средств Министерства
Здравоохранения: 143-86-
32015