



152316 R4

פורמט עלון זה נקבע על ידי משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על ידי
לשימוש וטרינרי בלבד
על פי מרשם רופא וטרינר

Engemycin 10% LA Veterinary
Solution for injection

אנגמיצין LA 10% וטרינרי
תמיסה להזרקה

הרכב:

כל 1 מ"ל מכיל חומר פעיל:
Oxytetracycline (as hydrochloride) 100 mg
חומר משמר:
Sodium formaldehyde sulphonylate 5 mg

תמיסה מימית שקופה צהובה להזרקה.

התוויות לשימוש:

לטיפול במחלות זיהומיות הנגרמות על ידי אורגניזמים הרגישים לאוקסיטטריצקלין בבקר, צאן, חזירים, סוסים, כלבים וחתולים.
In vitro - אוקסיטטריצקלין הינה אנטיביוטיקה בעלת תחום פעילות רחב כנגד מיקרואורגניזמים גרם חיוביים וגרם שליליים הכוללים:

Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Listeria monocytogenes, P. haemolytica, Haemophilus parahaemolyticus, Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila abortus.
הגורמת להפלות אנזואוטיות בכבשים -

התוויות נגד:

אין להשתמש אם יש אלרגיה (רגישות יתר) לחומר הפעיל.
אין לתת לסוסים המטופלים באותו הזמן בקורטיקוסטרואידים.

אזהרות מיוחדות לשימוש בבע"ח:

בכל מתן של תרופה מקבוצת הטטראציקלינים, יש להפעיל שיקול דעת וזהירות בטיפול בסוסים בזמן עקה (סטרו).
יש לנקוט בזהירות בטיפול בבע"ח הסובלים מפגיעה כבדית או כיליתית.
אין לתת במתן תוך ורידי בכלבים וחתולים.

אזהרות מיוחדות לבני אדם המזריקים את התרופה לבע"ח:

הרחק מהישג ידם של ילדים.
לשימוש בבע"ח בלבד.
יש להיזהר מהזרקה עצמית בשוגג.
במקרה של מגע עם העיניים או העור, יש לשטוף במיידית בכמות מים גדולה, מכיוון שעלול להיגרם גירוי בעיניים.
יש לשטוף ידיים לאחר השימוש בתרופה.

תופעות לוואי:

נפיחות זמנית באזור ההזרקה עלולה להופיע בסוסים לאחר מתן תוך שרירי, ובכלבים לאחר מתן תת עורי.
רגישות לאור (פוטוסנסיטיביות) עלולה להתרחש לאחר טיפול, במידה ויש חשיפה לקרינת שמש גבוהה.

שימוש במהלך הריון והנקה:

שימוש בטטראציקלינים במהלך התפתחות העצמות והשיניים של העובר כולל סוף ההריון עלול לגרום לשינויי צבע של השיניים והעצמות.

תגובות בין תרופתיות:

לא מומלץ לטפל באנטיביוטיקות בקטריוסטטיות יחד עם אנטיביוטיקות בקטריוצידיות בו זמנית.
מיהול במלחי סידן אינו מומלץ מכיוון שעלול לגרום להיווצרות קריסטלים.

מינון ודרך המתן:

משטר מינון המיועד למתן 24 שעות:

- המינון המומלץ הינו 3-8 מ"ג/ק"ג משקל גוף (תלוי בגיל וסוג בע"ח- על פי הטבלה), באמצעות הזרקה:
- תוך שרירית או תוך ורידית בחיות גדולות.
 - תת עורית או תוך שרירית בחיות קטנות.
 - ניתן לחזור על הטיפול כל 24 שעות עד 4 פעמים (5 טיפולים סה"כ).
- במתן תוך ורידי ההזרקה תבוצע באיטיות במשך דקה אחת לפחות.

משטר מינון המיועד למתן לטווח ארוך:

המינון המומלץ הוא 10-20 מ"ג/ק"ג משקל גוף, תלוי בגיל וסוג בע"ח (ראה טבלה), באמצעות הזרקה תוך שרירית בלבד.
ניתן לחזור על הטיפול פעם אחת בלבד לאחר 48-60 שעות במידת הצורך.
מינון זה אינו מומלץ בסוסים, כלבים או חתולים.



טבלת מינונים 10% Engeymycin

משקל	בעל חיים	מינון להזרקה ל-24 שעות פעם ביום**	מינון לטווח ארוך (הזרקה תוך שרירית) *10-20 mg/kg
500 kg	סוסים	25.0 ml	לא מומלץ
500 kg	פרות	15.0 ml	50.0 ml
100 kg	עגלים	8.0 ml	20.0 ml
50 kg	חזירים	4.0 ml	10.0 ml
50 kg	כבשים	4.0 ml	10.0 ml

* במידת הצורך להזריק שנית אחרי 2-3 ימים.
** לא יותר מ-5 טיפולים.

טיפול מניעתי בהפלות אנזואוטיות בכבשים:

המינון המומלץ הוא 20 מ"ג/ק"ג משקל גוף הניתן ביום 95-100 להיריון. אפשר לתת טיפול נוסף 2-3 שבועות לאחר מכן.
טרם המתן יש לנקות את אזור ההזרקה ולנגב באלכוהול.
הכמות המקסימלית המומלצת של מנה להזרקה באזור אחד הינה 20 מ"ל לבקר, ו-10 מ"ל לכבשים וחזירים.
יש להזריק מנות נוספות כל פעם באזור שונה ויש לעסות היטב כל אזור הזרקה לאחר המתן של התרופה.

מינון יתר:

לאוקסיטטרצקלין רמת רעילות נמוכה אך עם זאת הינו חומר מגרה, יש להימנע ממנת יתר במיוחד בסוסים. אין טיפול מומלץ.

זמני המתנה:

במשטר מינון ל-24 שעות:

חלב בקר: 48 שעות, מהטיפול האחרון.
בשר בקר: 8 ימים, מיום הטיפול האחרון.
חלב כבשים: 48 שעות, מיום הטיפול האחרון.
בשר כבש: 8 ימים, מהטיפול האחרון.

במשטר מינון לטווח ארוך:

חלב בקר: 72 שעות, מהטיפול האחרון.
בשר בקר: 10 ימים, מיום הטיפול האחרון.
חלב כבשים: 48 שעות, מהטיפול האחרון.
בשר כבש: 10 ימים, מיום הטיפול האחרון.

חומרים בלתי פעילים:

Sodium Formaldehyde Sulphoxylate, Magnesium Oxide Light, Povidone 12 PF, Monoethanolamine, Water for Injection

חיי מדף:

לאחר הפתיחה הראשונה של התרופה יש להשתמש בה בתוך 28 ימים.

אחסון:

יש לאחסן בטמפ' מתחת ל-25°C, אין להקפיא. יש להגן מפני אור.
שמור את המיכל באריזתו הייצוגית.

אריזה:

בקבוקי זכוכית סוג II או פוליאתילן (PET) סגורים במכסה גומי ובכיסוי אלומיניום מוצפן. בתכולה של 100 מ"ל.

מספר רישיון: 077-69-91975-00

יצרן: אינטרווט אינטרנשיונל בע"מ, גרמניה.
בעל הרישום: אינטרווט ישראל בע"מ, א.ת. נווה-נאמן, הוד השרון 45240.

ר חייב מרשם רופא

ملزم بوصفة طبيب

P

PRESCRIPTION ONLY MEDICINE

S-O

