

**أكامول****تصينون كلاسيك للنهار****حبسولات****التركيب**

كل حبسولة (حبة بشكل كبسولة) تحتوي على:

پاراسيتامول ٥٠٠ ملغ (paracetamol 500 mg)

پسودوافيدرين هيدروكلوريد ٢٥ ملغ (Pseudoephedrine hydrochloride 25 mg)

للمواد غير الفعالة في المستحضر انظر الفقرة

٦ - «معلومات إضافية».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك

للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة

عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع

الطبيب أو الصيدلي.

يصرف هذا الدواء بدون وصفة طبيب وهو

مخصص للكبار والأطفال اعتباراً من عمر

٦ سنوات وما فوق. عليك تناول الدواء بشكل

صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة

«معلومات إضافية».

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من

٣ أيام أو إذا تفاقمت أو لم تتحسن علامات المرض

بعد ٥ أيام، بالرغم من إستعمال الدواء أو في أي

حالة لظهور أعراض جديدة.

**١) لأي غرض مخصص الدواء؟**

الدواء مخصص للتخفيف من أعراض الرشح والإحتقان في الأنف التي تترافق بسخونة وألام

ـ للعلاج في النهار.

**الفصيلة العلاجية:**

پاراسيتامول - مسكن للألام وخافض للسخونة.

پسودوافيدرين هيدروكلوريد - يخفف من الإحتقان

في الأنف.

**٢) قبل إستعمال الدواء:****☒ لا يجوز إستعمال هذا الدواء:**

• لا تستعمل الدواء عندما تكونين في فترة

الحمل أو الرضاعة.

• إذا علمت بوجود حساسية لپاراسيتامول

أو لـ پسودوافيدرين هيدروكلوريد، أو

لمضادات الإحتقان الأخرى أو لأحد مركبات

الدواء الأخرى (انظر الفقرة ٦).

• إذا كنت معالجاً في نفس الوقت بأدوية

من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكتيباراز

(الإكتئاب) أو خلال ١٤ يوماً منذ التوقف

عن العلاج بها.

• إذا كنت تتناول مضادات أخرى للإحتقان،

حاجبات بيتا.

• إذا كنت تعاني من مرض خطير في القلب أو من

ضغط دم مرتفع شديد، من مرض شديد في

القلب، من تضرر الأداء الوظيفي الكلوي، من

فرط نشاط الغدة الدرقية، من مرض السكري،

من چلوكوما.

• لا يجوز إستعمال هذا المستحضر بالتزامن مع

مستحضرات أخرى تحتوى على پاراسيتامول

(استشر الطبيب أو الصيدلي، إذا لم تكن

واثقاً فيما إذا كان الدواء الذي تتناوله يحوي

پاراسيتامول).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

• إذا ظهرت لديك في الماضي أعراض جانبية

جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوى

پاراسيتامول فلا يجوز تناول مستحضرات

تحتوى على پاراسيتامول، لكي لا تسبب حدوث

أعراض جلدية خطيرة ثانية.

• يحتوى المستحضر على پاراسيتامول الذي قد

يؤدي لضرر في الكبد عندما:

• يعطي بجرعة دوائية أعلى من الموصى بها

أو لفترة زمنية طويلة.

• يتم شرب مشروبات كحولية أثناء العلاج.

• يتم تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط

الكبد.

• لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة

بدون إستشارة الطبيب.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية لخفض السخونة

وتسكن الآلام أو أدوية للرشح بدون إستشارة

الطبيب أو الصيدلي لمنع حصول فرط الحرارة

الدوائية أو التسمم بالپاراسيتامول.

• لا يجوز تناول أدوية إضافية من «فصيلة

أكامول» و/أو مستحضرات إضافية تحتوى

پاراسيتامول.

• يجب الإمتناع عن تناول جرعة دوائية عالية

(وذلك ضمن الحدود الموصى بها) من هذا

الدواء أثناء الصوم.

• إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك

إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

• يحتوى المستحضر على الكتوز وقد يسبب

الحساسية لدى الأشخاص الحساسين له.

**٣) قبل العلاج بـ أكامول تصينون كلاسيك****للنهار، بلغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت****في الماضي من:**

• مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية

الدموية.

• إرتفاع في ضغط الدم

• مشكلة في العينين (مثل چلوكوما)

• مرض في الكبد أو خلل في الأداء الوظيفي

للكبد.

• خلل في وظيفة الكلى (مثل ورم من نوع

phaeochromocytoma) أو في جهاز البول

مشكلة في الغدة الدرقية

مشكلة في غدة البروستات

مرض السكري

الإدمان على الكحول

• عدم هدوء متزايد

يرقان قيروسى.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية

أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية

وإضافات غذائية وفيتامينات، احذ للطبيب

أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو

المجموعات التالية أو إذا أنهيت الآن العلاج

بدواد:

أدوية منبهة للجهاز العصبي المركزي (مثل

مستحضرات مثبتة للشهية للطعام).

أدوية مضادة لتخثر الدم خاصة وارفارين.

• أدوية مضادة للإكتئاب (تشمل مثبطات

MAO) أنظر الفقرة ٢ - «لا يجوز إستعمال هذا الدواء»

أو مضادات الإكتئاب ثلاثة الحلقة.

• أدوية مضادة للسعال والرشح (مثل: أدوية

آخرى مضادة للإحتقان في الأنف - أنظر الفقرة

٢ - «لا يجوز إستعمال هذا الدواء».

• أدوية لعلاج الربو (من فصيلة مقللات الجملة

العصبية الوردية).

• ميتيلدوبا أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم

(مثل: فينيتوئين [للتشنجات]، بارببورات).

• أدوية مضادة للتشنجات (العلاج الصرع).

• أدوية إضافية ذات تأثير مسكن للألام

وذلك مضادات الإلتهاب (بالإستعمال لفترة

طويلة).

• ميتوكلوپراميد أو دومپيرidon (العلاج الغثيان).

التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).

• كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضادات

الحيوية).

پروبيتيسيد (العلاج النقرس).

• كوليستيرامين (لخفض فرط الشحوم في

الدم).

أقراص منع الحمل.

أوكسيتوكسين.

أدوية لعلاج الميجرينا (Ergot alkaloids).

ديجوكسين.

**٤) إستعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول الدواء بدون أي علاقة للطعام.

**٥) إستعمال هذا الدواء**

لا يجوز إستعمال هذا الدواء بدون أي علاج

أدوية أخرى.

أدوية مضادة للإحتقان في الأنف.

أنظر الفقرة ٢ - «لا يجوز إستعمال هذا الدواء»

أو مضادات الإكتئاب ثلاثة الحلقة.

أدوية مضادة للسعال والرشح (مثل: أدوية

آخرى مضادة للإحتقان في الأنف - أنظر الفقرة

٢ - «لا يجوز إستعمال هذا الدواء».

أدوية مقللات الجملة العصبية الوردية.

أدوية مضادة للتشنجات (العلاج الصرع).

أدوية إضافية ذات تأثير مسكن للألام

وذلك مضادات الإلتهاب (بالإستعمال لفترة

طويلة).

ميتوكلوپراميد أو دومپيرidon (العلاج الغثيان).

التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية).

كلورامفينيكول أو ريفامپيسين (مضادات

الحيوية).

پروبيتيسيد (العلاج النقرس).

كوليستيرامين (لخفض فرط الشحوم في

الدم).

أقراص منع الحمل.

أوكسيتوكسين.

أدوية لعلاج الميجرينا (Ergot alkaloids).

ديجوكسين.

**٦) إستعمال الدواء والطعام**

يمكن تناول الدواء بدون أي علاقة للطعام.

**٧) إستعمال هذا الدواء**

لا يجوز إستهلاك الكحول أثناء العلاج بهذا الدواء

بسبب زيادة الخطورة لضرر الكبد.

يتبع