

**أكامول****تصينون وشَّبَّاعَت للنهار****حبسولات**

التركيب

كل حبسولة (حبة بشكل كبسولة) تحتوي على:

پاراسيتامول ٥٠٠ ملغم

Paracetamol 500 mg

پسدوافيدرين هيدروكلوريد ٣٠ ملغم

Pseudoephedrine hydrochloride 30 mg

ديكستروميتروفان هيدروبروميد ١٥ ملغم

Dextromethorphan hydrobromide 15 mg

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر أنظر الفقرة

٦ - «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك

للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن

الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب

أو الصيدلي.

يصرف هذا الدواء بدون وصفة طبيب وهو مخصص

للكبار والأطفال اعتباراً من عمر ١٢ سنة وما فوق.

عليك تناول الدواء بشكل صحيح. إستشر الصيدلي

إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر

من ٣ أيام أو إذا تفاقمت أو لم تتحسن علامات

المرض بعد ٥ أيام بالرغم من إستعمال الدواء أو

في أي حالة لظهور أعراض جديدة.

## ١) لأي غرض مخصوص الدواء؟

الدواء من مخصص للتخفيف من السعال، الرشح والإحتقان في الأنف التي تترافق بسخونة وألام - للعلاج في النهار.

الفصيلة العالجية:

پاراسيتامول - مسكن للألام وخافض للسخونة.

پسدوافيدرين - يخفف من الإحتقان في الأنف.

ديكستروميتروفان - مثبط للسعال.

## ٢) قبل إستعمال الدواء

## لا يجوز إستعمال هذا الدواء:

لا تستعمل الدواء عندما تكونين في فترة الحمل أو الرضاعة.

إذا كنت حساساً (أليرجي) لا پاراسيتامول أو

لا پسدوافيدرين، أو لا ديكستروميتروفان أو

لمضادات الإحتقان الأخرى أو لكل واحد من

المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر

الفقرة ٦).

إذا كنت معالجاً في نفس الوقت بأدوية من فصيلة

مثبطات مونوآمين أووكسيتاز (لإكتئاب) أو خلال

٤ يوماً منذ التوقف عن العلاج بها.

إذا كنت معالجاً في نفس الوقت بمضادات إحتقان

أخرى، أدوية إضافية للسعال والرشح، أدوية من

فصيلة حاجبات بيتا لعلاج مشاكل القلب.

إذا كنت تعاني من مرض خطير في القلب أو من

ضغط دم مرتفع.

إذا كنت تعاني من مرض رئوي.

إذا كنت تعاني من سعال مزمن.

لا يجوز إستعمال هذا المستحضر بالتزامن مع

مستحضرات أخرى تحتوي على پاراسيتامول

(إستشر الطبيب أو الصيدلي)، إذا لم تكن

واثقاً فيما إذا كان الدواء الذي تتناوله يحوي

پاراسيتامول.

إذا كنت تعاني من الأمراض أو من الأعراض

التالية: مرض في الأوعية الدموية، مرض شديد

في الكبد أو الكلى، فرط نشاط الغدة الدرقية،

ضغط مرتفع داخل العين (جلوكوما)، مشاكل

في غدة البروستات، صعوبات في التنفس أو

مرض السكري.

لا يجوز تناول أدوية إضافية تؤثر على نشاط

الكبد.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة

بدون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية إضافية لخفض السخونة

وتسكين الآلام أو أدوية للرشح بدون استشارة

الطبيب أو الصيدلي لمنع فرط الشحوم

الدوائية أو التسمم بالپاراسيتامول.

لا يجوز تناول أدوية إضافية من «فصيلة

أكامول» و/أو مستحضرات إضافية تحتوي

على پاراسيتامول.

يجب الإنبعاث عن تناول جرعة دوائية عالية (وذلك

ضمن الحدود الموصى بها) من هذا الدواء أثناء

الصوم.

إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ

الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

قبل العلاج بأكامول تصينون وشَّبَّاعَت للنهار،

إحكام الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي

من:

مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية

(مثل مرض في الشرايين التاجية).

مرض أو خلل في الجهاز التنفسي، مثل: الربو،

إلتهاب القصبات الهوائية، سعال متزايده، مثلاً

نتيجة التدخين، سعال متواصل، تنفس بطيء. إذا

ترافق السعال بسخونة، فرط الحرارة، إلتهاب

مسالك التنفسية، ضيق في التنفس.

إرتفاع في ضغط الدم

مشاكل في العينين (مثل جلوكونا).

مرض في الكبد أو خلل في الأداء الوظيفي للכבד

خلل في وظيفة الكلية (مثل ورم من نوع

phaeochromocytoma) أو في جهاز البول

خلل في وظيفة الغدة الدرقية

مرض السكري

الإدمان على الكحول

عدم هدوء متزايد

يرقان ثيروسبي

خلل في الجهاز العصبي

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية

أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات

غذائية وفتامينات، إحكام الطبيب أو الصيدلي عن

ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص إذا كنت

تتناول دواء من المجموعات التالية أو إذا أنهيت الآن

العلاج بدواء:

أدوية منبهة للجهاز العصبي المركزي (مثل

مستحضرات مثبتة للشهية للطعام)

أدوية مثبتة للجهاز العصبي المركزي (مثل: الأدوية

المهدئة، المنومة، لمرض باركينسون، للصرع)

أدوية مضادة لتخثر الدم خاصة وارفارين

- MAO مثبطات لإكتئاب (تشمل مثبطات

أنظر الفقرة ٢، «لا يجوز إستعمال هذا الدواء»

أو مضادات الإكتئاب بثلاثية الحلقة)

أدوية مضادة للسعال والرشح - أنظر الفقرة ٢،

«لا يجوز إستعمال هذا الدواء» (مثل: أدوية أخرى

مضادة للإحتقان في الأنف)

أدوية لعلاج الربو (من فصيلة مقلدات الجملة

العصبية الودية)

ميتيلوبا أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم

(مثل: حجاجات بيتا، أنظر الفقرة ٢،

«لا يجوز إستعمال هذا الدواء» (مثل: أدوية أخرى

مضادة للإحتقان في الأنف)

أدوية مضادة لتخثر الدم خاصة وارفارين

- مثبطات الإكتئاب (تشمل فينيتونين [للتشنجات، باربيتورات)

أدوية مضادة للتشنجات (العلاج الصرع)

أدوية إضافية ذات تأثير مسكن للآلام وكذلك

مضادات الإلتهاب (بالاستعمال لفترة طويلة)

ميتوكلوبراميد أو دومپريديرون (لعلاج الغثيان،

التقيؤ ومشاكل هضمية إضافية)

كلورامفينيكول أو ريفامبيسين (مضادات

حيوية)

بروبينسيد (العلاج التقرس)

كوليستيرامين (الخفض فرط الشحوم في الدم)

أعراض منع الحمل

ديجوكسين لمشاكل في القلب

أدوية للحساسية

أوكيستوتوسين

يتبع

## ٤) إستعمال الدواء والطعام

يمكن تناول الدواء بدون أي علاقة للطعام.

## ٥) قبل إستعمال هذا الدواء واستهلاك الكحول

لا يجوز زياحة الكحول أو تناوله لفترات طويلة

بسبب زيادة الخطورة لتضرر الكبد.

يتبع

تتمة

## ١- الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.

## ٢- الإستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص لأطفال فوق عمر ١٢ سنة، أنظر الفقرة ٢.

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كافة الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

## ٣- كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

الكبار والأطفال فوق عمر ١٢ سنة ٢-١ حبسولات، كل ٤-٦ ساعات، حتى ٤ مرات في اليوم.

لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قرابة ٨ حبسولات خلال ٢٤ ساعة.

مرضى فوق عمر ٦٠ سنة: يتوجب عليهم إستشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء لأنهم قد يكونوا حساسين لمستحضرات من هذا النوع.

بالإستعمال المتقابل لـ أكامول تصينون وشَّبَّاعَت

للليل، يجب تبديل الجرعة الدوائية من أكامول تصينون وشَّبَّاعَت للنهار بجرعة دوائية قرابة ٨ حبسولات

خلال ٢٤ ساعة.

مرضى فوق عمر ٦٠ سنة: يتوجب عليهم إستشارة الطبيب قبل إستعمال هذا الدواء.

في أي حالة لظهور أعراض الجديدة.

## ٤- كيفية الإستعمال

لا يجوز مضغ أو سحق الحبسولة! بالإمكان شطرها في شق الشطر.

يجب بلع الحبسولة مع القليل من الماء.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، يجب التوجه حالاً

الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء حتى لا يضر بـ

لا تسبب التقيؤ بـ

ولو شعرت بشكل جيد، فإن العلاج الفوري ضروري، بسبب خطورة تطور ضرر شديد للكلب.

الأعراض الجانبية يمكن أن تكون: غثيان وقيء، إسهال، فقدان الشهية للطعام، الشعور بـ

الشعور بـ

بطء، وعصبية زائدة، إلتهاب شديد في البنكرياس.

لا تناول الأدوية في العادة: يجب تناولها كإضافة على العلاج.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء،