

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

إقرأ/ي النشرة بامكان حتى نهايتها
قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحوهاها
فحص ورخص من قبلها في كانون الأول ٢٠٠٩

إيزوكت بخاخ

التركيب:
المواد الفعالة وقوتها:
كل مقدار دوائي يحتوي على:

Isosorbide dinitrate 1.25 mg

المواد غير الفعالة:

Ethanol, Macrogol 400

الفصيلة العلاجية:

من فصيلة النيترات لتوسيع الأوعية الدموية.

تأثيرات الدواء الطبية:
لعلاج ولمنع نوبات الذبحة الصدرية (angina pectoris).
بإمكان إستعمال بخاخ إيزوكت لمنع نوبة قبل بذل جهد متوقع، جسماني أو نفسى.

متى لا يجوز لك إستعمال الدواء؟

لا يجوز الإستعمال إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء.

لا يجوز إستعمال الدواء في حالات مرض عضة القلب (اعتلال عضة القلب)، التهاب غشاء القلب (pericarditis) أو تشكل فاقض من السائل في غلاف القلب (cardiac tamponade).

لا يجوز إستعمال هذا الدواء لدى مرضى يعانون من خلل في وظيفة الدورة الدموية أو من ضغط دم منخفض بشكل خاص.

لا يجوز الإستعمال بشكل متزامن مع مستحضرات من فصيلة مثبطات PDE5 (أدوية لمعالجة العجز الجنسي) من نوع فياجرا، سيناليس وليفيترا، نظرًا لإمكانية حدوث أعراض جانبية خطيرة (كالإغماء، احتشاء عضلة القلب).

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل إستشارة الطبيب مقدمًا في الحالات التالية:
عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.
إذا كنت تعانين من / أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب / أو الأوعية الدموية أو إذا عانيت من مخراً من نوبة قلبية، العينين (كالجلوكوما)، الكبد، الكلى / المussels البولية، الجهاز الهضمي (كالقرحة)، الغدة الدرقية، جهاز الدم (كالتخثر والخ).
ضغط دم منخفض، فقر دم حاد، في حالات الضغط المرتفع داخل الجمجمة أو في حالة الإصابة أو التزف المخي.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

إن إستعمال هذا الدواء قد يؤثر على قدرة الإستجابة ولذا يجب إنخاذ الحبطة والخذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل مراكبات خطرة ومارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية أثناء فترة العلاج بهذا الدواء.

تحذيرات:
يجب إجراء الفحوص الطبية أثناء فترة العلاج بهذا الدواء

لأداء القلب وضغط الدم.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعم أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

يجب الإنبعاث عن الإنثال المفاجيء من حالة الاستلقاء / الجلوس إلى حالة الوقوف، بغية منع الدوار وفي حالات شديدة الإغماء.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تعاطي / بين دواء إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدءاً آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادى الأخطار

أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتهي إلى المجموعات التالية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (من فصيلة الأدوية المضادة للأمراض النفسية الذهانية)، مضادات الإكتئاب النفسي، مخفضات ضغط الدم (مثل حاجبات بيتا، حاجبات قنوات الكلس وموسعات الأوعية الدموية)، مضادات السعال والررشح، مضادات ألم الرأس النصفي - ميجرينا (برجرات كبيرة)، أدوية العلاج العجز الجنسي (مثل: فياجرا، سيناليس وليفيترا).

الأعراض الجانبية:
إضافة إلى التأثيرات الطيبة المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل:
صداع - ظاهرة شائعة تزول عادة باستمرار العلاج، إنخفاض ضغط الدم أثناء الوقوف، غثيان أو تقيؤات، دوار، نعاس، شعور بالضعف العام، زيادة نظم القلب، شحوب، عدم الراحة، فرط التعرق، الشعور بالحرقة في اللسان في مكان البخ.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:
تهيج، إحمرار أو طفح جلدي، صداع متواصل، سقوط أو إغماء (أعراض نادرة): توقيف / ي عن العلاج وراجع / ي الطبيب.

الأعراض الجانبية الناتجة عن فرط في المقادير الدوائية:
ضعف متزايد، إزراق الشفتين، الأظافر أو راحتي اليدين، ضغط في الرأس (أعراض نادرة): توقيف / ي عن العلاج وراجع / ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ إستشارة الطبيب حالا.

المقادير الدوائية:
يستخدم الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط وياءً ماءً
المقدار الدوائي بشكل شخصي لكل مريض.
المقدار الدوائي الموصى به بشكل عام هي ١-٣ بخات داخل الفم بفارق زمني قدره ٣٠ ثانية، أثناء النوبة أو قبل بذل جهد متوقّع.

لا تتجاوز/ي المقدار الدوائي الموصى به.
هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والرضع.

إنبيه/ي:

يحتوي محلول على ٨٥٪/٧٧ إيتانول، لذا يجب الحرص على تخزين الدواء بشكل مناسب وإبعاده عن مصادر الحرارة/النار.
في حال تماس محلول البخاخ مع قسم واسع من الجلد، يجب تنظيف منطقة التماس حالاً!

إرشادات الإستعمال:

هام! يجب بخ محلول إلى داخل الفم.
لا يجوز استنشاق البخاخ.

١. قبل بدء الإستعمال يجب تحضير رأس القنينة - الكباس للإستعمال وذلك بالضغط عليه عدة كيسات خفيفة، حتى تتحرر بخة واحدة متجانسة للهواء، الآن أصبح البخاخ جاهزاً للإستعمال.
٢. إذا لم تستعمل/ي البخاخ لفترة تزيد عن ٢٤ ساعة، يجب تحرير البخة الأولى للهواء بغية تأمين مقدار دوائي متجانس وكامل.

٣. أثناء الإستعمال، يجب مسك القنينة حيث يكون الكباس موجهانحو الأعلى (مقابل الفم). تنفس/ي عميقاً، أحبس/ي تنفسك، ثم اضغط/ي على الكباس وبخ/ي إلى داخل جوف الفم (من الجائز أن تشعر/ي بحرقة خفيفة في اللسان). أغلق/ي فمك واستمر/ي بالتنفس عن طريق الأنف فقط لمدة ٢٠ ثانية تقريباً.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟
يجب إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

تجنب/ي للتسمم:

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصاياتهم بالتسمم، إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خططاً من هذا الدواء، عليك التوجّه إلى المستشفى حالاً

مصطحبة/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.
لا تتناول/ي الدواء في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين:

يجب تخزين دون ٣٠ درجة مئوية.

تحذير! مادة قابلة للإشتعال، أبعدها/يه عن النار.
تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك، عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.
لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٣٨٤٩-٢٢٣٨٦

الم المنتج:

أسيبيكا فارماسيوتيكالس GmbH، مونهايم، المانيا.

صاحب الإمتياز والمستورد:

چلاکسوسمیٹکالین (إسرائيل) م.ض.
شارع بازل ٢٥، بيتح تكتا.