

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תקנירום) התשמ"ו – 1986
תרופה זו חייכת במרשם רופא
קראוי/ בעין את העלון עד סוף
בטרם תשתמש/ בתרופה

פורמת עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על ידי בדצמבר 2009

אייזוקט[®] טרסיס

הרכב:
חומרים פעילים וחזקם:
כלמנה מכילה:

Iososorbide dinitrate 1.25 mg
חומרים בלתי פעילים:
Ethanol, Macrogol 400

קובצת תרפואית:
ニיטרטים להרחבת כלי דם.

פעילות רפואי:
טיפול ולמנועה של התקפי תעוקת חזה (אנגינה
פלקטורים).
ניתן לשתמש בתרסיס אייזוקט למניעת התקף
לפניהם אמאץ צפי, גופני או נפשי.

מתי אין לשתמש בתרופה?

אין לשתמש אם ודועה לך לריגשות לאחד ממרכיביו
התרופה.
אין לשתמש בתרופה במקרים של מחלת
שריר הלב (קרדיומיאופתיה), דלקת קרום הלב
(פריקורדים) או היוציארות נולע עדיף במעטפת
הלב (טמנונדה לבבית).
אין לשתמש בחולים הסובלים מתפקוד לקוי של
מחוץ לדם או מלחץ דם נמוך במיוחד.

אין לשתמש בו זמני עם תכשירים מקבוצת
מעכבי PDE5 (תרופות לטיפוס באין אונות מסוג
ויאגרה, סאליס וליוטריה, לאור תופעות לוואי
חמורות העוללות להתרחש (כגון התעלפות,
אטום שריר הלב).

אין להשתמש בתרופה מבלי להיעזר ברופא
לפני התחלת הטיפול במרקם הבאים:

אם הניר בהריון או מניקה.
בנוסף לפעולות הרצואה של התרופה, בזמן השימוש
בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: כאבי ראש -
התקופה שכיחה שחולפת בדרך כלל במהלך הדם (כגון גלאוקומה), הכאב,
ירידה בלחץ הדם בזמן עמידה, מערכת העיכול (כגון אולוקסם)
סחרורות, נמנום, הרגשת חולשה, הגברת קצב
הלב, חווונות, חוסר מנוחה, חזעה מרובה, תחושת
חריבה בלושן באוזן הריסוס.
דימום מוח.

איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?
השימוש בתרופה זו עלול לגרום בקשר ההגבוה ועל
כךחייב זהירות בנהיגה ברכב, בהפעלת מכונות
מוסכנות ובכל פעילות המחייבת עירום.

תופעות לוואי הנbowות ממינון יתר:
חולשה מוגברת, גoon כחול בשפטים, ציפורניים או
בכפות הידיים, לחץ בראש (נדירות): הפסק/
הטיפול פונני/ לרופא.

אזהרות:
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לעור בדיקות
תקפוק לתוך ולחוץ דם.

אם הניר גרייש/ה למזוין כלשהו או לתרופה כלשהי,
עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

יש להימנע מטעבר פטאומי מכבש שכבה/шибה
לעומיה, כדי למנוע סחרחות ובמרקם קיצוניים
עליפון.

תגובה בין תרופיות:
אם הונך נטלית/ת ותרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה
טיפול בתרופה אחרת, עליך לדודו לרופא המטפל
כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנbowות מתגובה

שים לי:

ההמיisha מכילה ו/ח 8% אנתול, אך יש להרכיב
על תנאי אחסון נאותים ולהרחיק מפני מזוקן
חום/ASH.
במקרה שתמיisha התרסיס באה מגע עם חלק נרחב
מההו, יש לנוקט מיד את האזור שנחשה!

אופן השימוש:

חשוב שלהתאי את ההמיisha לתוכה הפה. אין
לשאוף את התרטיס.
1. לפני תחילת השימוש יש להזכיר את הרבקוק.
החלוץ לשימוש, על ידי מספר לחיצות קלות, עד
شمשתחררת התזה אחת אותה לאויר, בעת
התרטיס מוקן לשימוש.
2. אם לא השתמשה בתריסים יותר מפעם, יש
לשחרר את האחתה הראשונה לאויר בכך להבטיח
מיון אחד ומלא.
3. בזמן השימוש, יש להחזיק את הרבקוק כאשר
החלוץ כלפי מעלה (מול הפה). נושא/ עמק,
עצ/or נושא, להציג, על הלחוץ והזז/ לעור
חל הפה (תיתכן תחושת צריבה קלה על הלשון).
סגור/ את הפה והמשר/ למשך רק דרך האף
למשך כ- 30 שניות.

כיצד תוכל/י לסייע להצלחת הטיפול?

עליך להשלים את הטיפול שהומלץ על ידי
הרופא.

משמעות הרעליה?

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום
segor מחוץ להישג ידים של ילדים ו/או תינוקות ועל
ידייך תמנוע הרעליה.
אם נתלת מנת יתר או אם בטעות בער יולד מין
התרופה, פנה/י מיד לחדר מין של בית חולים
והבא/י אריזת התרופה איתך.
אין גירום להקאה ללא הוראה מופורת מרופאי!
אם הונך נטלית/ת ותרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה
טיפול בתרופה אחרת, עליך לדודו לרופא המטפל
היא עלולה להזקק. **אל תיתן/ תרופה זו לקרויב,**
שכניך או מכיר.

בין תרופתיות, במיוחד טיפול גביגי תרופות מהקבוצות
ההורכזיות (מרקם השפעות על מערכת העצבים
תרופות נגד דיכאון, תרופות להורדת לחץ דם (כגון
חויסמי בטא, חסמי תעלות סידן ו/or חורי כלי דם),
תרופות נגד שיעול והצטנות, תרופות נגד מיגרנה
(במינונים גבוהים), תרופות לטיפול באין אונות (כגון:
ויאגרה, סאליס וליוטריה).

תופעות לוואי:

בנוסף לפעולות הרצואה של התרופה, בזמן השימוש
בה עלולות להופיע תופעות לוואי, כגון: כאבי ראש -
התקופה שכיחה שחולפת בדרך כלל במהלך הדם (כגון גלאוקומה), הכאב,
ירידה בלחץ הדם בזמן עמידה, מערכת העיכול (כגון אולוקסם)
סחרורות, נמנום, הרגשת חולשה, הגברת קצב
הלב, חווונות, חוסר מנוחה, חזעה מרובה, תחושת
חריבה בלושן באוזן הריסוס.
דימום מוח.

תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת:
גירוי, אדמדמיות או פריחה בעור, כאבי ראש
מתמשכים, נפילה או עילפון (נדירות): הפסק/
חולשה מוגברת, גoon כחול בשפטים, ציפורניים או
בכפות הידיים, לחץ בראש (נדירות): הפסק/
הטיפול פונני/ לרופא.

איך לשחות ינות או משקאות חריפים בתקופת
הטיפול עם התרופה.
בכל מקרה שבו הnick מרגיש/ה תופעות לוואי של
צינוי בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשת הכללית,
עליך להת匡ע עם הרופא מיד.

מינון:
המינון הינו לפה הוראות הרופא בלבד וויתאם באופן
אינטידואלי לכל חוליה.

ההמליצה הכללית הינה 3-1 התזה לתוכה הפה
במשך זמן של 30 שניות, בזמן התקף או לפני
מאחסן צפי.

אם לעורך על המנה המומלצת.
תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לילדים
ולתינוקות.

אין לטל תרופות בחושן/ יש לבדוק התווית והמנה
בכל פעם שהניר נוטלית/ת תרופה. יש להרכיב
מרקם אטמיים אם הונך זוקק/ה להם.
זהירות! חומר דליק, שמוני/ בפנוי אש.
גם לפני תאי האזרעה/האחסנה המומלצות, תרופות
נסחרות לתקופה מוגבלת בלבד. אין לשם בער תאריך
ההמיisha של התכשירי בכל מקרה של ספק, עליך
להביע זורך שיפוק לך את התרופה.
אין לאחסן מתחת less- 30°C.

מס' רישום התרופה: 38-49-22386
איסקה פרמיצ'טיקלוס HgmbH, מונחים, גרמניה.

בעל הרישום יבואן:
גלקסוסטיקלון (ישראל) בעמ',
רחוב 25, פתח תקווה.