

إنتباه: لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

إرشادات الإستعمال:

يجب خض القنينة جيداً قبل الإستعمال.
من أجل تجنب التلوث، يجب ألا نسمح لطرف القنينة مس أي سطح كان (بما في ذلك العين نفسها)، يجب حفظ القنينة مغلقة بإحكام.
من الجائز أن تكون قنينة النقط غير ممتلئة؛ لقد صُمم هذا الأمر من أجل التحكم على وتيرة التنقيط بصورة أفضل.

كيفية إستعمال القطرات: في بادئ الأمر، إغسل يديك. ميّل الرأس نحو الخلف، بمساعدة العنابية، إسحب الجفن السفلي نحو الأسفل.

لتشكيل ما يشبه «جيب»، يجب تنقيط الدواء داخل «الجيب» المتشكل. إغلق عينيك بلطف. لا ترف عينيك. أبق عينيك مغلقتين لفترة دقيقة حتى دقيقتين. بعد تنقيط القطرات في العين حالا، لضغط على الزاوية الداخلية للعين بواسطة الإصبع الوسطى. يجب مواصلة الضغط دقيقة حتى دقيقتين بعد التنقيط في العين. تساعد هذه العملية على تجنب إمتصاص الدواء إلى داخل الجسم وبذلك تساعد على منع حصول تأثيرات جانبية. بعد إستعمال الدواء، إشطف يديك جيداً من أجل تنظيفها من بقايا الدواء. ولتلافي تفشي التلوث، لا يجوز إستعمال نفس عبوة الدواء لأكثر من شخص واحد.
إذا نسبت إستعمال هذا الدواء في الوقت المعين، يجب إستعمال مقدار دوائي حال تذكرك! ولكن لا يجوز إستعمال مقدارين معا في أي حال من الأحوال.

إذا نطقت في العين/العينين قطرات أكثر من **فلاريكس** من المطلوب، يجب شطف العينين بماء فاتر.

يجب تنقيط المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي.
إذا أفرطت في المقدار الدوائي أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، راجع الطبيب حالا أو غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.

لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

يجب المراقبة على العلاج حسب توصية الطبيب.
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
إذا تفرقت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال **فلاريكس** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيأ منها.

أعراض جانبية لها صلة بالعينين:

أعراض جانبية تظهر في أوقات متباعدة:

تهيج، إحمرار، زيادة الضغط داخل العين

أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة:

إنتفاخ ، حكة، توسع الحدقتين، تدلي الجفن، كاتاركت، جلوكوما،

تطور تلوثات عينية أو تفاقم تلوثات موجودة، إصابة في الرؤية.

أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة جداً:

إنتفاخ العين.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف:

تنوش الرؤية، ألم، شعور غريب وعدم إرتياح في العين، تشكل زائد للدموع.

أعراض جانبية لها صلة بأعضاء أخرى للجسم:

أعراض جانبية تظهر في أوقات متباعدة:

حساسية زائدة، شفاء بطيء.

إذا تفاقت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقير بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (**exp. date**) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- التخزين: يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية بوضع قائم.
- لا يجوز إستعمال الدواء لأكثر من ٢٨ يوماً من وقت فتح القنينة للمرة الأولى.
- أغلق بإحكام وامنع نفاذ الهواء والرطوبة.

٦) معلومات إضافية

بالإضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً:

Benzalkonium chloride, disodium edetate, sodium dihydrogen phosphate monohydrate, tyloxapol, sodium chloride, hydroxyethylcellulose, hydrochloric acid, sodium hydroxide, purified water.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٦١٠.٤٢٧٢٤٩

المنتج:

ألكون كوفور، بلجيكا.

صاحب الإمتياز:

ليبيدوت ميكال إستيراد وتسويق م.ض، شارع هاشيطا ٨، المنطقة الصناعية قيساريا، ٣٨٩٠٠

من أجل سهولة وتحويل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص

وُرخص من قبلها في آب ٢٠١٣

نشرة للمستعمل بموجب أنظمة الصيدلة

1986 - (مستحضرات)

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

فلانريكس

قطرة للعينين

التركيب: المادة الفعالة:

فلواروميثولون أسيتات 0.1% Fluorometholone acetate

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت

لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم

حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

تأثيرات الدواء الطبية: مستحضر ستيرويدي لمعالجة التهابات

العينين.

الفصيلة العلاجية: كورتيكوستيروئيد، مضاد للالتهاب.

٢) قبل إستعمال الدواء

❌ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء

• كنت تعاني من:

• العقولولة البسيطة (هربس)

• أمراض العيون الفطرية

• تلوث جرثومي غير معالج

• أمراض العين الفيروسية

• سل العين

• بعد إزالة جسم غريب من العين والذي لم يسبب المضاعفات.

• إصابة بجرح في العين

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل إستشارة الطبيب مقدماً:

• عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.

• إذا كنت تعاني من مشاكل في العينين مثل: إصابة في عصب

الرؤية، عيب في الرؤية، العدسة الكدرة (كاتاركت)، أي تلوث في

العين، ضغط داخل العين (جلوكوما) والسكري.

• المستحضر مخصص للإستعمال للعينين فقط.

• إذا كنت تشعر بتفاقم أو عودة مفاجئة للأعراض - يجب

إستشارة الطبيب.

• في حالة وجود تلوث - سيوصف لك الطبيب دواء آخر لعلاج

التلوث، في حالة وجود تلوث ناتج عن فيروس العقولولة البسيطة

(هربس) - يجب إستشارة الطبيب.

• إن الإستعمال المطول قد يؤدي إلى تلوث فطري في القرنية.

• لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات مقاربة أو لفترة طويلة

بدون إستشارة الطبيب.

• عندما تكون فترة العلاج أكثر من ١٠ أيام، يجب إجراء الفحص

للضغط داخل العينين، كما يجب إجراء الفحص للضغط داخل

العينين لدى مرضى الجلوكوما كل أسبوع.

• قد يقلل هذا الدواء إنتاج هرمون كورتيزول ويسبب تباطؤ

النمو لدى الأطفال وذلك إذا إستعمل لفترة طويلة أو بمقادير

دوائية عالية.

• من شأن هذا الدواء أن يعيق شفاء إصابة بجرح في العين.

• إذا كنت تعاني من مرض يسبب ترقق أنسجة العين (القرنية أو

بياض العين)، فإن فلانريكس قد يسبب إنتقاب مقلة العين. يجب

إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في

ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك

للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي

بالأخص إذا كنت تتناول:

• قطرات عينية تعطى لتوسيع الحدقات (والحواية على أتروبين أو

مواد أخرى مضادة لإفراز الكولين)

• أدوية لعلاج الجلوكوما

• إذا كان المريض يستعمل قطرات عينية إضافية يجب الإنتظار

فترة ٥ دقائق على الأقل بين كل تنقيط.

❗ الحمل والإرضاع

لا يجوز إستعمال الدواء بدون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا

كنت حامل، تخططين للحمل أو إذا كنت في فترة الرضاعة.

❗ الأطفال

لا يوصى بإستعمال فلانريكس لدى أطفال دون عمر سنتين. سلامة

ونجاعة الدواء لدى أطفال بعمر سنتين وما دون لم تُثبت.

❗ السياقة وإستعمال الماكينات

إستعمال هذا الدواء قد يسبب تشوش الرؤية لذا يجب إتخاذ الحذر

عند قيادة المركبة، تشغيل ماكينات، وما شابه.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على مادة بنزالكونيوم كلوريد كمادة حافظة التي

قد تمتصها العدسات اللاصقة الرخوة. لا يجوز إستعمال المستحضر

عندما تكون وازعاً العدسات اللاصقة الرخوة في عينيك. يجب نزع

العدسات قبل إستعمال المستحضر، ومن ثم إعادتها بعد مرور لا أقل

عن ١٥ دقيقة من تنقيط الدواء في العين.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك

الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقادير الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب

فقط.

المقادير الدوائية: يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

لا تتجاوز المقادير الوصفي بها.

يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال

٧ أيام. يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات

الطبيب العالج.