

**פורמט עלון זה קבוע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר על ידי אוגוסט 2013.**

**עלון לצרcn לפ' תקנות הרוקחים**

**(תקנירם) התשמ"ז - 1986**

התורופה משווקת על פי מרשם חפא בלבד

**פלركס®**

טיפולים עיניים

הרכב: החומר הפעיל:

פלואורומתולון אצטט 0.1% Fluorometholone acetate 0.1%

**קריא בעין את העלון עד סוף בטראם תשתמתש**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התורופה. אם יש לך

שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תורופה זו נרשות לטיפול במחלתו אל תעביך אותה

לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראתה לך כי

מצבם הרפואדי דומה.

**1. מה מיועדת התורופה?**

**טיפולות רפואיות:** תקשיר סטרואידי לטיפול בדלקות

עיניים.

**בקבוצה טיפול רפואי:** קווטיקוסטרואיד, אנטי דלקת.

**2. לפחות שימוש בתורופה**

**אין להשתמש בתורופה אם:**

• ידועה ריגשות לאחד ממרכבי התורופה

• הירך טובל מ:

• הרופס סימפלקס

• محلות פטריות בעין

• דיזום חידודי לא מטופל

• محلות ויראליטיות בעין

• שחפת של העין

• אחריו סילוק גוש זר מהעין שלא גרם לסתובך

• פצעה של העין

**اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתורופה:**

אין להשתמש בתורופה מבלי להיעוץ ברופא לפני

החלה הטיפול או מיניקה.

• אם הירך טובל למשמע עיניים כגון: פינעה בעצב

הראשי, פגם בראייה, קטרקט, זיהום כלשהו בעין,

לחץ חור עיני (גולאוקומה) ווסכרת.

• התcsiיר מיועד לשימוש חמירה או חזרה בעקב

החסמים - יש להיעוץ ברופא.

• במקיר שולץ צ'זום. במקיר שולץ צ'זום נרגם על ידי

טיפול בו��ום. במקיר שולץ צ'זום נרגם על ידי

נירוס הרופס סימפלקס - יש להיעוץ ברופא.

• שימוש ממושך עלול לגרום ליחסום פטריטי

בקרנית.

• אין להשתמש בתורופה זו על מנת קרבות או תקופה

משמעותי בלב להיעוץ ברופא.

• כאשר תקופת הטיפול היא מעל 10 ימים יש לעורר

בדיקות לחץ חור עיני בחוליג'לאוקומה יש לבדוק

לחץ חור עיני על בסיס שבועי.

• בשימוש ממושך או במינונים גבוהים, תורפה זו

עלולה להפחית את יצור הורמון קורטיזול ולגרום

להאטנת גוף אצל אצל ידים.

• תורפה זו עלולה לעכב החלמה של פצעה עינית.

• אם הירך טובל מחלת הנורמל לדלדל רקמות העין

(קרונייט או לבן העין), פלרקס עלול לגרום

להתקנות של גלגול העין. יש להיעוץ ברופא לפני

השימוש בתורופה.

■ אם אתה לוקחת, או אם לך קחת לאחרונה,

תורפות אחרות כולות להוּא או לרוקח, בלי מיזוג ייש

ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת:

• טיפות עיניים שנינחות להרחבת אשונום (המכילות

אטロפין או אנטיצילינוגאים אחרים)

• תורפות לטיפול בנלאוקומה

במידה והחולמה משתמש בטיפות עיניים נוספת.

להמ庭ין לפחות 5 דקות בין ההזיפות.

**■ נריה ושם המשווקת**

אין להשתמש בתורופה מבלי להיעוץ ברופא לפני

החלה הטיפול אם הירך בהרין, מחייב הרין או

מיניקה.

**■ לדים**

השימוש בפלרקס אינו מומלץ לילדים מתחת לגיל

שנתים. הבטיחות והיעילותם בילדים בגיל שנתיים

ומטה לא הוכח.

**■ נהיגה ושימוש במכונות**

השימוש בתורופה זו עלול לגרום לטשטוש ראייה ועל

כגון זיהירות בהנעה ברכב, בהפעלת מכונות,

ובודאות.

**■ מידע חשוב אודוט חלק מהמרכיבים של**

התורופה

התקשר מכיל חומר משמר במלקונים كلוריין, הועל

להיספג על ידי עדשות מגע רכות. אין להשתמש

בתוךם זה כאשר אתה מרכיב עדשות מגע רכות, יש

להסר העדשות לפני השימוש בתורופה, וכן吟 להחדרן

כעבון לא פחות מ- 15 דקות מההפתת התורפה לעין.

■ כיצד תשתמש בתורופה?

לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין ברוח.

המיון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מיון: לפ' הוראות הרופא בלבד. אין לעבור על המנה

המומלצת. אם לא תל שיפור במצבך תוך 7 ימים יש

פנות לרופא. יש להשתמש בתורופה זו בזמנים

קצובים כפי שנקבע על ידי הרופא המטפל  
שים לב: לא בלולע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני  
בלבב.

**אפקט השימוש:**  
יש לנער את הקברוק היטב לפן השימוש.  
בכדי לימנע מחיותם, אין להט לנקה הקברוק בענש  
במשתח כלשהו. סגורו עיניהם. יש לשמור על  
הקבוק סגורו יתבב ובקבוק הטיפות איטי מלא;  
הדבר גוזר לאפשר שליטה טוביה יותר על קצב  
הטפטוף.

**כיצד להשתמש בטיפות:** ראשית, רחץ את ידיך.  
הטה את הראש לאחורה בעזרת האכבע המרומי, משור  
כלפי מטה את העפער החתך, ליצירת מעין "סיט".  
יש לשוטף את התורופה אל "סיט" שמשה עצומת  
עיניך בעדינות. אין למיצט. השאר בעיניהם  
למשך 1 עד 2 דקות. מיד לאחר טפטוף הטיפות אל  
העינן, לחץ באטען העינן האכבע המרומי  
הפנימי של העין. יש להמשיך בלחץ 1 עד 2 דקות  
לאחר הטפטוף אל העין. פעולו גם עוזרת להימנע  
מספיגת התורופה אל מנגנון ובכך מונע  
תופעות לוואי. לאחר השימוש בתורופה, שטוף היטב  
את ידיך כדי בטל בטיוף ואכן להשתמש באותו מילול  
להימנע מהפצעת עין.

אם הולפת בעין ים יותר טיפות **פלרקס** פהדרוש,  
יש לשוטף את העיניים במים פורשים. יש לשים את  
המגה הבאה במוועד הרגיל אם נטלת מותר או אם  
בטעות בעל ידך מן התורופה, פה מודרף או חדר  
מיון של בית חולים והבא אריזת התורופה אותה.  
אין ליטול תרופות בחטש בעין. יש לבדוק שטוף  
בכל פעט שהניר נוטל התורופה. יש להרכיב משקפים  
אם הינך דזוק מהם.

**4. תופעות לוואי:**  
בדומה לכל תרופה, השימוש **פלרקס** עלול לגרום  
لتופעות לוואי במחלה מהשתמש. אל תיבטל  
למקרה ראריה תופעות לוואי, יתכן ולא תסבול מכך  
את מה.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים קדירות:**  
גירוי אדומיות, עלייה בלוחץ עור עין  
תופעות לוואי המופיעות לעיתים קדירות  
גפיקות, גזה, הרחבת אישומות, עציחת העפער,  
קטרטק, גלאוקומה, התפתחות של זיהומי עיניים או  
החמרה של זיהומיים קיימים, פגיעה בראייה.  
**תופעות לוואי המופיעות לעיתים קדירות:**  
התקנות של העין.

**תופעות לוואי המופיעות לעיתים קדירות:**  
טשטוש ראייה, כאב, הרגשה מוזרה ואי נוחות בעין,  
צ'ור מוגבר של דמעות.

**תופעות לוואי הקשורות לאיבר גוף מסוים:**  
ריגשות יתר, החלה איטית.  
אם אתה מטופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה  
סובל מטופעות לאויש דלאויש דזוקה בעילון, עליך  
להתייעץ עם הרופא.

**5. כיצד לאחzn את התורופה?**  
• מגע הרעללה! תרופה זו וככל תרופה אחרת יש  
לשמר במקומות סגור מוחן להישג ידם של ילדים ו/או  
תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תנורם  
להקאה לא הוראה מפרשת גוף.

• אין להשתמש בתורופה אחרי תאריך תוקפה  
התוקפה המופיע על גביה הארייה. תאריך  
התוקפה כתהית ליום האחzn של אותו חדש.  
• אחסנה: יש לאחסן בתורופה יותר מ- 25°C במשך 28 ימים ממועד  
פתיחת הקברוק לרופא יתר מ- 28 ימים ממועד

סגון היטב ומגע חידרת אויר ורטיבות.

**6. מידע נוסף:**  
נוסף על החומר הפעיל, התורופה מכילה גם:

Benzalkonium chloride, disodium edetate,  
sodium dihydrogen phosphate monohydrate,  
tyloxapol, sodium chloride,  
hydroxyethylcellulose, hydrochloric acid,  
sodium hydroxide, purified water.

**מספר רישום התורופה בפנקס התרופות  
הממלכתי במשרד הבריאות:** 610427349

ץ' רצ'ן  
אלקוון קוברו, בלגיה.  
בגל הרישום:

לפיות מדייל יבוא ושיוק בע"מ, רח' השיטה 8,  
אזרע תעשייה קיסריה. 38900.

שם הפשות ולהקלת הקיראה, עלון זה מוסך בלשון  
זכ. על אף זאת, תרופה מיועדת לבני שני המינים.