

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إنته: هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

يجب خض القنينة جيدا قبل الإستعمال. لتجنب التلوث، لا تدع فوهة القنينة تلامس أي سطح (بما في ذلك العين نفسها). يجب الحفاظ على القنينة مغلقة بإحكام.

يمكن أن تكون قنينة القطرات غير ملبية؛ وذلك للسماح بالتحكم بشكل أفضل في وثيرة التنقيط.

اغسل يديك. قم بإمالة رأسك الى الوراء. بواسطة إصبعك السبابة، قم بسحب الجفن السفلي للأسفل، لتكوين ما يشبه "جيب". يجب تنقيط الدواء في "الجيب" المتكون. قم بإغلاق عينيك بلطف. لا ترمش. ابق العينين مغلقتين لمدة دقيقة الى دقيقتين.

بالإضافة الى التعليمات المعطاة أعلاه - مباشرة بعد تنقيط القطرات في العين، إضغط بواسطة الإصبع الوسطى على الزاوية الداخلية للعين. يجب الإستمرار في الضغط دقيقة الى دقيقتين بعد التنقيط في العين. هذه العملية تساعد في تجنب إمتصاص الدواء الى داخل الجسم مما يساعد في منع الأعراض الجانبية.

بعد استعمال الدواء، أغسل يديك جيدا حتى تنظفها من بقايا الدواء. لتجنب إنتشار التلوث، لا تستعمل نفس علبة الدواء لأكثر من شخص واحد.

إذا استعملت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالا الى الطبيب أو الى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك.

إذا نسيت استعمال الدواء، قم باستعماله حال تذكرك، لكن، إذا اقترب موعد المقدار الدوائي التالي، فوّت المقدار الدوائي المنسي وعاود استعمال الدواء كالعادت. لا تستعمل مقدار دوائي مضاعف. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا تتوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا تتناول الدواء في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن استعمال مكسيدكس قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تنتهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائر ألا تعاني أياً منها.

أعراض جانبية تقتضي اهتماماً خاصاً:

تدني الرؤية، تلوث في العين، ألم في العينين، تشوش تدريجي في الرؤية أو فقدان الرؤية، غثيان، تقيؤ (نادراً): توجه للطبيب فوراً. تشوش رؤية خفيف ومؤقت بعد استعمال المستحضر، حرقة، إحمرار، دمع العين - يجب التوجه للطبيب المعالج.

عرض جانبي يظهر في أوقات متباعدة: إرتفاع الضغط داخل العين. أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة: تهيج موضعي، ردود فعل تحسسية موضعية، جلوكوما يرافقها ضرر لعصب الرؤية، كاتاراك، تطور تلوثات في العين أو حدوث تفاعم في تلوثات موجودة.

أعراض جانبية تظهر في أوقات نادرة جداً: تثقب العين.

إذا تفاعمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء:

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر الكرتون / الملصقة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- عاود التخزين في درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية وبوضع عامودي.
- لا تستعمل الدواء لأكثر من شهر (٢٨ يوماً) بعد فتح القنينة لأول مرة.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Disodium phosphate anhydrous, Polysorbate 80, disodium edetate, sodium chloride, citric acid monohydrate and/or sodium hydroxide, benzalkonium chloride, hydroxypropyl methylcellulose, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوئ العلبه:

قنينة تحوي ٥ ملل سائل أبيض - مائل إلى الأصفر.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١٢٨٨٧ ٢٩٤ ٢٢

المنتج: الكون كوفورور پورس، بلجيكا.

صاحب الإمتياز: لبيدوت ميديكال إستيراد وتوزيع م.ض.، شارع

هاشيطا ٨، المنطقة الصناعية قيساريا، ٣٠٨٨٩٠٠

من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

أقرب وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فصح
وُرُخص من قبلها في آب ٢٠١٣

نشرة إضافية بموجب أنظمة الصيدلة
(مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

مكسيدكس®

قطرات العينين بشكل مُعلّق

التركيب: دكساميثازون 1 ملغ/مل

Dexamethasone 1mg/ml

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لأي غرض مخصص للدواء؟

تأثيرات الدواء الطبية: معالجة التهاب العينين التي تستجيب للعلاج بالستيرويدات.

الفصيلة العلاجية: كورتيكوستيروئيد، مضاد للإلتهاب.

(٢) قبل إستعمال الدواء:

❌ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسية لأحد مركبات الدواء
- كنت تعاني من العقبولة البسيطة (هربس) في العين، من تلوث فطري أو جرثومي في العين، من مرض فيروسي في العين، من السل في العين (حتى إذا عانيت منه في الماضي) أو من إلتهاب قبيحة غير معالجة في العينين.
- بعد إزالة جسم غريب من العين والذي لم يسبب مضاعفات.
- لا يجوز استعمال المستحضر لتخفيف إحمرار غير مُشخص.

قبل العلاج بـ مكسيدكس، احك للطبيب إذا:

- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة العينين مثل الجلوكوما، كاتاراكات، إصابة في عصب الرؤية، عيب في الرؤية، تلوثات أخرى في العين.
- إذا كنت تعاني من مرض السكري.

تحذيرات:

- إن الاستعمال المطول لهذا المستحضر قد يسبب تلوث في القرنية، عندما تكون فترة العلاج أكثر من ١٠ أيام يجب إجراء الفحوص للضغط داخل العين، كما يجب إجراء الفحص للضغط داخل العين لدى مرضى الجلوكوما كل أسبوع.
- إذا كنت تعاني من مرض الذي يسبب ترقق الأنسجة في العين (القرنية أو بياض العين)، فإن استعمال مكسيدكس يمكن أن يسبب تنقب مقلّة العين.
- عند الإستعمال المطول أو استعمال مقادير عالية - من الممكن أن تظهر أعراض جانبية شمولية للستيرويدات.

• إن استعمال مكسيدكس غير نافع في حالة ملازمة سبوجرين، والتي تتميز بإفراز منخفض للدموع أو لللعاب.

• لا يجوز التوقف عن العلاج بشكل مفاجئ بدون استشارة الطبيب.

❗ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:

- قطرات للعينين التي تغطي لتوسيع الحدقات (التي تحتوي أرتروبين أو مواد أخرى مضادة لإفراز الكولين). بالإستعمال المتزامن مع مكسيدكس، فإن هذه الأدوية يمكن أن تؤدي الى رفع الضغط داخل العين.
- إذا كان المريض يستخدم قطرات للعينين إضافية يجب الإنتظار ١٥ دقيقة على الأقل بين تنقيط وآخر.

❗ الحمل والإرضاع:

الحمل: يجب استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل. إن استعمال مكسيدكس أثناء فترة الحمل يوجب توخي الحذر.

الإرضاع: يجب استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج إذا كنت في فترة الرضاعة.

الستيروئيدات تفرز في حليب الأم. إذا لزم الأمر قد يوصي الطبيب بعلاج قصير الأمد (أسبوع إلى أسبوعين) بـ مكسيدكس. يجب التوقف عن الإرضاع في حالة الإستعمال المطول بـ مكسيدكس أو استعمال مقادير عالية من المستحضر.

❗ السيقاة وإستعمال الماكينات:

إن استعمال هذا الدواء قد يسبب تشوش الرؤية ولذلك يجب توخي الحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكينات، وما شابه ذلك.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- يحتوي المستحضر على مادة بنزالكونيوم كلوريد كمادة حافظة، والتي قد تمسها العدسات اللاصقة الرخوة.
- لا يجوز استعمال هذا المستحضر عندما تضع العدسات اللاصقة الرخوة. يجب نزع العدسات اللاصقة قبل استعمال المستحضر، ويمكن عاداتها بعد مرور فترة لا تقل عن ١٥ دقيقة من تنقيط الدواء في العين.
- قد يوصي الطبيب بالإمتناع عن وضع عدسات اللاصقة خلال فترة العلاج.

(٣) كيفية استعمال الدواء؟

يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي: المقدار الدوائي يحدد من قبل الطبيب فقط. لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به. هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال دون عمر سنتين. إذا لم يطرأ تحسن في حالتك خلال ٥-٧ أيام يجب التوجه للطبيب.