

פורט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על ידי אוגוסט 2013
עלן לצרכן לפ' תקנות הרוקחים
1986
(תקנירם) התשמ"ז - 1986
התורופה משוקנת על פי מרשם רופא בלבד

מקסידקס®

טיפול עיניים בתרחיף

הרכב: דexamethasone 1 mg/ml

Dexamethasone 1 mg/ml
קרא בעיון את הعلن עד סופו בטרם תשתמש
בתרופה. עלון זה מכיל מיעוד מצטחי על התורופה. אם

יש לך שאלות נוספים, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו גורשה עבורך. אל תעבור אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נהאה לך כי מצבם
הרופא דומה.

1. למה מיועדת התורופה?

טיפול רפואי: טיפול בדלקות עיניים המגיבות
לטיפול רפואי. קוטיקוסטרואיד, אני דלקתי.

2. לפני שימוש בתורופה:

א. אין לשימוש בתורופה אם:

- ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התורופה.
- הין סובל מהרפס סימפלקס בעין, מיזהום
פטריטי או חידיקי בעין, מחלת ויראלית בעין,
משחפת של העין (כגון סבלת בעבר) או
מדלקות מוגളיות לא מטופלות בעיניהם.
- אחריו סולוק נורדרם העשן שלא גורם לסובור.
- אין לך את הזכיר להקלת אדרומיות לא
מוגדרת.

ב. לפני הטיפול במקסידקס ספר לרופא אם:

- אם הין סובל או סבל בעבר מליקוי בתפקוד:
העינים כבן גלאcum, קטרקט, פגיעה בעצב
הראייה, פגס בראייה, זיהומי עיניים אחרים.
- אם הין סובל מסוכת.

ג. אזהרות:

- שימוש ממושך עלול לגרום לדלקת בעורקים.
כאשר תקופת טיפול היא מעל 10 ימים יש לעורק
בדיקות לחץ תוך עין, בחולי גלאcum ושלבזוק
לחץ תוך עין על בסיס שבועי.
- אם הין סובל ממחלה הנורמת לדלקת רקמות העין
(קרנית או לבן העין), השימוש במקסידקס עלול
לגרום להתקנקות של מגן העין.
- בשימוש ממושך עלוייסיטמיות של סטרואידים.
תופעות לוואי סיטמיות של תרופה של תסומנות
ה심וש במקסידקס אינן יwil במרקחה של דמעות
סיגורן, המתאפיינת במעט הפרשה של דמעות
ורוקן.
- אין להפסיק את הטיפול באופן פתאומי בלי להיוועץ
ברופא.

ד. אם אתה לוחץ, או אם לך חותם לאחרונה,

- תרופות אחרות כולל תרופה לא מרשם ותוספי
chezona, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיחaud יש
ליידע את הרופא שיתנות להרחבת אישונים. יד
טיפות עיניים אנטיכילינרגים אחרים. יד
אטופרין או מקסידקס, תרופות אלה עלולות לגרום
עם מקסידקס, תרופות אלה עלולות לגרום
להעלאה של החץ תוך עין.
במידה והחוליה משתמש בטיפות עיניים נסוכות יש
להמתן לפחות 15 דקות בין ההצלפות.

ה. הרין והנקה:

- הרין: לשימוש ברופא לפני התחלת הטיפול אם
הין ברין או מתכוונת הרין. השימוש במקסידקס
בזמן הרין מחייב זיהירות.
הנקה: יש להיזיע ברווח לפני החלת הטיפול
היר נמייה.
טטרואידים מופרשים לחלב אם. במרקחה הצורך יתכן
כי רופא ימליץ על טיפול קצר-טוח (1-2 שבועות)
במקסידקס. יש להפסיק את ההנקה במרקחה של
שימוש ממושך במקסידקס או במינונים גבוהים של
התקניש.

ג. נגינה ושימוש במכוונות:

- השימוש בתורופה זו עלול לגרום לטשטוש ראייה ועל
כך חייב בזרותה בהנוגה בריך, בהפעלת מכוונות,
וכדומה.

ה. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של

- התרופה:
התקניש מכיל חומר מסמר בנצלקונים קלורייד,
העלול להיספוג על ידי עדשות מגע רכות. אין
להשתמש בתקניש זה כאשר אתה מרכיב עדשות
מנוג רכות. יש להסר העדשות לפני השימוש
בתקניש, ונinth להחזירם כעבור לא פחות מ- 15
דקות מושכלת החרופה לעין.

- יתכן כי הרופא אף ימליץ להימנע מהרכבת עדשות
מנוג בשמשך כל תקופת הטיפול.

צ. כיצד השתמש בתורופה?

- תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק
אם הרופא או הרוקח אם אין לך בטוח.
מינון: מינון לפי הוראות הרופא בלבד. אין לעורך על
המנה המומלצת. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל
ליילדיים מתחת לגיל שניים. אם לא חל טיפול במצבר
תוך 5-7 ימים יש לפנות לרופא.