

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء
كتبت النشرة بصيغة المذكر وهي مخصصة للرجال والنساء
على حد سواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص
ورُخص من قبلها في أيار ٢٠١٢

كورسوديل جل للأسنان

التركيب:

المادة الفعالة وتركيزها:

Chlorhexidine Digluconate 1% W/W

المواد غير الفعالة:

Purified Water, Isopropyl Alcohol 4%, Hydroxypropylcellulose,
Sodium Acetate, Peppermint Oil, Levomenthol,
Macroglyglycerol Hydroxystearate

الفصيلة العلاجية: مُطهر.

تأثيرات الدواء الطبية:

مطهر ومضاد للتلوثات، للإستعمال في جوف الفم.

هذا الدواء مخصص:

• لإعاقه تشكل البلاك (الرواسب المتحجرة على الأسنان).

• كمادة مساعدة لعلاج ومنع التهاب اللثة (gingivitis).

• كمادة مساعدة للحفاظ على صحة الفم.

• للإستعمال بعد العمليات الجراحية أو العلاجات السنية، لتعجيل
شفاء اللثة.

• للإستعمال في تقرحات، والالتهابات بسبب الأسنان الإصطناعية
والفطريات في الفم.

• كمادة مساعدة لمنع التسوس، لدى أشخاص ذوي خطورة عالية
لحدوث ذلك، بالإضافة لمادة الفلورايد.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعمال المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لكورهكسيدين
ديجلوكونات أو لأحد مركباته.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل إستشارة الطبيب مقدماً:
عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.
لدى أطفال دون عمر ١٢ سنة.

تحذيرات:

إن معاجين الأسنان يمكن أن تضر في فعالية كورسوديل جل للأسنان
ولذلك بعد تفريش الأسنان بالمعجون - يجب شطف الفم بالماء جيداً
والإنتظار ٥ دقائق بعد تفريش الأسنان بمعجون الأسنان وقبل إستعمال
كورسوديل جل للأسنان أو إستعمال كورسوديل جل للأسنان في
أوقات مختلفة خلال اليوم من أوقات تفريش الأسنان. عند إستعمال
كورسوديل جل للأسنان كمادة مساعدة لعلاج ومنع التهاب اللثة،
قد تنزف اللثة عند تفريش الأسنان.
لا يجوز تبييض أقمشة قد لامست الجل.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى دواءً إضافياً، أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب
إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة
عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة
إستعماله بعض الأعراض الجانبية، مثل: تغير في حاسة المذاق أو
الشعور بالحرق.

تخفي هذه الأعراض عادة خلال فترة قصيرة بعد أن يعتاد الجسم على
المستحضر. أما إذا إستمرت هذه الأعراض، يجب مراجعة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

إصطباغ مؤقت للسان. تختفي هذه الظاهرة عادة بعد التوقف عن إستعمال المستحضر.

إصطباغ مؤقت للأسنان الذي يمكن إزالته عادةً بتفريش الأسنان. بالإمكان منع الإصطباغ بواسطة تجنب شرب الشاي، القهوة والنيبذ الأحمر - بالأخص ساعة بعد الإستعمال وبواسطة تفريش الأسنان يومياً بمعجون أسنان. إذا بقي الإصطباغ فبالإمكان إزالته بواسطة التنظيف والصلق عند طبيب الأسنان أو مساعد طبيب أسنان مختص بصحة الأسنان (Hygienist). بالإمكان تنظيف الأسنان الإصطناعية بمواد لتنظيف الأسنان الإصطناعية.

في حالة وجود ألم، إنتفاخ أو تهيج في الفم: توقف عن العلاج وراجع الطبيب.

رد فعل تحسسي حاد يمكن أن يتمثل بطفح، إنتفاخ الفم أو الوجه أو صعوبات في التنفس (نادر): توقف عن العلاج وراجع الطبيب حالاً! أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

المقادير الدوائية:

المقادير الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لمعالجة التهابات اللثة:

يجب فرك الأسنان بالفرشاة لمدة دقيقة واحدة على الأقل، مرة أو مرتين في اليوم بـ ٢ سم من الجل. يجب الإستمرار بالعلاج لمدة شهر تقريباً.

لعلاج التقرحات وفطريات الفم:

يجب دهن الجل مباشرة على المناطق المؤلمة بواسطة طرف الأصبع أو عود من القطن مرة أو مرتين في اليوم لمدة دقيقة واحدة على الأقل. يجب الإستمرار في العلاج يومين إضافيين بعد الشفاء.

لعلاج التهابات الفم نتيجة إستعمال الأسنان الإصطناعية:

قبل إدخال الأسنان الإصطناعية، يجب دهن الجل بلطف على الأسنان الإصطناعية في مناطق التماس مع اللثة. يجب تنظيف ونقع الأسنان الإصطناعية بـ **كورسوديل غسول للفم** لمدة ١٥ دقيقة مرتين في اليوم أو حسب تعليمات طبيب الأسنان.

كمادة مساعدة في منع التسوس أو بعد جراحات سنية: يجب الإستعمال حسب تعليمات طبيب الأسنان.

لا تتجاوز المقادير الموصى بها.

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية، يجب مراجعة طبيب الأسنان.

إنذار:

لا يجوز البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال داخل الفم فقط.

يجب الإمتناع عن تماس الدواء بالعينين أو الأذنين، وفي حالة حدوث مثل هذا التماس، يجب شطفهما جيداً بالماء.

تجنب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أقرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول الدواء في العتمة! يجب تشخيص ملصقة الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين:

لا يجوز تخزين الدواء في درجة حرارة تزيد عن ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٩٥٧١-٦٢-١١٤

المنتج:

بورنا فارماسيوتيكالس، بيورس، بلجيكا.

صاحب الإمتياز والمستورد:

جلاكسو سميث كلاين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل ٢٥، بيتح - تكفا.