

**سير فيريكس، معلق للحقن العضلي**

كل ٥ مل من معلق لقاح فيروس الورم الحليمي البشري يحتوي على:  
 HPV من نوع ١٦ مل ٢٠ مكغ  
 HPV من نوع ١٨ مل ٢٠ مكغ  
 قائمة المكونات مفصلة في الفقرة ٦.

اقرئي النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للقاح. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن اللقاح. إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجعي الطبيب أو الصيدلي.  
 وصف هذا اللقاح من أجلك. لا تعطيه للأخريات. فهو قد يضرهن حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

**(١) لأي غرض مخصوص اللقاح؟**

سير فيريكس هو لقاح يستعمل لدى الفتيات والنساء من عمر ٩ سنين لمنع الآفات التناصالية ما قبل الخبيثة (عنق الرحم، الفرج والمهبل) ولمنع سرطان عنق الرحم، ذات الأسباب المتعلقة بأصناف معينة مولدة للأورام فيروس الورم الحليمي البشري

الفحصية العلاجية: لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري.

إن أنواع فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) التي يتضمنها اللقاح (HPV من نوع ١٦ و ١٨) مسؤولة عن حوالي ٧٠٪ من حالات سرطان عنق الرحم وعن ٧٠٪ من الآفات ما قبل السرطانية في الفرج والمهبل، المتعلقة بـ HPV.

يمكن أيضاً لأنواع أخرى من HPV أن تسبب سرطان عنق الرحم. ينتج أصداد لفيروس HPV عندما يتم تلقيح فتاة بواسطة سير فيريكس، فإن جهاز المناعة (جهاز الدفاع الطبيعي للجسم) يمنع الأمراض المتعلقة بـ HPV من أن تتطور إلى سرطان عنق الرحم. سير فيريكس لا يحمي من كافة أنواع HPV.

من أنواع ١٦ و ١٨، في التجارب السريرية تم إثبات أن سير فيريكس يمنع الأمراض المتعلقة بـ HPV لدى الفتيات من عمر ٥ سنة وما فوق. سير فيريكس يعرض أيضاً على إنتاج أصداد لدى فتيات بأعمار ٤-٩ سنة. لا يمكن لسير فيريكس أن يسبب تلوثاً ولذلك، لا يمكنه أن يسبب الأمراض الناتجة عن HPV.

سير فيريكس لا يستعمل لعلاج الأمراض التي يسببها HPV والموجودة حالياً أثناء التلقيح.

**(٢) قبل إستعمال اللقاح****لا يجوز إعطاء سير فيريكس:**

- إذا كنت حساسة (الديك البيرجية) لكل واحد من المركبات الفعالة لهذا اللقاح أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها اللقاح (مفصلة في الفقرة ٦). علامات رد الفعل التحسسي قد تشمل طفح جلدي حاك، ضيق تنفس وإنفاس الوجه أو اللسان.
- إذا كنت تعاني من تلوث شديد مع سخونة، من الجائز أن يحتاج الأمر تأجيل اللقاح حتى الشفاء. تلوث بسيط مثل الرشح من غير المفروض أن يشكل مشكلة، ولكن تحذى قبل ذلك مع الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال اللقاح

قبل العلاج بـ سير فيريكس، إحكام الطبيب أو الصيدلي:

- إذا وجدت لديك أي مرض الذي يقلل من مقاومتك للتلوث مثل تلوث HIV.
- قد يحدث إغماء (خاصية لدى المراهقات) في أعقاب أو حتى قبل إجراء أي حقن بابرة. لذلك، إحكام الطبيب أو الممرضة إذا حدث لك أو لطفلك إغماء أثناء إجراء حقن سابقاً.

بال مشاهدة للكتابات، من الجائز لا يحمي سير فيريكس بشكل كامل النساء اللواتي تلقين اللقاح. سير فيريكس لا يحمي النساء من الأمراض الناتجة عن HPV من نوع ١٦ أو ١٨ إذا كانوا قد أصيبوا بالعدوى بـ فيروس الورم الحليمي البشري من نوع ١٦ أو ١٨ أثناء التلقيح.

على الرغم من أن اللقاح من شأنه أن يحميك من سرطان عنق الرحم، فهو لا يشكل بدليلاً للفحوصات المنتظمة لعنق الرحم.

يجب عليك مواصلة التصرف حسب توصية طبيبك بالنسبة لإجراء فحص لطاخة عنق الرحم / لطاخة باب (فحص لقصي حدوث تغيرات في خلايا عنق الرحم الناتجة عن تلوث HPV) وبالنسبة لوسائل الوقاية والحماية.

بما أن سير فيريكس لا يحمي من كافة أنواع فيروس الورم الحليمي البشري، فيجب مواصلة إستعمال وسائل الحذر الملائمة المضادة للتعرض لـ HPV وللأمراض المنتقلة بالإتصال الجنسي.

سير فيريكس لن يحمي من الأمراض الأخرى غير الناتجة عن فيروس الورم الحليمي البشري.

**سير فيريكس والأدوية الأخرى:**

إذا كنت تتناولين، إذا تناولت مؤخراً أو من شأنك أن تتناولين أية أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية أو إذا تناولت مؤخراً أي لقاح آخر، إحكام الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يمكن أن يعطي سير فيريكس مع لقاح داعم مركب بما في ذلك الخناق (d)، الكراز (T) والسعال الديكي [غير الخلوي] (pa) مع أو بدون لقاح ممات ضد شلل الأطفال (IPV)، (اللقيمات dTpa، dTpa-IPV)، أو مع لقاح مركب لإلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع A وإلتهاب الكبد من نوع B أو لقاح لإلتهاب الكبد (hepatitis) من نوع B عوضاً عن الحقن المنفرد (جزء آخر من سمك، في الذراع الأخرى مثلاً) وذلك خلال نفس الزيارة.

من الجائز لا يحدث تأثير مجيء لـ سير فيريكس عند إستعماله مع الأدوية المثبتة للجهاز المناعي.

في التجارب السريرية، وجد أن وسائل منع الحمل الفموية (أقراص منع الحمل) لم تقلل من الحماية التي حققتها سير فيريكس.

**الحمل والإرضا**

لا توجد الكفاية من المعلومات حول إستعمال سير فيريكس خلال فترة الحمل. في حال حصول حمل خلال إجراء سلسلة اللقاحات إستشيري طبيبك. يوصي بتأجيل اللقاح حتى إكمال الحمل.

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، إذا كنت تعطدين بأنثى حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك قبل أن يعطي لك هذا اللقاح.

**السيارة وإستعمال الماكنات**

من غير المتوقع أن يؤثر سير فيريكس على قدرتك على السيارة أو تشغيل الماكنات. مع ذلك، لا يجوز السيارة أو تشغيل أية ماكنات إذا كنت لا تشعررين بحالة جيدة.

**(٣) كيفية إستعمال اللقاح؟**

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

**كيف يعطي اللقاح**

يعطي سير فيريكس من قبل الطبيب أو الممرضة بالحقن العضلي في القسم العلوي من الذراع.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

سير فيريكس مخصص للفتيات من عمر ٩ سنين وما فوق.

العدد الإجمالي للحقنات التي ستلتقيها يتعلق بعمرك أثناء الحقن الأول:

إذا كنت بعمر ٩ سنين حتى ١٤ سنة، فإن سير فيريكس يمكن أن يعطى من قبل طبيبك كسلسلة ذات مقدارين دوائيين:

حقنة أولى: في الموعد الذي تم اختباره

حقنة ثانية: بعد ٦ أشهر من الحقنة الأولى

إذا كنت بعمر ١٥ سنة أو ما فوق فإن سير فيريكس يمكن أن يعطى من قبل طبيبك كسلسلة ذات ٣ مقدارين دوائيين:

حقنة أولى: في الموعد الذي تم اختياره

حقنة ثانية: بعد شهر واحد من الحقنة الأولى

حقنة ثالثة: بعد ٦ أشهر من الحقنة الأولى

عندما يعطي سير فيريكس في المقدار الأول، فيوصى بإعطاء سير فيريكس (وليس لقاح آخر ضد HPV) لإتمام كامل سلسلة اللقاحات.  
 لا يجوز أبداً إعطاء اللقاح داخل الوريد.  
 سير فيريكس غير موصى به لتلقيح فتيات دون عمر ٩ سنين.

إذا فوت مقدار دوائي من المهم أن تتصرفي حسب تعليمات طبيبك أو الممرضة الخاصة بك بالنسبة لمعاودة الزيارات. إذا نسيت العودة لطبيبك في الموعد المحدد، إستشيري طبيبك.  
 إذا لم تتكلمي كافة سلسلة اللقاحات (اثنتين أو ثلاثة حقنات يتعلق الأمر بعمرك أثناء اللقاح)، فمن الجائز ألا تتطور لديك الإستجابة والحماية المثلث من اللقاح.

**(٤) الأعراض الجانبية**

كما بكل دواعي، إن استعمال سير فيريكس قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملات. لا تتداشي من قائمة الأعراض الجانبية.  
 من الجائز ألا تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية التي حدثت خلال التجارب السريرية مع سير فيريكس كانت كما يلي:  
 الاكثر شيوعاً (أعراض جانبية التي قد تظهر لدى أكثر من ١ من بين ١٠ مقدار دوائية من اللقاح):  

- الم أو إنزعاج في منطقة الحقن
- إحمرار أو إنفاس في منطقة الحقن
- صداع
- آلام عضلية، حساسية أو ضعف في العضلات (غير ناتجة عن نشاط بدني)
- إرهاق.

شائعة (أعراض جانبية التي قد تظهر لدى أقل من ١ من بين ١٠٠ مقدار دوائي من اللقاح):

- أعراض جانبية بما في ذلك غثيان، تقيؤات، إسهال وألم في البطن
- حكة، لفخ جلدي أحمر، شرى (urticaria)
- الم في المفاصل
- سخونة (٣٨ درجة مئوية).

غير شائعة (أعراض جانبية التي قد تظهر لدى أقل من ١ من بين ١٠٠٠ مقدار دوائي من اللقاح):

• تلوث في الطرق التنفسية العليا (تلوث في الأنف، في الحنجرة أو في الطرق التنفسية)

- دوار
- ردود فعل أخرى في منطقة الحقن مثل تنوء قاسي، وخز أو خدر.

أعراض جانبية بلغ عنها خلال الإستعمال بعد تسويق سير فيريكس تشمل:

- ردود فعل تحسسية. يمكن تشخيصها حسب:  
  - طفح حاك في راحتي اليدين والقدمين.
  - إنتفاخ في اليدين والوجه.
  - صعوبة في التنفس أو في البلع.
  - هبوط مفاجئ بضغط الدم وفقدان الوعي.

ردود الفعل هذه تحدث عادة قبل مغادرة العيادة. على أية حال، إذا تطور لدى طفلك أي واحد من هذه الأعراض فعليك الإتصال حالاً بالطبيب.

- إنفاس يترافق أحياناً برجفة أو بتصلب.

**(٥) كيفية تخزين اللقاح؟**

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا اللقاح وكل لقاح آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقديري إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقીؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال اللقاح بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في البراد (٨-٢ درجة مئوية). لا يجوز التجميد.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.

**(٦) معلومات إضافية****ماذا يحتوي سير فيريكس**

- المواد الفعالة هي:

20 micrograms  
20 micrograms

50 micrograms  
0.5 milligrams Al<sup>3+</sup> in total

Human Papillomavirus<sup>1</sup> type 16 L1 protein<sup>2,3,4</sup>  
Human Papillomavirus<sup>1</sup> type 18 L1 protein<sup>2,3,4</sup>  
<sup>1</sup>Human Papillomavirus = HPV  
<sup>2</sup>adjuvanted by AS04 containing:

3-O-desacyl-4'- monophosphoryl lipid A (MPL)<sup>3</sup>

<sup>3</sup>adsorbed on aluminium hydroxide, hydrated (Al(OH)<sub>3</sub>)

<sup>4</sup>L1 protein in the form of non-infectious virus-like particles (VLPs) produced by recombinant DNA technology using a Baculovirus expression system which uses Hi-5 Rix4446 cells derived from the insect *Trichoplusia ni*.

- المركبات الإضافية هي:

sodium chloride (NaCl), sodium dihydrogen phosphate dihydrate (NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>.2 H<sub>2</sub>O) and water for injections.

كيف يبدو اللقاح وما هو محتوى العلبة

سير فيريكس هو محلول أبيض عكر.

سير فيريكس متوفّر ضمن قناني لمقادير دوائي واحد (٥ مل)، بعلب ذات ١٠٠ أو ١٠٠٠.  
 سير فيريكس متوفّر ضمن محاذان جاهزة للإستعمال (٥ مل) مع أو بدون إبر، بعلب ذات ١٠ أو ١٠٠ من الجائز ألا تتسوق كافية أحجام العلب.

- صاحب الإمكانيات وعنوانه: چلاکسوسمیتکالین (إسرائيل) م.ض، شارع بازل ٢٥، بيتح - تكفا.
- المنتج وعنوانه: چلاکسوسمیتکالین بیولوژیکالس S.A.، ریکسنسارت، بلجیکا.

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها في قرص ورخص في تاريخ: آب ٢٠١٤

رقم سجل اللقاح في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

١٣٨-٩-٣١٦٧٦