

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו  
בטרם תשתמש/י בתרופה  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר על-ידו בינואר 2012

# ויסקוטירס ג'ל

הרכב:

כל 1 גרי מכל:

Carbomer 2 mg

חומרים בלתי פעילים:

Sorbitol, sodium hydroxide, cetrimide and water  
for injections.

**התוויה/קבוצה תרופוטית:**

תחליף דמעות מלאכותי.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות יתר לכל  
אחד ממרכיבי התכשיר.

**אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא  
לפני התחלת הטיפול:**

אם הינך בהריון או מיניקה.

**איך תשפיע התרופה על חיי היום יום שלך?**

עקב הצמיגות הגבוהה של הג'ל, השימוש בתרופה זו  
עלול להשפיע על חדות הראייה באופן זמני. מטופלים  
הנוהגים ברכב או מפעילים מכונות צריכים להיות  
ערים לאפשרות של הפרעה או שטטוש זמניים  
של הראייה.

**אזהרות:**

יש להקפיד שקצה המיכל לא יבוא במגע עם משטח  
כלשהו, כולל העין, היות וזה יכול לגרום לנזק לעין  
ולזהם את הג'ל.

אין להרכיב עדשות מגע בזמן הזלפת התרופה לעין.  
יש להסיר את העדשות לפני ההזלפה ואין להחזירן  
עד אשר 30 דקות לפחות חלפו.

צטרימידי, החומר המשמר בויסקוטירס, יכול לגרום  
לשינוי בצבע של עדשות מגע רכות.

במידה ואין שיפור לאחר 3 ימים, יש להתייעץ עם  
רופא.

**תגובות בין-תרופתיות:**

לא ידועות אינטראקציות עם ויסקוטירס ג'ל.

**תופעות לוואי:**

תופעות לוואי לתרופה ממחקרים קליניים:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (יופיעו ב- 10% או  
יותר מהמטופלים):** שטטוש ראייה (ארעי), עפעפיים  
דביקים.

**תופעות לוואי שכיחות (יופיעו בפחות מ- 10% ויותר  
מ- 1% מהמטופלים):** גירוי עיניים (ארעי).

**תופעות לוואי מדיוחים ספונטניים (שכיחות אינה  
ידועה):** רגישות יתר (תגובה אלרגית), כאב בעין, נפיחות  
של הג'ל, גרד בעין, נפיחות של העפעפיים (סימן של  
בצקת בעפעפיים), אדמומיות בעין.

בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא  
צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית,  
עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

**מינון מקובל בהיעדר הוראה אחרת מרופא:**

**מבוגרים:** טיפה אחת, 3-4 פעמים ביום, או כמה  
שנדרש כתלות בחומרת המחלה.

**ילדים:** לא נעשו מחקרים מסוימים בילדים.

**קשישים:** אין צורך בהתאמת מינון בקשישים (מגיל  
65 שנים ומעלה).

**שימי לב:**

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

**אופן השימוש:**

יש להחזיק את השפופרת במצב מאונך על מנת  
שהטיפה תצא בקלות.

**ויסקוטירס** מכיל ג'ל שהינו סטרילי עד שבירת המכסה  
המקורי של השפופרת. יש להקפיד שקצה השפופרת  
לא יבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל העין (ראה/י  
סעיף "אזהרות").

רחץ/י היטב את ידיך.

החזק/י את השפופרת במצב מאונך. כך נוצרת טיפה  
קטנה שיוצאת בקלות מפתח השפופרת.

הטה/י ראשך לאחור או שכבי/י על מיטה ובעזרת האצבע  
הרחקי/י מעט את העפעף התחתון מן העין. ספסף/י  
את התרופה לתוך המרווח שיווצר ועפעף/י.

למניעת זיהום הג'ל, הקפד/י שקצה השפופרת לא  
יבוא במגע עם משטח כלשהו, כולל האצבע והעין,  
כיוון שהדבר עלול לגרום לפגיעה בעין ולגרום לזיהום  
הג'ל.

יש לסגור היטב את השפופרת לאחר השימוש.

אם הינך נוטל/ת תרופות מקומיות נוספות לעיניים  
(כגון תרופות לגלאוקומה), יש להמתין לפחות 5 דקות  
בין שימוש בשני התכשירים. מאחר **ויסקוטירס** עלול  
לעכב חדירה של תכשירים מקומיים אחרים לעיניים,  
יש להשתמש תמיד ב**ויסקוטירס** אחרון.

**מענ/י הרעלה:**

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור  
מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך  
תמנע/י הרעלה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה,  
פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבאי/י ארזת  
התרופה איתך.

**אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!  
אין ליטול תרופות בחושך!** יש לבדוק את התוויות והמנה  
**בכל פעם** שהינך נוטל/ת תרופה.

יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

**אחסנה:**

יש לאחסן מתחת ל- 25°C.

אין להשתמש בתרופה יותר מ- 4 שבועות לאחר  
פתיחת השפופרת לראשונה.

יש להרחיק את התכשיר מהישג ידם ומשדה ראייתם  
של ילדים.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות  
נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך  
התפוגה של התכשיר/ו בכל מקרה של ספק, עליך  
להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מספר רישום התרופה:** 101 98 28407 00

**מויצר ע"י:** Dr. Gerhard Mann GmbH, גרמניה,  
עבור נוברטיס פארמה אי ג'י, בזל, שוויץ.

**בעל הרישום:** לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ  
רח' השיטה 8, ת.ד. 3552, פארק התעשייה קיסריה, 38900.

VISC GEL PL SH 010312