

إبرامول بولوس، حبسولات



نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة
(مضمرات) - ١٩٨٦

يسمى الدواء بدون وصفة طبيب

كل حبسولة تحتوي على:

إبرامولول (Paracetamol) ٥٠٠ ملغ
كافيين (Caffeine) ٥٠ ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر - انظر بند ٦.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مختصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل الصيدلي أو الطبيب.

هذا الدواء يعطى دون الحاجة لوصفة طبيب ومخصص للأطفال وللبالغين والأطفال فوق جيل ١٢ فقط تحت هذا الجيل يجب التوجه إلى الطبيب. عليك استعمال الدواء بالشكل الصحيح. استشر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت الشخبة أكثر من ٣ أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا تحسنت بعد أيام بالرغم من استعمال الدواء أو إذا وضع نظيرها بعد أعراض جديدة.

١. لأي عرض مخصص الدواء؟

إبرامول بولوس مخصص لتسكين الآلام وتخفيف الشخبة التي تنتج عن أسباب مختلفة مثل: آلام رأس، آلام الأسنان، زنج، انفلونزا، آلام الروماتيزية وآلام الظهر.

الفوصلة العلاجية:

إبرامولول - يمكن الآلام وتخفيف الحرارة.
كافيين - من مشتقات الكافيين.
كافيين (xanthine derivatives)، يساع على تسكين الآلام.

٢. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت تحت جيل ١٢ سنة.
- كنت حساس (أرجي) للمواد الفعالة (إبرامولول، كافيين) أو لأحد من مكونات الدواء الأخرى أو لمطعم أو منرويات التي تحتوي على كافيين مثل، شاي، قهوة، كولا وشوكولاتة.
- كنت تعاني من فرط ضغط دم، نظم قلب غير منتظم أو قولي.
- كنت تتناول أدوية من إحدى المجموعات التالية: أدوية لفرط ضغط الدم، علاج الكولسترول بما في ذلك أدوية من مجموعة منطبات ميثيل نوبامين أو أوكسيداز (MAOIs)، أدوية التي تسبب النعاس أو أدوية منبهة، أدوية لعلاج الفلق، أدوية التي تحتوي على أفرين (مثل أدوية للربح)، تيونيدون (مشاكل التنفس)، ثايروكسين (مشاكل في الغدة الدرقية)، يسوليبرام (الإيمان على الكحول).
- كنت حامل أو مرضعة.

تحذيرات خاصة المتعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بإبرامول بولوس، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من عانيت في الماضي من خلل وظيفي في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية، خلل في وظيفة الكبد (بما في ذلك المرض كد كحولي) الكلى، جهاز البول، اضطرابات نوم، إيمان على الكحول، برفاق.
- كنت حساس للكافيينات المستعملة بشكل أساسي لعلاج الربو ومرضاض زونية أخرى.
- كنت حساس لأي غذاء أو أي دواء.
- كنت تعاني من التهاب مفاصل وتضطر لتناول مسكنات ألم في كل يوم.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء بفترة مقاربة دون استشارة الطبيب.
- استمع عن تناول جرعة عالية (حتى إذا ضمن الحد الموصى بها) من هذا الدواء وقت الصوم.

يحتوي المستحضر على إبرامولول الذي قد يسبب شرب الكحول في الحالات التالية: اعطي جرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة متصلة شرب مشروبات كحولية خلال فترة العلاج أو عند تناول أدوية إضافية التي تؤثر على قلب الكبد.

لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف الشخبة وتسكين الآلام أو أدوية للربح وتخفيف استشارة الطبيب أو الصيدلي - لمنع جرعة مفرطة/تسمم من البرامولول.

لا يجوز تناول الأدوية إضافية من عائلة إبرامولول و/أو مستحضرات إضافية التي

تحتوي على إبرامولول.

- إذا طورت في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة لتناول مستحضرات التي تحتوي على إبرامولول، لا يجوز تناول مستحضرات التي تحتوي على إبرامولول، لكي لا تسبب مجددا أعراض جلدية وخيمة.

- في حال كان عليك المرور بفحوصات قلب، عليك إيقاف العلاج ٢٤ ساعة قبل الفحوصات لأنه قد يؤثر على نتائج الفحص.

إذا كنت تتناول، أو تناولت في الأونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك على وجه الخصوص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

أدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي مثل: مضادات تشيعة، أمفيتامين، أدوية لعلاج الباركنسون، أدوية لعلاج التهاب مثل منطبات التشنجية لإعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs)، وبوريبيون (مثلا المساعدة في التوقف عن التدخين)، بيوميون وميثيل فنيدرة (مثلا لعلاج اضطرابات في الفقرة أو الإصعاغ والتهرب) وأدوية النوم (مثل رافارين)، أدوية ضد تشنجات العضلات (مثل كاربامايين)، أدوية التي تسرع عمل الإنزيمات الكبد مثل باريورات، غوتيلون أو كاربامايين (المستعملة مبدئيا للصرع للتشنجات ومشاكل نفسية)، وديفاميسين (مضاد حيوي)، وبرونسيد (علاج الفرس)، سيبرين أو ساليبيلات أخرى، أدوية إضافية مسكنة للآلام أو خافضة للشخبة ومضادات التهاب لا ستررويدية.

أدوية لمشاكل في الجيوب الأتفية، مضادات الحساسية (مثل لحمي العلف) وكاستينيدات، ميتوكساليين (الصدفية)، حمض البيبيد (التهالوت).

ميتوكلوبراميد أو دوميبريدون (علاج الثغيان، القيوات ومشاكل معدة أخرى)، كوليسيرامين (لتخفيض مستويات الدهن في الدم) ومستحضرات أخرى التي تحتوي على كافيين، لا يجوز أخذ هذا الدواء جنبا إلى جنب مع مستحضرات أخرى التي تحتوي على إبرامولول (إذا لم تكن متأكدًا بأن أي تناولتي تحتوي على إبرامولول، استشر الطبيب أو الصيدلي).

أدوية لفرط ضغط الدم مثل منطبات ميثيل نوبامين أو أوكسيداز (MAOIs) أدوية التي تسبب نعاس أو أدوية منبهة، أدوية لعلاج الفلق، أدوية التي تحتوي على أفرين، ثايروكسين، يسوليبرام. انظر أيضا بند ٤ لجوز استعمال الدواء إذا:

استعمال الدواء والطعام:

لا يجوز استهلاك قهوة، شاي، كولا، شوكولاتة أو مشروبات أخرى التي تحتوي على كافيين بفترة العلاج بإدواء استهلاكه زائد من الكافيين قد يسبب صعوبات نوم، رجفة، وذقات قلب سريعة.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بالواء بسبب زيادة الاضطراب لضرب في الكبد.

الحمل والإرضاع:

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كنت حامل أو مرضعة.

استعمال لدى الأطفال:

هذا الدواء مخصص للأطفال وفوق جيل

١٢ سنة فقط. انظر بند ٣ على الودين إبلاغ. الطبيب المعالج عن كل الأعراض الجانبية وكل دواء إضافي يعطى للملف.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي، إذا لم تكن متأكدًا.

غيا بم آخر من الطبيب الجرعة الاعتيادية هي:
للبالغين واطفال فوق جيل ١٢: ٢-١ حبسولات كل ٤-٦ ساعات وفقا للحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة من ٨ حبسولات اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها من قبل الطبيب أو الصيدلي.

يجب بلع الدواء مع الماء. يمكن الشرب أو السحق من أجل تسهيل البلع. لكن يجب بلع كل الجرعة. إذا أقرقت بلعًا في تناول الجرعة أو إذا بلغ طفلك من العمر ٦ سنوات فما فوق إلى الطبيب أو أي عرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر عبوة الدواء معك، لا تسبب الفلق، أو تعليمات صريحة من الطبيب. إذا كان شورك جيد، علاج جرح جرح ضروري، بسبب الاضطراب لضرب ضرر وجرح لكبد.

قد تظهر أعراض جانبية مثل: إسهال، زيادة التعرق، شبيه متنبه، غثيان أو قيوات تشنجات، ألم في البطن، انتفاخ الأم أو حساسية في أعلى البطن، التهاب حاد في البنكرياس ومن الممكن أنها لا تعكس الضرر لكبد.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقق من الملصق وضعه الأدوية في كل مرة تتناول فيها دواء. جرح النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

٤. الأعراض الجانبية:

كلل أي دواء، قد يسبب استعمال إبرامول بولوس أعراض جانبية لدى جزء من المستعملين. لا تزد عن قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها. الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية وخيمة:

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فوراً لدى ظهور:
علامات حساسية مثل: طفح حكة في الجلد المصحوب أحيانًا بانفاج الوخ العنق، الشفتين، اللسان، الحلق التي قد تؤدي إلى صعوبات تنفس، قيوات، انتفاخ الأظرف.

- أعراض حساسية الحلقين التي تشمل: الرأس، زنين على اللذان، رجفة عصبية، تهيج مساك، تورم ففك، احمرار قلمي، تورم ذقن قلب سريع أو قوية، تهرب سريع ارتفاع بوترية التبول واضطرابات في الجهاز الهضمي.
- غثيان، انخفاض مفاجئ بالوزن، شبيه متنبه، إسهال، الحجاب والعيون، برفاق أو ألم في أعلى البطن.

إبرامولول قادر على التسبب في حالات نادرة، ظهور أمراض جلدية شديدة التي علاماتها قد تكون: احمرار، طفح، تورم، قروح في الفم، تغير الجلد، إصابة جلدية واسعة. أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضا إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال إبرامولول بدون مشكلا.

- أعراض تغيرات في جهاز الدم مثل: ميل الزئبق، كدمات غير مبررة، تغيرات الهبات بسهولة أكبر.
- أعراض جانبية الناتجة عن جرعة مفرطة (انظر بند ٤ إذا أقرقت بلعًا في تناول الجرعة).

أعراض جانبية إضافية:

في حال أخذت هذا الدواء لفترة زمنية طويلة يمكن أن يظهر الراء، دوار، تعب أو نعاس حتى أسبوع بعد إيقاف العلاج.

قد تفقد أو استمر إذا الأعراض الجانبية أو إذا تفاقمت مع عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة. عليك استشارة الطبيب.

٥. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الوك كل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لمنع التسمم. لا تسبب الفلق دون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) أي يظهر على العبوة، تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من ٢٥ درجة مئوية. حزن بالعبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية:

إضافة إلى المواد الفعالة يحتوي الدواء أيضا على:

Povidone, Croscarmellose sodium, Magnesium stearate, Iron oxide yellow, Titanium dioxide, Polyethylene glycol, Iron oxide red, E-110, Iron oxide black, Carnauba wax.

كل حبسولة تحتوي على ما يقارب ١ ملغ صوديوم.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:

حبسولات نيتية من حط شطر بالجنيتين، أحجام عبوة مضاد عليها التلو: ١٠، ٢٠، ٣٠، ١٠٠، ١٠٠٠ حبسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوة موفرة.

مفوق حصرا من قبل: سوبر فارم (إسرائيل) ج.م.ص، ص.ب. ٧١٧١، يرفسليا ٥١٦٤٧٧٥٦

المنتج وصاحب التسجيل: دكسل ج.م.ص، شارع تكسل ١٠، اور عكفا ٣٠٠٠٠٠٠، إسرائيل

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١٢٧٤٦٠٠٠٧٦٦٠٠

فحصت هذه النشرة وتم تصديقها عليها من قبل وزارة الصحة في ٢٠١٤/٠٤.

التبسيط وتسهيل القراءة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الكلا المعلومات في النشرة مخصصين لكلا الجنسين.