

דאביציקלין 500 וטרנירי
DABICYCLINE 500 VETERINARY
אבקה מסיסה למתן במי שתייה לשימוש וטרנירי בלבד

הרכב:
כל 1 גרם מכיל Oxytetracycline HCL 500 mg

פעילות רפואית:
לטיפול במחלות וזיהומים הנגרמים ע"י חיידקים הרגישים לאוקסיטרציקלין בתרנגולי פטם, תרנגולי הודו ובדגים.

קבוצה תרפויטית:
אנטיביוטיקה רחבת טווח ממשפחת הטרצילינים

מינון והגשה:
לתרנגולי פטם: 40-60 גרם דאביציקלין 500 לכל 100 ליטר מי-שתייה במשך 5-7 ימים, כמקור יחיד למי שתייה.
בהגשה ללהקה: להמיס את הכמות המתאימה של האבקה בכמות מתאימה של מי השתייה.
לתרנגולי הודו: 100 גרם דאביציקלין 500 לכל 100 ליטר מי שתייה במשך 5-7 ימים. אפשר גם להכין תמיסה מרוכזת יותר. יש להכין תמיסה טרייה כל 12 שעות.
לדגים: להגשה ע"י ערבוב במזון. המינון המומלץ: 150 גרם דביציקלין 500 לכל 1 טון דגים משקל חי. משך הטיפול: 10 ימים. צריכת המזון משתנה בהתאם לטמפרטורת המים. לצורך התאמת המינון לקצב צריכת המזון יש להיוועץ ברופא הווטרינר.

אזהרות:
אין להשתמש במטילות. אם לא חל שיפור תוך 24-48 שעות מתחילת הטיפול, יש לערוך אבחון מחדש.
זמני המתנה – יש להפסיק את הטיפול בתרנגולי פטם 4 ימים לפני השחיטה ובתרנגולי הודו 5 ימים לפני השחיטה.
זמן המתנה בדגים: 400 ימי מעלה (או 20 יום ב-23°C).
מינון יתר עלול לגרום לשאריות בבשר מעבר לזמן ההמתנה.

תופעות לוואי:
עלולים להתפתח זיהומים משניים של פטריות וחיידקים עמידים לתכשיר.

תגובות בין תרופתיות:
לא מומלץ להשתמש בו זמנית עם תכשירים המכילים פניצילין.

חייב מרשם רופא

אחסון: מתחת ל- 25°C

מספר פריט:

מס' אצווה:

משקל אריזה:

ת. תפוגה:

מס' רישום: 0726291206-03

היצרן ובעל הרישום: אביק תוצרים וטרניריים בע"מ, ת.ד. 489, אזור תעשייה בית שמש