

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

هذا الدواء ملزم بوصفة طبيب

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها

فُحص ورُخص من قبلها في تشرين الثاني ٢٠١٢

نازونكس بخاخ للأنف

التركيب: كل مقدار دوائي معاير يحزر:

Mometasone Furoate 50 mcg

المواد غير الفعالة:

Dispersible Cellulose BP 65 cps, Glycerol, Citric acid monohydrate, Sodium citrate dehydrate, polysorbate 80, Benzalkonium chloride solution, purified water.

الفصيلة العلاجية: كورتيكوستيرويد لإعطاء موضعي في الأنف.

تأثيرات الدواء الطبية:

يحتوي البخاخ نازونكس على موميتازون فوروات، الذي ينتمي إلى فصيلة من الأدوية تعرف بإسم ستيروئيدات ومخصص لمعالجة الزكام الأليرجي الموسمي أو الرشح الأليرجي السنوي لدى الكبار والأطفال ما فوق ٣ سنين من العمر.

لمنع الرشح الأليرجي الموسمي قبل موعد بدء فترة غبار الطلع بـ ٢ - ٤ أسابيع لدى الكبار والأطفال ما فوق ١٢ سنة من العمر والذي يعانون من سوابق للرشح الأليرجي الموسمي.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز إستعماله إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

لا يجوز لك إستعماله إذا وجد لديك تلوث في الأنف أو إذا أجريت في الآونة الأخيرة فيه عملية جراحية أو إذا أصبت بجرح في الأنف.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في الثلث الأول/الأخير من الحمل أو في فترة الرضاعة. إذا عانيت في الماضي أو كنت تعاني/ن من السل في المجاري التنفسية.

إذا كنت تعاني/ن من تلوث فطري، جرثومي أو فيروسي، أو من تلوث فيروسي في العين من نوع العقبولة البسيطة - هريس، أو من جروح في الأنف.

تحذيرات:

أبلغى طبيبك إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة. لا يوصى بالإرضاع أثناء فترة العلاج بـ نازونكس. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء. أما إذا مضى على إستعمالك لهذا المستحضر عدة أشهر، فعليك مراجعة الطبيب لفحص التغيرات التي قد تطرأ على مخاطيات الأنف.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافيًا، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، خاصةً إذا كنت تستعمل/ين أدوية ستيروئيدية أخرى متناولة عن طريق الفم أو بالحقن أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. إذا كنت تستعمل/ين أدوية ستيروئيدية متناولة عن طريق الفم أو بالتسريب الوريدي، تجنب/ي من التعرض لمرض جذري الماء والحصبة.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كالصداع، رعاف من الأنف، حرقان أو تهيج داخل الأنف، العطاس، آلام في الحنجرة، اضطرابات في المذاق والشم.

الأعراض الجانبية التي تفتضي إهتمامًا خاصًا:

إذا حدث ردود فعل أليرجية كظهور خرخرة أو صعوبة في التنفس فترة قصيرة بعد تناول الدواء توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب. إذا حصل تلوث فطري في الأنف و/أو في الحنجرة والذي يرافقه تهيج متواصل في الأنف و/أو في الحنجرة (نادرًا): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

المقادير الدوائية:

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط.

المقادير الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لل كبار والأطفال من عمر ١٢ سنة: المقادير الإعتيادية هي كبستان في كل منخر مرة في اليوم. عندما تستقر الأعراض، فالطبيب قد يوصي بإستعمال كبسة واحدة في كل منخر مرة في اليوم.

للأطفال بعمر ٣ حتى ١١ سنة: المقدار الإعتيادي هو كبسة واحدة في كل منخر مرة في اليوم. لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.

يجب إستعمال هذا الدواء في أوقات محددة حسب تعليمات الطبيب المعالج.

إذا حدث ونسيت إستعمال المقدار الدوائي في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب إستعماله حالاً ولكن لا يجوز إستعمال مقدارين معاً في أي حال من الأحوال!

إرشادات الإستعمال:

خض/ي جيداً، إفحص/ي للتأكد من عدم وجود ضرر تشاهده العين المجردة بالبخاخ للأنف قبل الإستعمال . من أجل الحصول على بخة متجانسة، أثناء الرش، يجب البخ ١٠ مرات (من أجل ضبط المضخة) قبل إستعمال البخاخ للمرة الأولى. عندما تظهر بخة متجانسة، المضخة جاهزة للإستعمال. لا يجوز إستعمال البخاخ بعد بخ ١٢٠ مرة أو بعد مرور شهرين من بدء إستعمال البخاخ.

نظف/ي القسم الداخلي من الأنف بلطف. بخ/ي من الدواء في كل منخر بالتناوب ورأسك منحنى نحو الأسفل وذلك على الشكل التالي: عند القيام بالإستنشاق بواسطة الأنف، أكبس/ي على المضخة بسرعة وبقوة . إنتظر/ي ٣ - ٥ دقائق؛ كرر/ي هذا العمل إذا لزم الأمر. إغسل/ي فوهة البخاخ بالماء الساخن، مع الحرص على عدم إدخاله إلى داخل القنينة. نشّف/ي الفوهة بواسطة منديل من الورق النظيف وإغلق/ي القنينة بإحكام. في حالة عدم استعمالك بمضخة البخاخ لمدة ١٤ يوماً أو أكثر يجب ضبط المضخة ثانية بواسطة بختين في الهواء حتى تُشاهد كمية متجانسة من البخاخ تخرج مع كل كبسة.

لمنع إنتشار التلوث - لا تستعمل/ي ذات القنينة لأكثر من شخص واحد.

كيف تستطيع/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟

لا تتوقف/ي عن إستعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. إذا أفرطت في إستعمال المقادير الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تنس/ي التقيد بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك، وقد يسبب الضرر لمريض آخر.

لا تعط/ي من الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة:

يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين:

لا يجوز التجميد. أبعدي المستحضر عن مصادر الحرارة. خزن/ي في مكان بارد في درجة حرارة ٢ - ٢٥ درجة مئوية.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين.

الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. لا يجوز إستعمال المستحضر بعد إنتهاء تاريخ

الصلاحية! في حالة الشك! عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٠٩-٨٥-٢٩٢٧٧-٠٠

المنتج: شيرينج - بلاو لابوا إن. في.، هيسيت - أوب - دن - برچ، بلجيكا.

صاحب الإمتياز: شركة ميرك شارپ ودوم (إسرائيل - ١٩٩٦) م.ض.،

/ ص.ب. ٧١٢١ / بيتح - تكفا ٤٩١٧٠