

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ
С ФАРМАЦЕТИЧЕСКИМИ
СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) - 1986**
Внимательно и полностью прочтите
инструкцию
перед применением препарата.
Формат данной инструкции установлен
Министерством здравоохранения,
содержание проверено и утверждено.

КАЛЬЦИУМ САНДОЗ **500 мг**



NOVARTIS

Шипучие растворимые таблетки

Состав:

Каждая таблетка содержит:

Активные компоненты и их количество:

Calcium Lactate Gluconate 1.132 г

Calcium Carbonate 0.875 г

(Эквивалентно 500 мг доступного кальция)

Неактивные компоненты:

Каждая таблетка содержит 68.45 мг натрия.

Citric acid anhydrous, Macrogol 6000

(Polyethylene glycol 6000), Orange

flavor powder, Aspartame, Sodium

hydrogen carbonate, Magnesium stearate.

Терапевтические действия:

Добавка кальция при его недостаче и в
периоды повышенной необходимости в
кальции.

Когда нельзя применять препарат?

Противопоказано применение
препарата при чувствительности к одному
из его компонентов.

Противопоказано применение
препарата в следующих случаях избытка
кальция в крови, избыток кальция в
моче, тяжелая почечная недостаточность,
камни в почках, саркоидоз, боли в животе
и рвота.

**Не применяйте препарат без
предварительной консультации
с врачом:**

Если Вы беременны в первой или
последней трети беременности или
коринте грудью.

Если Вы страдаете или страдали в
прошлом нарушениями функций: печеней,
почек и мочевыделительной системы или
камнями в мочеиспускательном канале,
системы пищеварения (например, язвой,
зияющим кишечком, запорами или
геморроем), обезвоживанием или
дисбалансом электролитов в крови,
щитовидной железы (тиреоид),
фенилкетонурией (препарат содержит
асpartам).

**Какое влияние может оказывать препарат
на Вашу повседневную жизнь?**
Вам следует воздержаться от
чрезмерного употребления табака,
спиртных напитков или напитков,
содержащих кофеин.

Предосторожности:

Нельзя принимать данный препарат часто
или на протяжении длительного времени,
не проконсультировавшись с врачом.
При продолжительном лечении или
при использовании больших количеств
препарата следует сделать анализ уровня
кальция в крови.

При повышенной чувствительности к
какому-либо виду пищи или лекарственному
препаратору, особенно к препаратам,
содержащим кальций, Вы должны
сообщить об этом врачу до начала
применения препарата. Следует избегать
употребления витамина D в больших
количествах в период приема кальция.

Взаимодействие с другими препараторами:

Если Вы принимаете другой препарат,
или если недавно закончили лечение
другим препаратом, сообщите об этом
лечащему врачу в целях предотвращения
 опасности или неэффективности
лечения, связанных с взаимодействием
с другими лекарствами. В особенности
это касается следующих групп лекарств:

мочегонные средства типа тиазидов,
кортикоиды, дигиталис (для сердца),
лекарства, содержащие кальций
и другие кальциевые добавки, другие
препараторы, содержащие витамин D,
антибиотики типа тетрациклинов, приемлемые
внутри (их следует принимать как минимум за 2 часа
до или через 4-6 часов после приема
Кальциум Сандоза 500 мг), бисфосфонат
или фтористый натрий (их следует
принимать как минимум за 3 часа до
приема Кальциум Сандоза 500 мг).

Побочные явления:

Кроме желаемого эффекта, во время
использования препарата могут
возникнуть следующие побочные
явления: редко - расстройства
пищеварительной системы (понос, запор,
вздутие живота, рвота и боли в животе);
очень редко - избыточное содержание
кальция в крови (гиперкальциемия),
аллергические реакции (сыпь, зуд).
Если указанные выше побочные явления
усиливаются, а также в любом случае
появления у Вас побочных эффектов,
не указанных в данной инструкции,
либо в случае изменения в общем
самочувствии, следует немедленно
проконсультироваться с врачом.

**Побочные явления и взаимодействие
с другими препаратами у детей:**
Родителям следует сообщить лечащему
врачу о любых побочных явлениях,
а также о любом дополнительном
препараторе, принимаемым ребенком!
Ознакомьтесь с побочными явлениями
и взаимодействиями с другими
лекарствами, приведенными выше.

Дозировка:

Дозировка устанавливается в соответствии
с питанием.

Принятая дозировка при отсутствии
других рекомендаций врача:

Дети старше 10 лет и взрослые: 1-2
таблетки в день.

Дети в возрасте до 9 лет: 1 таблетка в день.
Нельзя превышать рекомендуемую
дозировку.

Следует принимать лекарство в
определенные интервалы времени,
установленные лечащим врачом.

Если Вы забыли принять лекарство в
положенное время, примите одну дозу
сразу, как только вспомните об этом. Ни
в коем случае нельзя принимать двойную
дозу сразу!

Препаратор разрешен для употребления
больным диабетом.

Обратите внимание:

Должно пройти два часа между приемом
данного препарата и приемом пищи,
 богатой фруктовой или щавелевой кислотой
(как например, шпинат; пища, содержащая
волокна, например: отруби; хлеб из муки
богатой пшеницы и злаками).

**Не вызывайте рвоту, не получив на это
указаний врача!**

**Не принимайте препарат в темноте! При
каждом приеме препарата прочтите
этикетку и проверьте дозировку. При
необходимости пользуйтесь очками.**

Хранение:

Препаратор следует хранить при температуре
ниже 25°C.

Следует плотно закрыть препарат, чтобы не
допустить проникновения воздуха и влаги.
Даже при соблюдении рекомендуемых
правил хранения, срок хранения
лекарства ограничен. Пожалуйста,
 обратите внимание на дату истечения
срока годности препарата!
При возникновении сомнений
проконсультируйтесь с фармацевтом,
 выдавшим препарат.

Нельзя хранить разные лекарства в одной
упаковке.

**Номер регистрационной лицензии
лекарственного препарата: 1407231523**

**Производитель: Новартис Консьюмер
Хелп, Швейцария.**

**Владелец лицензии: NCH Ltd., ул.
Ха-Мефальсим 14, Петах-Тиква.**