

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו-1986

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ליקויפילים דמעות

תמיסה לעיניים

החומר הפעיל: פוליוניל אלכוהול 1.4%

חומרים בלתי פעילים: נג עיין בסטנץ 6- מידע נוסף

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא. עליך להשתמש בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות אל הרופא אם תופעות המחלה מחמירות או לא משתפרות תוך 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

ליקויפילים טירס הוא תחליף דמעות. התכשיר מכיל חומר סיכה שנקרא פוליוניל אלכוהול. טיפות עיניים אלה משמשות להקלה בסמפטומים של עין יבשה (כגון כאב, צריבה, גירוי או יובש) אשר נגרמים כאשר יצירת הדמעות אינה מספקת.

קבוצה תרופית: חומרי סיכה לעין.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פוליוניל אלכוהול או לאחד המרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה רשימת המרכיבים של עלון פעילים בסטנץ 6: מידע נוסף).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- הפסק את השימוש בליקויפילים טירס ופנה אל הרופא אם:
- אתה חש אדמומית ממושכת או גירוי ממושך של העין, כאב בעין, שינויים בראייה.
- מצבך מחמיר או לא השתפר אחרי 3 ימים של טיפול בליקויפילים טירס.

אם אתה מרכיב עדשות מגע רכות, הנך חייב להסירם לפני השימוש בליקויפילים טירס. אחרי השימוש בליקויפילים טירס עליך לחכות לפחות 15 דקות לפני החזרת העדשות לעיניים. דבר זה חשוב, מכיון שאחד המרכיבים בליקויפילים טירס, הנקרא במלוקניום כלוריד, עלול לגרום גירוי בעין ולשמת את צבען של עדשות מגע רכות.

אם אתה לוקח, או לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אם עליך להשתמש בתכשיר אחר לעיניים בזמן הטיפול בליקויפילים טירס, השתמש תחילה בו, חכה 15 דקות וזוהי השתמש בליקויפילים טירס.

הריון ונקה: השימוש בליקויפילים טירס מותר בהריון ובהנקה.

נהיגה: ראייתך עלולה להיטשטש לזמן קצר מיד אחרי השימוש בליקויפילים טירס. אין לנהוג או להפעיל מכונת עד שראייתך מתבהרת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

- טיפה או שתי טיפות בכל עין מטופלת לעיתים לפי הצורך.
- אין לבלוע!
- **אם נטלת מנת יתר,** מינון יתר לא יגרום נזק.
- **אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש,** קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול:

אל תשתמש בתרופה אם חותם הבטיחות שעל צוואר הבקבוק קרוע לפני הפתיחה הראשונה.

כיצד להשתמש בטיפות:

רחץ את ידך לפני פתיחת הבקבוק. הטה את ראשך לאחור והבט אל התקרה.



1. משוך, בעדינות, כלפי מטה את העפעף התחתון של העין הזקוקה לטיפול ליצירת מעין "כיס".
2. הפוך את הבקבוק כלפי מטה. חלץ על הבקבוק כדי לשחרר טיפה אחת לתוך הכיס.
3. הרפה מהעפעף ומצמץ מספר פעמים. לטפטוף של טיפה שניה חזור על שלבים 2 ו-3.
4. חזור על שלבים 1 עד 3 בעין השנייה אם גם היא זקוקה לטיפול.

אם טיפה לא נכנסה לעין, נסה/י שוב.

כדי להימנע מזיהום של טיפות העיניים, אין לחת לקצה הבקבוק לגעת במשטח כלשהו (כולל העין עצמה והאצבע). יש לשגור את הבקבוק היטב לאחר השימוש.

- אין ליטול תרופות בחושך! בודק תהויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.
- אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו לכל תרופה, השימוש בליקויפילים טירס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק את השימוש בליקויפילים טירס ופנה אל הרופא מיד אם:

- אתה חש אדמומית ממושכת או גירוי ממושך של העין, כאב בעין או שינויים בראייה.
- מצבך מחמיר או לא השתפר אחרי 3 ימים מתחילת הטיפול בליקויפילים טירס.

היוועץ ברופא אם הינך מוטדד מרוב שאתה חש כאב בעין, יצור מוגבר של דמעות, אדמומית בעיניים, תחושה של גוף זר בעין, תגובה אלרגית של העין, עקצוץ לזמן קצר, גירוי או צריבה בעין מיד לאחר הזלפת הטיפות.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרתי בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי הקרטון/תווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-25°C. אין לקרר או להקפיא.
- יש להשליך את הבקבוק אחרי 28 ימים מיום פתיחת התכשיר גם אם נשארו בו טיפות.
- אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם חומרים בלתי פעילים: Sodium Phosphate Dibasic, Sodium Chloride, Sodium Phosphate Monobasic, Edetate Disodium, Benzalkonium Chloride, Purified Water. May also contain Hydrochloric Acid or Sodium Hydroxide to adjust pH.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

ליקויפילים טירס היא תמיסה סטרילית, שקופה וחסרת צבע בבקבוק פלסטי עם פקק הברגה בעל סגר בטיחות. כל בקבוק מכיל 15 מ"ל תמיסה של טיפות עיניים. כל אריזה מכילה בקבוק אחד. האריזה מכילה בקבוק בנפח 15 מ"ל.

שם היצרן: Allergan Pharmaceuticals Ireland

בעל הרישום: אלרגן ישראל בע"מ

שם היבואן: טרדיס נת בע"מ ת.ד. 7775 פתח תקוה 49170

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך יוני 2013

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 598122290

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.