

هيرجن%

محلول لمعالجة فروة الرأس موضعياً

التركيب:

المادة الفعالة: مينوكسيديل 5% Minoxidil 5%

المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر

- أنظر في الفقرة ٦.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أستهلاك إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

المستحضر مخصص للرجال بأعمار ١٨-٦٥ سنة في حالات الصلع من النوع الوراثي فقط. عليك الإستعمال على الشكل الصحيح. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

إن دهن المستحضر على جلد فروة الرأس يؤدي إلى توقف سقوط الشعر وإلى نمو الشعر في حالات الصلع لدى بعض مستعملين المستحضر. لقد ثبتت من الأبحاث التي أجريت حتى الآن، أن ٣ من بين ٥ رجال الذين يستعملون مينوكسيديل لمدة ٤٨ أسبوعاً يبلغوا عن حدوث نمو في الشعر.

إن المستعملين الشبان و/أو الذين بدأوا مسيرة الصلع لديهم قبل فترة قصيرة و/أو الذين منطقة الصلع لديهم ليست واسعة يمكن أن يحصلوا على نتائج أفضل.

إذا بدأت مسيرة الصلع قبل عدة سنوات و/أو إذا كانت مساحة الصلع واسعة، فإن فرص نجاح العلاج تكون منخفضة.

إن مسيرة نمو الشعر، بالمشابه لمسيرة الصلع وتساقط الشعر، هي مسيرة مطولة، ولذلك يجب إستعمال المستحضر لمدة شهرين على الأقل من أجل تقييم نمو الشعر من جديد. إذا كنت لا ترى تحسناً بعد عدة أشهر، يجب مراجعة الطبيب المعالج. إن إجراء تقييم كامل لتأثير المستحضر يمكن فعله فقط بعد مضي سنة من العلاج، ولذلك إذا كنت لا ترى تحسناً في نمو الشعر بعد سنة من الإستعمال، فيجب التوقف عن العلاج.

المقدار الدوائي اليومي الأعظمي هو ٢ مل: ١ مل في الصباح و ١ مل في المساء (١ مل = ٧ بخات).

إن الإستعمال المتكرر و/أو إستعمال كمية أكبر لا يزيد من نمو الشعر ولكنه قد يسبب أعراضًا جانبية أكثر لا بل من شأنه أن يسبب أعراضًا جانبية تتعلق بانخفاض ضغط الدم، مثل: ألم في الصدر، دوار، إغماء، تسارع نظم القلب، إنتفاخ الأطراف. في حال ظهور أحدى تلك الأعراض يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب فوراً. يجب المراقبة على العلاج بحسب التعليمات. لا يجوز الإستعمال على مناطق أخرى من فروة الرأس.

إن إستعمال المستحضر هو طويل الأمد.

إن التوقف عن العلاج قد يؤدي إلى تجدد مسيرة تساقط الشعر خلال ٤-٦ أشهر.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

المستحضر مخصص لإنبات شعر فروة الرأس لدى رجال أصحاء بأعمار ١٨-٦٥ سنة وذلك في حالات الصلع الوراثي فقط. يجب إستشارة الطبيب المعالج للتأكد أن نوع تساقط الشعر لديك مناسب للعلاج بهذا المستحضر.

الفصيلة العلاجية: من موسعات الأوعية الدموية، للإعطاء الموضعي، لمعالجة تساقط الشعر.

(٢) قبل إستعمال الدواء

☒ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت إمراة.
- عمرك أقل من ١٨ سنة أو أكبر من ٦٥ سنة.
- كنت حساساً (اليرجي) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ٦).
- تساقط الشعر الذي تعاني منه ليس على خلفية وراثية (مثلاً: تساقط مفاجئ وغير متوقع، تساقط ناتج عن علاج دوائي).
- كنت أصلع تماماً أو أن كل شعر جسمك قد تساقط.
- كنت تعاني من إرتفاع ضغط الدم، حتى ولو لم يكن معالج.
- كنت تعاني من آية مشكلة تؤثر على جلد فروة الرأس (مثل: حروق الشمس، الصدفية والخ).
- كنت تحلق فروة رأسك.
- كنت تستعمل كريمات، مرهمات أو مطريات على شتى أنواعها المخصصة لمعالجة مشاكل فروة الرأس، مثل: ديتراونول - لعلاج الصدفية، تريتيونيلين المخصص لمعالجة حب الشباب، الكورتيكوستيروئيدات - مواد مضادة للالتهاب، مثل: هيدروكورتيزون، بيتميتابلون، بارافين - مركب شائع في كريمات الشعر.
- لديك ضماد من أي نوع كان على فروة الرأس.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- إذا كنت تعاني أو عانيت من خلل في الأداء الوظيفي للقلب (يشمل اضطرابات في نظم القلب، ذبحة صدرية أو ألام في الصدر و/أو مشاكل في جريان الدم و/أو إرتفاع ضغط الدم)، الكلية، جهاز الدم (مثل التخثر والخ).
- يجب التأكد قبل إستعمال الدواء من أن جلد فروة الرأس سليم وغير متضرر.
- إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء فعليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل إستعمال الدواء.

! إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إلحظ للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأشخاص بالنسبة للأدوية من المجموعات التالية:

- لعلاج إرتفاع ضغط الدم (مثل: هيدرالازين) - خشية زيادة تأثيرها.
- للعلاج الموضعي بفروة الرأس.

!**الحمل والإرضاع**

الدواء مخصص للرجال فقط.

!**التدخين**

المستحضر قابل للإشتعال، لذلك لا يجوز التدخين بالمقربة منه.

! معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء من شأن المركب بروبيلين چليکول الموجود في المحلول أن يسبب تهيج جلد فروة الرأس.

يحتوي المستحضر أيضاً على الكحول، الذي من شأنه أن يسبب حرقة إذالامس العينين. في حال دخل المستحضر إلى العينين، الفم أو إذالامس جلد متضرر، فيجب شطف المنطقة تحت تيار من ماء الصنبور.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيقاظ من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الكمية العظمى للعلاج هي ٢ مل في اليوم: ١ مل في الصباح و ١ مل في المساء (١ مل = ٧ بخات). يجب الفصل ١٢ ساعة على الأقل بين إستعمال واحد للثانية.

ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء،
إستشر الطبيب أو الصيدلي.

إن الإستعمال المتكرر و/أو بكمية أكبر لا يزيد من نمو الشعر ولكن قد يسبب أعراضًا جانبية أكثر، لذلك يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي بواسطة عدد البخات الموصى به.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.


يجب إستعمال المستحضر على شعر وفروة رأس جافين، بكمية إجمالية قدرها ١ مل على كل مناطق الصلع. إذا أمكن، يجب البدء بمركز الصلع ويجب بغثرة المادة يابصع نظيفة. بعد الدهن يجب شطف اليدين جيداً. يجب الإمتناع عن تنقيط المستحضر على الوجه أو على مناطق جلدية خارج منطقة الصلع. إذا سكب بالخطأ على منطقة غير فروة الرأس فيجب الشطف جيداً.

بعد إستعمال المستحضر: يجب الإمتناع عن شطف الرأس لمدة ساعتين تقريباً. لا يجوز إستعمال مجفف الشعر لتسريع تجفيف الشعر من محلول. لا يجوز وضع الرأس على الوسادة على الأقل ساعة بعد دهن فروة الرأس. يجب الإمتناع عن تعريض الشعر للشمس.

يجب الإستعمال بواسطة بخاخ مطاول (مرفق بالعلبة) لمعالجة أماكن الصلع المغطاة جزئياً بالشعر:



(ج) يجب مسك القنية بشكل أدق وبخ محلول على المنطقة المعالجة. إن كمية محلول الإجمالية التي يتم إستعمالها (على كامل مناطق الصلع سوية) هي ٧ بخات على الأكثر.



من الجائز أن يbedo النمو الأولي للشعر طري وأذغر ولكن في نهاية الأمر سينمو الشعر كشعر عادي.

إذا نسيت دهن الدواء في الوقت المطلوب، يجب دهن مقداراً دوائياً حال تذكرك، ولكن ليس إذا نسيت قريباً الموعود العلاج التالي. لا يجوز إستعمال مقداراً دوائياً مضاعفاً.

كيف يمكن المساعدة في نجاح العلاج؟

يجب دهن المستحضر فقط عندما تكون فروة الرأس والشعر جافين تماماً. يجب المواطبة على العلاج بحسب التعليمات. من شبه المؤكد أن يؤدي التوقف عن العلاج إلى تساقط الشعر الذي نما وإلى تجدد مسيرة تساقط الشعر خلال ٤-٣ أشهر.

الفحوص والمتابعة

خلال فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوص الدم، البول، وظائف الكلى، القلب والجهاز التنفسى. يجب أن تكون يقطنين بالنسبة للتغيرات على الشعور العام وعلى الحالة الصحية. إذا كنت حساساً لأي طعام أو لا يدي فعليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل إستعمال الدواء. يجب إجراء وزن للجسم مررتين في الأسبوع، في حال حدوث إرتفاع مفاجئ للوزن فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب. يجب على مرضى القلب و/أو مرضى إرتفاع ضغط الدم، المعالجون بهذا الدواء، أن يخضعوا للمراقبة الطبية خلال كامل فترة العلاج. لا يجوز الإستعمال إذا كانت فروة الرأس ملتهبة، متهدجة و/أو حمراء أو أثناء العلاج بمستحضر آخر.

إنتبه: لا يجوز البخ، هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط على فروة الرأس. يجب تجنب إستنشاق البخاخ.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عليه الدواء معك. لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال المستحضر قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا تطور واحد أو أكثر من الأعراض التالية:

- تهيج/احمرار، الإلتهاب أو طفح موضعين متواصلاً و/أو شدفين، حب الشباب، وذمة في مناطق مختلفة من الجسم، إنتفاخ في الوجه، خدر في الرجلين، في اليدين أو في الوجه، إنتفاخ الأطراف، آلم في الصدر، ضيق أو صعوبات في التنفس، دوار، إغماء، تسرع ضربات القلب، ضغط دم منخفض، صداع، إرتفاع مفاجئ ومجهول السبب في الوزن، قلة خلايا الدم البيضاء (Leukopenia).

• قد يظهر تساقط الشعر عند بداية العلاج (٦-٢ الأسابيع الأولى للعلاج) ويستمر لأكثر من أسبوعين.

• في حال عدم زوال أعراض معينة مثل: إحمرار موضعي في منطقة العلاج، حكة، جفاف فروة الرأس، قشرة (يقصد غالباً بأعراض عابرة).

• تغير في لون أو قوام الشعر.

أعراض جانبية إضافية التي تظهر في أوقات متقاربة:

• نمو شعر في أعضاء أخرى من الجسم، بما في ذلك على الوجه.

• حكة، تشمل طفح حاك في منطقة دهن المستحضر و/أو حكة في أجزاء مختلفة من الجسم (تشمل العينين).

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادى إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة والقنية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين دون ٢٥ درجة مئوية.

• المنتج قابل للإشتعال. يجب إبعاده عن مصادر النار و/أو الحرارة.

• يجب الإستعمال خلال شهر بعد الفتح للمرة الأولى.

٦) معلومات إضافية

• يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Ethanol (alcohol), propylene glycol and purified water.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

تحتوي كل قنية على ٦٠ مل محلول. تحتوي العلبة أيضاً على بخاخ مطاول.

• أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها فحص ورخص في تاريخ: نيسان ٢٠١٤

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٢٨٣-٢٨١٤٨٥

• صاحب الإمتياز، المنتج وعنوانه: بيريلجو إسرائيل فارماسيтика م.ض.، ص.ب. ١٦، يروحام.