

مونورول

مسحوق لتحضير محلول للشرب
كيس

التركيب:

المركب الفعال:

كل كيس يحتوي على: 3 g

Fosfomycin (as trometamol)

المركبات الغير فعالة

Sucrose, mandarin flavour, orange flavour, saccharin.

كل كيس يحتوي على ما يقارب ٢,٢ غرام سكرور و ١٦ ملغم سكارين.

المجموعة العلاجية: مضاد حيوي

الفعالية الطبية:

الدواء مخصص للعلاج كجرعة لمرة واحدة بدلؤث في المساكن البولية، وكذلك للعلاج الوقائي باللتئمات الناجحة عن الإجراءات الجراحية أو التشخيصية في المساكن البولية السغلية.

متى لا يجوز استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كانت معرفة حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز استعمال المستحضر إذا كنت تعاني من قصور كلوي أو إذا كنت مريض ديار (غسيل كلوي).

لا يجوز استعمال الدواء دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج في الحالات التالية:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

إذا كنت تعاني أو أعيتني في الماضي من خلل بوظيفة الكلى/جهاز البول، أو

إذا كنت تعاني من السكري.

كيف سيؤثر الدواء على حياتك اليومية؟

استعمال هذا الدواء قد يسبب دوخة. إذا شعرت بالدوخة عليك الحذر خلالقيادة المركبة، عند تشغيل آلات خطرة وبكل نشاط يتطلب اليقظة.

تحذيرات:

إذا كنت حساساً لغذاء ما أو دواء ما، فعليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل تناول الدواء.
يحتوي مونورول على السكر (سكروز).

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تناول أدوية إضافية بما في ذلك الأدوية التي تباع دون وصفة طبية وإضافات غذائية، أو إذا أنهيت للتو العلاج بدواء آخر، فيجب عليك إعلام الطبيب المعالج، وذلك لنفاد الأخطار أو عدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين الأدوية، خاصة بالنسبة للأدوية من المجموعات التالية: مضادات المُحْمَّضة، أملاح الكالسيوم، أدوية تزيد المُرْكَبة في الجهاز الهضمي مثل، ميتوكلوپراميد (صد الفشان).

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى العالقة المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله تأثيرات جانبية مثل، إسهال، صداع، آلام بطن، غثيان، تقيؤ، اضطرابات بالஹم، دوران، طفح، تغز حكة، شرى، (تشلل)، تعب.

أغلبية هذه الأعراض تتوقف عادة خلال فترة وجيزة.
إذا لم تختفي الأعراض الجانبية أو كانت تسبب المضايقة، يجب استشارة الطبيب.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

في حال ظهور رد فعل آليريжи (طفح أو حكة وخيمين، وذمة، صعوبة التنفس)، إسهال شديد أثناء تناول الدواء أو بعده، التهاب المُهبل، ارتفاع ضغط القلب، انخفاض ضغط الدم، ضيق النفس - توجيه إلى الطبيب فوراً! في حال أحستت بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام فيجب عليك استشارة الطبيب فوراً.

الجرعة:

هذا الدواء غير مخصوص عادة للرضع والأطفال ما دون ١٢ سنة وأو لمرضي وزنهن أقل من ٥ كجم.
الجرعة حسب تعليمات الطبيب فقط. لا يجوز خاوز الجرعة الموصى بها.

الجرعة المتبقية عادة هي:

العلاج عدوى المساكن البولية - هذا الدواء يعطى كجرعة لمرة واحدة.

العلاج الوقائي: كيس واحد ٣ ساعات قبل الإجراءات الجراحية أو التشخيصية وكيس واحد ٤٤ ساعة بعد ذلك.

كيفية الاستعمال:

يجب سكب محتوى الكيس كله للكأس مليئة أو كل مشروب غير كحولي آخر، وخلطه جيدا حتى إذابة المحسووق. يجب فوراً شرب محتوى الكأس كله. يجب تناول الدواء على معدة فارغة، ما يقارب الساعتين حتى ثلاث قبل الوجبة أو بعدها، من المفضل قبل النوم بعد تفريغ المثانة. بعد تناول مونورول متوقع التحسن خلال ٣-٤ أيام.

كيف يمكنك المساعدة بنجاح العلاج؟

يجب عليك إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب.

تجنب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وبذلك تمنع التسمم. إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل من الدواء بالخطأ، فيجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحبًا عبوة الدواء معك.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك؛ وقد يسبب الضرر لمريض آخر. لا يجوز إعطاء هذا الدواء إلى أقاربك، جيرانك أو معارفك.

لا يجوز تناول الدواء في الظلام! حفظ من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

التخزين:

يجب التخزين تحت ٢٥ درجة مئوية. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى في ظروف التعليب/ التخزين الموصى بها. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر! في أي حالة شك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ١٠٧٩٣٢٨٩٨٢

المنتج:

زامبون سويسرا م.ض، سويسرا

صاحب التسجيل:

مختبرات رافا م.ض، ص.ب. ٩١٠٣٠١، القدس

للتيسير وتسهيل القراءة، تحت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. لكن الدواء مخصوص لكلا الجنسين.

أقرت وزارة الصحة بصيغة هذه النشرة وفحص محتواها ورخص من قبلها في حزيران ٢٠١٣.