

أچيسپور لفطر الأظافر / كيراتوسپور مرهم

كل ماسورة تحتوي على:

بيفونازول 1% Bifonazole

يوريا 40% Urea

مواد غير فعالة ومولدات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

كعلاج مضاد للفطريات لفطر الأظافر في أصابع اليدين والقدمين ولنزع الأظافر.

الفصيلة العلاجية:

بيفونازول - مضاد للفطريات من فصيلة الإيميدازولات.

يوريا - مركب عضوي لعلاج الجلد الجاف.

(٢) قبل إستعمال الدواء

❑ لا يجوز إستعمال الدواء:

إذا كنت حساساً (اليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

❑ قبل العلاج بـ أچيسپور لفطر الأظافر / كيراتوسپور، إحك للطبيب إذا

- علمت بوجود حساسية لأدوية مضادة للفطريات من فصيلة الإيميدازولات مثل: إكونازول، كلوتريمازول، ميكونازول، (econazole, clotrimazole, miconazole).
- كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء.

❑ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول وارفارين.

❑ الحمل والإرضاع

يجب إستشارة الطبيب إذا كنت في فترة الحمل. يوصى بعدم إستعمال المستحضر في الثلث الأول من الحمل.

لا يجوز الإستعمال إذا كنت في فترة الرضاعة.

❑ الإستعمال لدى الأطفال والرضع

يجب أن يتم الإستعمال لدى الأطفال والرضع تحت إشراف طبي.

❑ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على شحم الصوف (wool wax=wool fat).

يجب الإمتناع عن تماس المرهم بالعينين. في حالة التماس بالعينين، يجب الغسل جيداً بالماء.

(٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

للإستعمال الخارجي فقط. لا يجوز البلع.

يجب الإمتناع عن تماس المستحضر بالعينين.

كيفية الإستعمال:

أچيسپور لفطر الأظافر: اقرأ بتمعن دليل العلاج الموجود في العلبة وإحرص على إتباع التعليمات والإرشادات الدقيقة لإستعمال ماسورة المرهم وسائر أدوات عدة العلاج.

كيراتوسپور: إنقع راحة القدم أو راحة اليد داخل مغسل من الماء الساخن. ومن ثم جفف جيداً. ركب الماسورة إلى المفك البلاستيكي بإدخال أسفل الماسورة في الشق الموجود في نهاية المفك. دور ببطء يد المفك حتى الحصول على شريط مرهم بطول الظفر المصاب. ضع شريط المرهم على الظفر. لا تفرك! ضمد الأصبع بضماد لاصق مقاوم للماء. الضماد اللاصق يستعمل كغطاء واقٍ ويجب تركه على ظهر الظفر لمدة ٢٤ ساعة. بعد ٢٤ ساعة يجب إزالة الضماد من الأصبع ومن ثم نقع راحة القدم أو راحة اليد ثانية في مغسل من الماء الساخن والتجفيف جيداً. إستعمل المبرد لإزالة المادة من الظفر المصاب والذي أصبح ليناً. إفعل ذلك بحذر. إدهن المرهم ثانية وفقاً للمراحل الموصوفة أعلاه. يجب تبديل الضماد يومياً.

لا توجد أيضاً حاجة لتغطية الجلد حول الظفر. لكن في حال حدوث تهيج، قبل التضميد يجب دهن الجلد حول الظفر بمستحضر ملائم.

بعد نزع الظفر، يجب مراجعة الطبيب لإنهاء العلاج وتنظيف بقايا الظفر. إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه حالاً للطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت دهن الدواء لا يجوز دهن مقداراً دوائياً مضاعفاً، إدهن المقدار الدوائي التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

كيف تستطيع المساهمة في نجاح العلاج؟

تحفز الرطوبة نمو الفطريات. لذا يجب الحفاظ على بقاء المنطقة المصابة جافة. يجب غسل المنطقة المصابة قبل كل عملية دهن من الدواء، بين علاج وآخر بالمرهم - يمكن إستعمال مسحوق مضاد للفطريات لتجفيف المكان.

إذا كان العلاج في القدمين - يجب الحرص على الغسل جيداً والتجفيف خاصة بين الأصابع. يفضل إستعمال جوارب قطنية؛ يجب الإمتناع عن إرتداء جوارب من الصوف أو من مواد صناعية. يفضل تبديلها عدة مرات في اليوم (حسب كمية العرق).

في الفصول الملائمة يوصى بإنتعال صنادل بدون جوارب.

• لا تستعمل الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أجيبيور لفطر الأظافر/ كيراتوسبور قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

• أعراض في الجلد، في النسيج تحت الجلد وفي المنطقة المعالجة: إلتهاب الجلد التماسي، إلتهاب الجلد التحسسي، إحمرار، حكة، طفح، شرى، حويصلات، تقشر الجلد، إكزما، جلد جاف، تهيج في الجلد، طراوة الجلد، الشعور بحرقة، مشاكل في الأظافر، تغير في لون الظفر، ألم و/أو وذمة في المنطقة المعالجة وألم في الأطراف. تزول هذه الأعراض بعد التوقف عن العلاج، لكن إذا كانت الأعراض المذكورة أعلاه مستمرة و/أو مزعجة، يجب مراجعة الطبيب.

في حال حدوث رد فعل تحسسي للضمادات اللاصقة المرفقة للعلبة (أنظر «كيفية الإستعمال») مثل طفح: يجب إستشارة الطبيب. إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين في مكان بارد، ليس فوق ٢٥ درجة مئوية.

• بعد عملية الفتح الأولى يمكن الإستعمال لفترة ٣ أشهر.

• خزن في العلبة الأصلية.

٦) معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:
Wool fat, beeswax white, paraffin white soft.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:
أجيبيور لفطر الأظافر: ماسورة ألومنيوم تحتوي ١٠ غرام مرهم بلون مائل إلى الأصفر، لصوق طبي، مبرد ومفك (للمعس) بلاستيكي.

• كيراتوسبور: ماسورة ألومنيوم تحتوي ١٠ غرام مرهم بلون مائل إلى الأصفر، ومفك (للمعس) بلاستيكي.

• اسم المنتج وصاحب الإمتياز: بيريجو إسرائيل فارماسبيتيكا م.ض.، ص.ب. ١٦، يروحام.

• أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: آب ٢٠١٤

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

أجيبيور لفطر الأظافر: ١٢٣-٥٨-٢٦٤٩٥

كيراتوسبور: ١٠٥-٧٨-٢٦٥٩٦

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.