

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד.

אגיספור לפטרת הציפורניים/קרטוספור משחה

כל שפופרת מכילה:

פיונזול 1% Bifonazole
אוריאה 40% Urea

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון על סופו כטרם שתשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע המצטיין על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול בעורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקח להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

1. לטיפול אנטי-פטריוטי בפטרת הציפורניים של אצבעות הידיים והרגליים ולחיסור הציפורניים.

קבוצת תרופיית

פיונזול - אנטי-פטריוטי ממשפחת האימידאזולים.
אוריאה - תרכובת אורגנית לטיפול בעור יבש.

2. לפני שימוש בתרופה

⚠️ אל להשתמש בתרופה:

אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

⚠️ לפני הטיפול באגיספור לפטרת הציפורניים/קרטוספור ספר לרופא אם

• ידועה לך רגישות לתרופות אנטי-פטריוטיות מקבוצת האימידאזולים כגון: אקונזול, קלוטרימזול, מיקונזול (econazole, clotrimazole, miconazole).

• הנך רגיש למוזן כלשהו או לתרופה כלשהי.

⚠️ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במויחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח ואפרין.

⚠️ הריון והנקה

אם הנך בהריון יש להיוועץ ברופא. מומלץ לך להשתמש בתכשיר בשלישי הראשון של ההריון.

אין להשתמש אם את מניקה.

⚠️ שימוש בילדים ובתינוקות

השימוש בתינוקות ופעוטות חייב להיעשות תחת השגחה רפואית.

⚠️ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה שועות כבשים (wool wax=wool fat).
יש להימנע ממגע המשיחה עם העיניים. במקרה של מגע בעיניים, יש לטשוח היטב עם מים.

3. כיצד שתשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.

עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש יחוצני בלבד. אין לבלוע.

יש להימנע ממגע עם העיניים.

אופן השימוש:

אגיספור לפטרת הציפורניים: קרא בעיון את המדרוך לטיפול המצוי באריזה והפקד על מילוי ההוראות וההנחיות המודייקות לשימוש בשפופרת המשיחה ובשאר אביזרי ערכת הטיפול.

קרטוספור: השרה את אף הרגל או אף היד באמבט מים חמים. לאחר מכן יבש היטב. הרקב את השפופרת למברג הפלסטיק על ידי השחלת תחתיות השפופרת דרך החריץ שבתקנה המברג. טובב באיטיות את זרית המברג עד שתתקבל רצועת משחה באורך הציפורן הנגועה. הנח את רצועת המשיחה על הציפורן, אל תשפשף. הובש את האצבע באגד מדבק עמיד במים. האגד המדבק משמש כמכסה מגן ויש להשאירו על גבי הציפורן למשך 24 שעות. לאחר 24 שעות יש להסיר את האגד מהאצבע ולהשרות שוב את אף הרגל או אף היד באמבט מים חמים וליבש היטב. השתמש בפצירה לחיסור חומר הציפורן הנגוע והמרוכך. עשה זאת בהירות. מרח שוב את המשיחה על פי ההלחך המתואר מעלה. יש להחליף את ההבישה מדי יום.

אין צורך לכסות גם את העור שמסביב לציפורן. אולם במקרה של גירוי, לפני ההבישה יש למרוח את העור מסביב לציפורן בתכשיר מתאים. לאחר הסרת הציפורן, יש לפנות לרופא לטיפול וניקוי שאריות הציפורן.

אם נטעות בלע ליד או מישוה אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם נשכחת למרוח את התרופה אין למרוח מנה כפולה. מרח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להמדיד נטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

לחות מעודדת את צמיחת הפטריות. לכן יש לשמור על יובש במקום הנגוע.

לחלוצך את האזור הנגוע לפני כל מריחה של התרופה. בין טיפול לטיפול במשחה - ניתן להשתמש באבקא נגד פטריות כדי לייבש את המקום.

אם הטיפול ברגליים - יש להקפיד על רחיצה יסודית ויבוש במיוחד בין הבהונות. רצוי להשתמש בגרביים מכותנה; יש להימנע מלבוש גרביים מצמר או מחומרים סינטיטיים. רצוי להחליפם מספר פעמים ביום (לפי כמות היזעה).

בעונות המתאימות מומלץ לנגוע סדליים ללא גרביים.
• אין לטיל תרופות בחושהן! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרקב משפפים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באגיספור לפטרת הציפורניים/קרטוספור עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק ממשמשתמים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות בעור, בקרבה העור עורית ובאזור המטופל:
דלקת עור ממגע, דלקת עור אלרגית, אודם, גרד, פריחה, אורטיקריה, שלפוחית, קילוף העור, אקזמה, עור יבש, גירוי בעור, ריחן של העור, תחושה צריבה, בעיות בציפורניים, שינוי בצבע הציפורן, כאב ו/או בצקת באזור המטופל וכאב בפיניים.

תופעות אלו חולפות לאחר הפסקת הטיפול, אולם אם התופעות לעיל מתמשכות ו/או מסרידות, יש לפנות לרופא.

במקרה של תגובה אלרגית לאגדים המדבקים המצורפים לאריזה (ראא "אופן השימוש") כגון פריחה: יש להיוועץ ברופא.

אם אחת התופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

• מונע הרעלה! התרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור וחסך לשדה ראיות והישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• יש לאחסן במקום קריר, לא מעל 25°C.

• לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך 3 חודשים.

• אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:
Wool fat, beeswax white, paraffin white soft.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
אגיספור לפטרת הציפורניים: שפופרת אלומיניום המכילה 10 גרם משחה צהבהבה, פלסטרים, מגרדת ומברג (מועך) מפלסטיק.

קרטוספור: שפופרת אלומיניום המכילה 10 גרם משחה צהבהבה ומברג (מועך) מפלסטיק.

• שם הציפן ובעל הרישום: פריגו ישראל פרמצבטיקה בע"מ, ת.ד. 16, ירוחם.

• עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: אגוסט 2014.
מספר רישום התרופה בפקס התרופות המלכתי במשרד הבריאות:

אגיספור לפטרת הציפורניים: 123-58-26495
קרטוספור: 105-78-26596

• לשם הפטיסות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מועדלת לשני המינים.