

أنجريد ٠,٥ كبسولات

المادة الفعالة:

كل كبسولة من أنجريد ٠,٥ تحتوي على:
٥ ملغ من أنجريد (كهيدروكلوريد)
[Anagrelide (as HCl)]

لغائصة المواد غير الفعالة، أنظر إلى بند ٦.

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن المنتج. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
تم وصف هذا المستحضر لك فقط. لا يجوز نقله لأخريين. حيث قد يسبب لهم الضرر، حتى ولو كانت أعراض المرض لديهم مشابهة للأعراض لديك.

١. لأي غاية الدواء مخصص؟

الدواء مخصص لعلاج المرضى المصابين بكثرة الصفائح الدموية وذلك لتخفيض ارتفاع تعداد صفائح الدم وخطر التجلط (التخثر) وتحسين الأعراض المرافقة.
كثرة الصفائح الدموية هي حالة ينتج بها نقي المخ كمية كبيرة جداً من الصفائح، نوع من خلايا الدم. مستوى مرتفع من الصفائح في الدم قد يسبب مشاكل تخثر.

التصيلة العلاجية:

الأدوية الحالة للخرثة

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- لا يجوز الاستعمال إذا كنت حساساً للمادة الفعالة أو لإحدى المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (القائمة المركبات غير الفعالة، أنظر إلى بند ٦).
- لا يجوز الاستعمال إذا كنت حاملاً أو مرضعة.
- لا يجوز الاستعمال إذا كنت تعاني من مشاكل كبد متوسطة أو وخيمة.
- لا يجوز الاستعمال إذا كنت تعاني من مشاكل كلى متوسطة أو وخيمة.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء:

قبل العلاج بأنجريد أخير الطبيب إذا:

- كانت لديك، أو كنت تعتقد بأنه لديك، مشكلة في القلب.

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى.
- كنت حاملاً أو مرضعة.
- كنت حساساً للاكتوز.

عندما يعطى أنجريد بالمشاركة مع أسبرين، هنالك زيادة بالاختطار (احتمال الخطر) لتزيف دم جدي. انظر إلى البند التالي.

التفاعلات المحتملة عند تناول أدوية أخرى

- بالمشاركة مع أنجريد:
إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (يجب الإشارة على أن القائمة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية. إذا لم تكن متأكدًا فيما إذا كنت تستخدم أي من هذه الأدوية الرجاء أطلب المشورة من الطبيب أو الصيدلي).
• فلوقوكسامين (لعلاج الاكتئاب).
• أمبريزول (لعلاج مشاكل بالجهاز الهضمي كالتهاب المريء الجزري وقرحات المعدة ومعوي الإثني عشري).
• ثيوفيلين (لعلاج الربو ومشاكل التنفس).
• أدوية تستعمل لعلاج مشاكل القلب (مثل، ميلرنيون، أنوكسيبون، أمينون، أولبرينيون وسيلوسترول).
• أسبرين (الذي يستعمل لتسكين الآلام أو تبخير الدم/ ميثيل لتكديس الصفائح الدموية).
• أدوية أخرى تؤثر على صفائح الدم.

استعمال الدواء والطعام:

يمكن تناول الدواء بدون علاقة بأوقات وجبات الطعام.

الحمل والرضاعة:

- لا يجوز استعمال الدواء لدى النساء الحوامل. يجب على النساء اللواتي بإمكانهن الحمل، استعمال وسائل منع الحمل أثناء استعمال أنجريد.
- يجب إخبار الطبيب إذا كنت مرضعة أو تخططين للإرضاع. لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت مرضعة. عليك التوقف عن الإرضاع، إذا كنت تستعملين الدواء.

القيادة واستعمال الماكينات:

قد يسبب استعمال الدواء دوار. لا يجوز القيادة أو تشغيل ماكينات في حالة وكنت تشعر بالدوار.

الاستعمال لدى الأطفال:

هنالك معلومات محدودة عن استعمال أنجريد لدى الأطفال ولذا يجب الاستعمال بحذر.
معلومات هامة حول جزء من مركبات الدواء:
يحتوي الدواء على لاكتوز. إذا كنت حساساً للاكتوز، يجب إعلام الطبيب قبل تناول هذا الدواء (أنظر إلى بند ٦).

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دوماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. إذا لم تكن متأكدًا عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي.

الجرعة وكيفية العلاج يحدّدان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي: الجرعة البدئية ١ ملغ (كبسولتين من أنجريد) لليوم، التي تؤخذ كبسولة واحدة مرتين في اليوم، لأسبوع على الأقل. بعدها يمكن أن يزيد الطبيب أو يخفص عدد الكبسولات التي تأخذها في اليوم بحسب حالتك. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الكبسولات كاملة مع كأس ماء، بدون علاقة بأوقات وجبات الطعام. المفضل تناول الكبسولات في ذات الوقت في كل يوم.
ليست هنالك معلومات حول فتح ونثر الكبسولة.

الفحوصات والمتابعة: أثناء فترة العلاج قد يرسلك الطبيب لإجراء فحوصات دم وبول للتحقق من تأثير الدواء على الجسم.

إذا أفرطت عن طريق الخطأ تناول الجرعة:
إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلع طفل عن طريق الخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول الجرعة المنسية فوراً عند تذكرك. يجب تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي. لا يجوز تناول جرعتين معاً.
يجب الدائمة على العلاج بموجب ما أوصى به من قبل الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقّق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

٤. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال أنجريد أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. إذا لم تفضي الأعراض الجانبية أو أنها تسبب المضايقة أو أنها تتفاقم، يجب استشارة الطبيب، لا تفرغ عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من المحتمل بأن لا تعاني من أي منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب، إذا ظهرت الأعراض الجانبية الوخيمة التالية (ليست شائعة):
• ألم شديد في الصدر، خفقان (ضيق قلب شديدة التي يمكنها بأن تكون سريعة أو غير منتظمة) المصحوب بشعور بالدوار أو الإغماء، إغماء، آلام شديدة في البطن أو في جهاز الهضم، تقيؤ دموي،





٦. معلومات إضافية إضافة للمادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على المواد غير الفعالة التالية:

Lactose, microcrystalline cellulose,
crosspovidone, povidone K25, magnesium
stearate, titanium dioxide (E171), gelatin.

كل كبسولة تحتوي على ما يقارب ١٢٢ ملغ لاكلتوز.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟
كبسولات بلون أبيض فاخ (off-white) بعبوات
٦٠ كبسولة للعبوة.

صاحب التسجيل:

مختبرات رافا م.ض.،
ص.ب. ٤٠٥، القدس



أرقام تسجيل الدواء بسجل الأدوية الحكومي بوزارة الصحة: ١٤٨٦٤٣٣٣٤٤

هذه النشرة فحصت وتمت المصادقة عليها من
قبل وزارة الصحة في تاريخ: أيلول ٢٠١٢.

للتبسيط وتسهيل القراءة صيغت هذه النشرة
بلسان المذكور، لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

الأعراض الجانبية التي تظهر في أوقات نادرة
(تظهر لدى ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠٠٠ معالج):

نوبة قلبية، نزيف من اللثة، ازدياد في الوزن، مرض
في عضلة القلب، فقدان التنسيق، صعوبة الكلام،
جفاف في البشرة، صداع نصفي، اضطرابات في
الرؤية أو رؤية مزدوجة، طنين في الأذنين، ازدياد
الحاجة للتبول في الليل، ألم، أعراض شبيهة
بالأنفلونزا.

أعراض جانبية لا يعرف مدى شيوعها:
التهاب الكبد مع ارتفاع إنزيمات الكبد، التهاب
رئوي أُرْجِي، التهاب كلوي.

في أي حالة تشعر بأعراض جانبية لم تذكر في هذه
النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام عليك
استشارة الطبيب فورًا!

٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنّب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل
دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي
الأطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا
تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من
الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء
الصلاحية (exp. Date) المدون على ظاهر
العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يتطرق لليوم
الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: يجب التخزين دون ٢٥ درجة
مئوية.

براز دموي أو أسود وأيضًا صعوبات تنفس أو ضيق
تنفس خاصة إذا ازرققت الشفتين أو البشرة.

أعراض جانبية شائعة جدًا (تظهر لدى أكثر من
معالج واحد من بين عشرة معالجين):
صداع.

الأعراض الجانبية التي تظهر في أوقات متقاربة
(تظهر لدى ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠ معالج):

دوار (الذي يمكنه أن يظهر بشكل نادر أيضًا عند
الوقوف أو النهوض من الفراش)، تعب، خفقان
(نبضات قلب شديدة التي يمكنها بأن تكون سريعة
أو غير منتظمة)، غثيان، إسهال، ألم بطن، صعوبات
هضم، غازات، تقيؤ، فقر الدم (انخفاض طفيف
بعد كريات الدم الحمراء ونقص في الحديد)، احتباس
السوائل (بما في ذلك تورم الكاحلين)، طفح جلدي.

الأعراض الجانبية التي تظهر في أوقات متباعدة
(تظهر لدى ١ حتى ١٠ من بين ١٠٠٠ معالج):

وهن، شعور بالمرض، ضغط دم مرتفع، قشعريرة أو
حمى، حرقة، فقدان الشهية، إمساك، كدمات، وذمة
موضعية مع تورم، فقدان الوزن، آلام عضلات، آلام
مفاصل، ألم ظهر، انخفاض بالحس أو إحساس خدر
بأصابع اليدين أو الرجلين، أرق، اكتئاب، ارتباك،
عصبية، جفاف في الفم، فقدان الذاكرة، سعال
أُرْجِي (تابع من حساسية)، ضيق تنفس، رُغاف
(نزيف من الأنف)، التهاب رئوي، تساقط الشعر،
حكة أو تغيير لون البشرة، عناية (عجز جنسي)،
ارتفاع إنزيمات الكبد.