



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)

התשמ"ו-1986

התרופה משוקעת על פרי מרשם רופא בלבד

50 אנגריד מ.ו

נמוסול

החומר הפעיל:

כל נמוסול של אנגריד 0.5 מכילה: 0.5 מ"ג של אנגריד (ההידרוקלוריד) (Anagrelide (as HCl))

לרשימת המרכיבים הבדלתי פעילים אלה טעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בחולים עם תרומבוציטיה ראשונית על מנת להוריד את הספירה הגבוהה של תאי הדם ואת המיטון לתרומבוציטים וידי להביא לשיפור בתסמינים הלוואיים. תרומבוציטיה ראשונית הוא מצב בו חום העצם מייצר כמות גדולה מדי של תסיות (סוג של תאי דם). רמה גבוהה של תסיות בדם עלולה לגרום לבעיות קרישה.

קבוצה תרופתית:

תרופות תרומבוליטיות

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אין להשתמש אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הבדלתי פעילים, ראה טעיף 6).
- אין להשתמש אם את בהריון או מיניקה.
- אין להשתמש אם אתה סובל מבעיות כבד בינונית או מתוחות.
- אין להשתמש אם אתה סובל מבעיות כליה בינונית או מתוחות.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה: לפני הטיפול באנגריד ספד לרופא אם:

- יש לך, או שאהה חושב שעלולה להיות לך, בעיה בלב.
- אתה סובל מבעיות כבד או בבליזות.
- את בהריון או מיניקה.
- אתה רגיש ללקטוז.

כאשר אנגריד ניתן בשילוב עם אספירין, ישנה עליה בסיכון לטשפי דם זרניים (זימומים). ראה בטעיף אבא.

הנבואת אפסריות עם תרופות אחרות שלקחת

במקביל לאנגריד:

- אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, הוסף את כל לרופא או לרוקח. מיוחדו יש ליעד את הרופא או הרופא עם אתה לוקח את התרופות הבאות או לרופא כי הרשימה שלהן מציגת את החומרים הפעילים בתרופות. אם אינך בטוח האם אתה משתמש באחת מהתרופות הללו אבא תתייעץ עם הרופא או הרוקח:
- פלונוקסטין (לטיפול בדיכאון).
- אומפרזול (טיפול בבעיות במערכת העיכול כמו דלקת הוושט מרוד חסור וכיכבי בקיבה ובתריסרון).
- פוליוקלין (לטיפול באסטמה בעיות נשימה).
- תרופות המשמשות לטיפול בבעיות בלב (בנון, מילריון, אנוקסטין, אמריון, אולפיריון וסילוסטזול).

- אספירין (המשמש להקלת כאבים או לדילול הדם/עיוכב הצממת תסיות דם).

- תרופות אחרות המשפיעות על תסיות דם.

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את התרופה ללא קשר לזמני הארוחה.

הריון והנקה:

- אין להשתמש בתרופה בנשים הרות. נשים העשיות להיכנס להריון, צריכות להשתמש באמצעי מניעה בעת השימוש באנגריד.
- יש לספר לרופא אם את מיניקה או מתכננת להניק. אין להשתמש בתרופה אם את מיניקה. עליו להפסיק להניק, אם את משתמשת בתרופה.

נהיגה ושימוש במכונית:

השימוש בתרופה עלול לגרום לסחרחורת. אין לנהוג או להפעיל מכונות במידה ואתה חש סחרחורת.

שימוש בילדים:

המידע הקיים על השימוש באנגריד בילדים הינו מוגבל ולכן יש להשתמש בהירות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה לקטוז. אם אתה רגיש ללקטוז, יש ליעד את הרופא לפני נטילת תרופה זו (ראה טעיף 6).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא: מינון התחלתי של 1 מ"ג (2 כמנוסול של אנגריד) ליום, הלקחת כמנוסה אחת פעמיים ביום, לשבעת לפחות. בהמשך הרופא יכול להעלות או להוריד את מספר הכמנוסול שאתה לוקח ביום בהתאם למצבך.

אין לעבוק על המנה המומלצת.

יש לבלוע את הכמנוסול בשלמות עם כוס מים, ללא קשר לזמני הארוחות. מומלץ ליטול את הכמנוסול באותו זמן בכל יום. אין מידע לגבי פתיחה ופיזור הקטסולה.

בדיקות ומעקב:

בתקופת הטיפול הרופא עשוי לשלוח אותך לבצע בדיקות דם ושנתן כדי לבחון את השפעת התרופה על הגוף.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:

אם נטלת בטעות בלע לך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, יש ליטול את המנה שנשכחה מיד כשזמנה:

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, יש ליטול את המנה שנשכחה מיד כשזמנה. אל תהנה הבאה יש ליטול בזמן הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד.

יש להמדיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצבך בדיקות, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושיך בזמן התוית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באנגריד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אם תופעות הלוואי אינן חולפות או שהן מטרידות או שהן מחמירות, יש להתייעץ עם הרופא. את תיבה למקרא רשימת תופעות הלוואי, יתכן ולא תסכול את אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא, אם מופיעות תופעות הלוואי

המתרחשות הבאות (אינן שכחות): כאב חזק בחזה, פלטיסטיציה (דפיקות לב חזקות שיכולות להיות מהירות או לא סדירות), המלכות בתחושת סחרחורת או עילפון, העתלעות, כאבים חזקים בבטן או במערכת העיכול, הקאה דמית, צואה דמית או שחרור וכן קשיי נשימה או קוצר נשימה

במידה אם השפתיים או העור מכחילים.

תופעות לוואי שכחות מאוד (מופיעות ביותר ממסופל אחד כאבי ראש):

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות (מופיעות ב-1 עד 10 מתוך 1000 מטופלים):

סחרחורת (שיכולה להופיע באופן גרד ניש כשנעמדים או קמים מהמיטה); עייפות, פלטיסטיציה (דפיקות לב חזקות שיכולות להיות מהירות או לא סדירות), בחילות, לשלול, כאב בטן, קשיי עיכול, גימ, הקאות, אומיה (ירידה קטנה בספירת כדוריות הדם הודומות ומחסור ברזל), אצירת גזולים (כולל הנכחות הרוקחלים). פריחה.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות (מופיעות ב-1 עד 10 מתוך 1000 מטופלים):

חולשה, תחושת חולי, לחץ דם גבוה, צמרמורת או חום, צרבת, חוסר תאבון, עצירות, תבלות, בצקת מקומית עם נפיחות, אובדן משקל, כאבי שרירים, כאבי מפרקים, כאב גב, ירידה בתחושה או תחושת נימול באצבעות הידיים או הרגליים, חדוי שניה, דיכאון, בלבול, עצבנות, יובש בפה, אובדן זיכרון, שינוי אלרגי, קוצר נשימה, דימום מהאף, דלקת ראות, נשירת שער, גירוד או שינוי צבע העור, איין אונות, עליה באנזימי כבד.

תופעות לוואי המופיעות לעיתים נדירות (מופיעות ב-1 עד 10 מתוך 10000 מטופלים):

הקף לב, דימום ממחכיבים, עליה במשקל, מחלה בשרי הלב, אובדן קואורדינציה, קשיי ידבר, יובש בעור, מיגרנה, הפרעת בראיה או ראייה כפולה, צלצולים באוזניים, עליה בצורך להתרקות בלילה, כאב, סימפטומים דמויי שפעת.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה:

דלקת בכבד (הפטיטיס) עם עליה באנזימי כבד, דלקת ראות אלרגית, דלקת בבליות.

כמה קרה שבו אתה מרגיש תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליו להתייעץ עם הרופא מיד!

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום מוגר מחוץ לרישוי של יום לילדים ו/או תינוקות ובעל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגהם להקא ללא הרוא מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתאים ליום האחרון של אותו חודש.
- נתיח אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם את החומרים הבדלתי פעילים הבאים: Lactose, microcrystalline cellulose, crossopvidone, povidone K25, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), gelatin.

כל כמנוסול מכילה כ-123 מ"ג לקטוז.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה? כמנוסול בצבע קרם (off-white) באריות של 60 כמנוסול.

בעל הרישום:

מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים



מספר רישום התרופה בפנקס הרופות הממלתי במשרד הרוקחים: 1486433344

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות בתאריך: ספטמבר 2012.

לשם הפטנט והקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

