

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ النشرة بامان حتى نهايتها قبل ان تستعمل الدواء

تايغر بالم أحمر، تايغر بالم أبيض

مرهم

التركيب:

المركبات الفعالة:

يحتوي تايغر بالم الأحمر على (W/W):

Camphor 11%, Menthol 10%, Cajuput Oil 7%, Dementholised Mint Oil 6%, Clove Oil 5%.

يحتوي تايغر بالم أبيض على (W/W):

Dementholised Mint Oil 16%, Cajuput Oil 13%, Camphor 11%, Menthol 8%, Clove Oil 1.5%.

مركبات غير فعالة:

Hard paraffin, Yellow soft paraffin.

يحتوي تايغر بالم الأحمر أيضاً على: Cinnamon oil.

الفااعية الطبيعية:

المرهم معد للتخفيف المؤقت من آلام العضلات.

متى لا يجوز استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

لا يجوز استعمال لدى أولاد تحت جيل سنين.

لا يجوز دهن هذا الدواء دون استشارة الطبيب قبل بداية العلاج إذا كنت حاملاً أو مريضاً. يجب الامتناع عن الاستعمال المفرط في

فترة الحمل أو الإرضاع.

تحذيرات:

لا يجوز الاستعمال على جلد مصاب، مجروح أو متهدج. في كل حالة تعاون فيها من أعراض إصابة في الجلد بمنطقة دهن المرهم (مثل، ألم، تورم أو ظهور بثور)، يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه للطبيب فوراً. يجب الامتناع عن الملامسة مع العينين، الأغشية المخاطية ومناطق حساسة أخرى.

يجب غسل اليدين فوراً بعد الاستعمال.

إذا كانت هناك حاجة لضمادة، فيجب عدم شدّها.

إذا كنت حساساً لأي نوع من الأغذية أو الأدوية، عليك إبلاغ الطبيب بذلك قبل استعمال المرهم.

الأعراض التي تقصى اهتماماً خاصاً:

بالإضافة إلى التغيرات المرغوبة للدواء، فقط تظهر أثناء استعماله بعض الأعراض الجانبية مثل: رد فعل تحسسي بما في ذلك التهاب الجلد الملامسة (contact dermatitis).

إذا لم تنتهي هذه الأعراض الجانبية أو إذا كانت مزعجة، فيجب استشارة الطبيب.

عند ظهور تهيج (نادر) - توقف عن العلاج وتوجه للطبيب!

بما أن هذا المستحضر يحتوي على المثiol، فإنه في حالات نادرة يمكن أن تتسبب إصابات في الجلد مثل، حرائق في منطقة دهن المرهم.

في كل حالة تعيشون فيها أعراض إصابة بالجلد في منطقة دهن المرهم (مثل، ألم، تورم أو ظهور بثور)، يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه للطبيب فوراً.

في كل حالة تشعر فيها بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام، عليك أن تستشير الطبيب فوراً.

الجرعة الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

قم بدهن المرهم بلف على المنطقة المؤلمة حسب الحاجة (عادة مرتين حتى ثلاثة مرات في اليوم). لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها. إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال ٧ يوماً، يجب التوجه للطبيب.

انتبه:

هذا الدواء معد لاستعمال الخارجي فقط. يجب الامتناع عن الملامسة مع العينين، الانسجة المخاطية، الجلد المجروح ومناطق حساسة أخرى. انظر أيضاً في بند "تحذيرات".

من شأن هذا المرهم أن يلطف الملابس.

طريقة الاستعمال:

قم بدهن المرهم بلف على المنطقة المؤلمة. من أجل منع رد فعل تحسسي، يجب إجراء فحص على منطقة صغيرة قبل الاستعمال.

يجب غسل اليدين مباشرة بعد الاستعمال. انظر أيضاً في بند "تحذيرات".

تجنب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/ أو الرضع، وبذلك يتم تفادى التسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الواتنية أو إذا بلع الطفل من هذا الدواء عن طريق الخطأ، عليك التوجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى حالاً، مصطحبًا عبوة الدواء معك.

لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز استعمال أو تناول الأدوية بالعتمة قم بفحص طابع الدواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات إذا كنت بحاجة إليها.

التخزين: يجب التخزين تحت ٢٥°C.

حتى في ظروف التعبئة/التخزين الموصى بها، فإن الأدوية تبقى محفوظة لفترة محددة فقط. يمكن الاستعمال حتى ٦ أشهر من قطع القبضة للمرة الأولى، ولكن ليس لفترة أطول من تاريخ انتهاء الصلاحية المدونة على العبوة. يرجى الانتهاء لتاريخ انتهاء صلاحية المستحضر! في حالة الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء:

تايغر بالم أحمر: ١٢٧٢٢٣٠٥٦٥

تايغر بالم أبيض: ١٢٧٢٢٣٠٥٦٦

المنتاج: هو- بر هلتثير. م.ض سنغافورة

صاحب الامتياز: معامل رافا. م.ض، ص.ب، ٤٠٥، أورشليم- القدس ٩١٠٠٣٠١

من أجل تبسيط وتسهيل القراءة تمت صياغة هذه النشرة بلغة المذكرة، ولكن الدواء مخصص لكل من الجنسين.

لقد تم تحديد شكل هذه النشرة من قبل وزارة الصحة وتم فحص مضمونها والمصادقة عليها من قبلها في آذار ٢٠١٣.