

- يجب تباعي الجرعة جيداً مع ١٢٠ مل (ما يقارب نصف كأس) ماء أو عصير والشرب ببطء (لمدة ٥ حتى ١٠ دقائق)، وفقاً لتوصيات الطبيب.
- يجب تناول الدواء مع الطعام أو فوراً بعد الطعام.
- عليك استعمال كأس قياس أو محفظة لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. لا يجوز استعمال ملعقة منزلية لفرض قياس كمية الدواء لأن الملاعق المنزلية مختلف بحجمها ومن الممكن أن لا تأخذ كمية الدواء الصحيحة.
- للزجاجة غطاء مضاد للفتح من قبل الأطفال. الأغطية المضادة للفتح من قبل الأطفال فلتلت بشكل جدي عدد حالات التسمم الناجمة من قبل الأدوية.

- ملاج، لا يجوز استعمال بدائل.
- بسب من جملة الأمور جفاف
- ناتسيوم في الدم.
- اكتسولين.
- خرماء دم.
- خرماء.
- ادوية ذات فعالية مضادة للفعل الكوليبي (anticholinergic).
- ادوية خתוبي على بوتاسيوم، ادوية مدرة للبول التي تسبب احتباس البوتاسيوم.
- ادوية مدرة للبول من مجموعة الثيازايد، ادوية مُسلطة.
- املاح كالسيوم التي لا تتناوب عن طريق الغم.
- بيكربونات الصوديوم و exchange resins
- اكتسولين.
- ادوية مضادة للالتهاب لا ستريوبيدية (NSAIDs).

معلومات مهمة جزء من مركبات الدواء في الدواء.

- خلال العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاك حمية غذائية قليلة الملح، ولا يجوز البدم بتناول حبوب مجففة.
- في حال شعرت خلال العلاج بإسهال وخيم أو مستمر (الذي قد يسهم في التوجيه قفزوا إلى الطبيب).
- في حال أن الدواء يقطع خلال إسهال، يجب رصد مستويات البوتاسيوم.

قبل استعمال الدواء أخير الطبيب إذا:

بوتاسيوم للشرب (ما يقارب نصف كأس) ماء أو عصير، والشرب ببطء
مستهلك بموجب أنظمة الصيادلة - ١٩٨٦
دواء بموجب وصفة طبيب فقط

محلول يو تاسوم للشرب

يجب تسميم الجرعة مع ١٢٠ مل (ما يقارب نصف كأس) ماء أو عصير، والشرب ببطء

1

- إثبات: خلال العلاج بهذا الدواء لا يجوز استهلاكه كجمية قليلة الأملأح أو استعمال بدائل ملح، نظراً إلى أن بدائل الملح ("ملح قليل الصوديوم") تحتوي عادةً على بوتاسيوم.
- لا يجوز البدء بتناول جسماني مجدد خلال العلاج.
- التحوصلات والمتابعة: خلال العلاج بهذا الدواء يوصى بإجراء تحوصلات مستوى البوتاسيوم في الدم pH في الدم، وظائف الكلى وتخطيط كهربائية القلب.
- إذا تناولت باهظطاً جرعة أكبر، إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلغ خطل من الدواء عن طريق ابتلاعه توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا بعلبة الدواء معك.
- إذا نسيت تناول الدواء: في حال تذكرت خلال ساعتين من الموعده به كان من المفروض أن تأخذ الدواء - خذه فوراً عند تذكرك وبعد ذلك، لرجحه لاوقات التناول العاديه. في حال تذكرت بعد أكثر من ساعتين من الموعده به كان من المفروض أن تأخذ الدواء - تخفي الجرعة المنسية وإرجع لاوقات التناول العاديه. لا يجوز تناول جرعتين معاً!
- يجب المداومة على العلاج كما أوصى الطبيب.
- حتى لو طرأ أعراض على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب أو الصيدلاني.
- لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! حفظ من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.
- ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

استعمال الدواء والطعام: يجب تناول الدواء مع الطعام أو فوراً بعد الطعام. المرض يتخل من الاختصار لأعراض جانبية في الجهاز الهضمي. انظر أيضاً مذكرةات خاصة.
الأخمل والإرضاخ: إذا كنت حاملاً أو مريضاً يجب استشارة الطبيب قبل تناول الدواء.
الاستعمال لدى المسنين: هذا القاء الطعام على السكان قد يكون باختصار معزز لفروط بسب تغيرات يقدرة الكلى على إفرار البوتاسيوم.
معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء: كل 5 مل ختني على 5 مل صوص سكرين، 8.0 مل صوديوم سيلكالمات و 100 مل إيثانول.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لمجرعة وطريقة العلاج يحيطن من قبل الطبيب فقط. الجرعة تحضر لك وفقاً لوضعك وردة يجب استعمال هذا الدواء في أوقات محددة كما يحدد من قبل الطبيب المعالج. يجب تغيير الجرعة جيداً في ماء أو عصير (انظر أدناه طريقة الاستعمال). لا يجوزتجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

- لا يحمن الماء، الأجلاء، مخصوصاً للشب.

myotonia familiaris أو من في الدم. الكلي/جهاز البول أو الجهاز

ذلك أدوية بدون وصفة وجه المخصوص يجب إعلام واحد هذه الأدوية الرجاء في

B، مضادات حيوية مثل: حاصرات بيتا.

- إذا كنت تعاني من الشلل العاقي الدوسي - **البوتاسيوم** مرتفع - نقص البوتاسيوم
- إذا كنت تعاني من متلازمة كرياتينين مرتفعة - **البوتاسيوم** منخفض.
- إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظائف القلب، الأصمعي (مثل انسداد أو تضيق، إفراز معدة بطيء، قرحة).
- تفاعلات محتبطة مع أدوية أخرى التي تأخذ بالتناول:**
- إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى، بما في طيب وضافات تقدمة، أخير الطبيب أو الصيدلي على ذلك. على الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول أحد الأدوية التالية (بعد الإشارة المواد الفعالة في الأدوية). إذا لم تكن متاكداً فيما إذا كنت مستعمل باستشارة الطبيب أو الصيدلي،
- ديجيتاليس (مثيل ديجوكسين لعلاج مشاكل القلب).
- أدوية ستيرويدية، هرمون النجمة الوراثية (ACTH)، أمفيتروسين، جيناتاميسين، بوليوكسسين B أو مضاد حيوي من مجموعة البينسين.
- أدوية غلوكوز فضفط الدم ومشاكل في القلب مثل مثبطات ACE، هاربين (دواء ضد التجلط)، سيكلوسبورين.

وحدة الجرعة	مليغرامات (K^+)	ملي مكافئ
٥ ملL	٣٩٠ ملL	١٠ ملي مكافئ
١ قرص	٣١٢ ملL	٨ ملي مكافئ

٠.٤٣ غرام بوتاسيوم سبيتات التي هي K^+ [1.4 g potassium gluco-
ناتاسيوم جلوكونات و .٤٣ غرام بوتاسيوم سبيتات التي هي K^+]
الأخلول وبالمقارنة مع قرص الذي يحتوي على ٦٠٠ ملL
٠.٤٣ غرام بوتاسيوم سبيتات التي هي K^+ [1.4 g potassium gluco-

اسم المستحضر	وحدة الجرعة	مليغرامات (كـ)	ملي مكافئ
محلول بوتاسيوم للشرب (رافا)	٥ مل	٣٩٠ مل	١٠ ملي مكافئ
بوتاسيوم كلوريد ٦٠٠ مل	١ قرص	٣٦٢ مل	٨ ملي مكافئ

في كل حالة تشعر بها بأعراض جانبية التي لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغير على شعورك العام عليك استشارة الطبيب فوراً

٥ . كيفية تخزين الدواء؟

- يجب التسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال /أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التغيف دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين، يجب التخزين دون الـ ٢٦ درجة مئوية.
- بعد الفتح لأول مرة يمكن الاستعمال لمدة ٦ أشهر.

٦. معلومات إضافية

• إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوى الدواء أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:
Ethanol, citric acid, sodium cyclamate, saccharin sodium, tutti frutti flavor, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, purified water.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

٢٠٠ مل محلول عديم اللون في زجاجة بلاستيك برتقالي.

صاحب التسجيل: مختبرات رافا.م.ض، ص.ب.، ٤٤٥، القدس ٩١٠٤٠١

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ١١٢٣٩٢٩٥١٢

فحصت هذه النشرة وتم المصادقة عليها من قبل وزارة في شباط ٢٠١٤

للتبسيط وتسهيل القراءة تم تضييق هذه النشرة بصيغة المذكرة، لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

٤. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال هذا الدواء أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً في الحالات التالية:

عند ظهور فرط البوتاسيوم (hyperkalemia) الذي يمكن أن يتمثل بضعف وخيم في العضلات، تعب غير طبيعي أو ضعف، دقات قلب بطيئة أو غير منتظمة، ارتجاع، شعور بالنحذف، فلة شعور في الأطراف أو الشفتين، فلق غير مبرر، سبق تنفس أو سموبات في التنفس.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب في الحالات التالية:

عند ظهور تبقيه في الجهاز الهضمي الذي قد يحدث إذا كان تمر الخلول معاك، أو إذا لامس تقرحات. الأعراض تشمل: نشيجات أو ألم مستمر في البطن، ألام في الخلق أو في الصدر خاصة وقت البلع، مد في البراز.

أعراض جانبية إضافية:

إسهال، غثيان، تقيؤات، غازات، ألم أو عدم راحة في البطن. هذه الأعراض الجانبية تحدث بضرر قريبة أكثر إذا كان الدواء غير مكتسب جيداً أو أنه لا يتناول مع الطعام.

إذا كانت الأعراض الجانبية لا تنقضي أو أنها مزعجة أو أنها تتفاقم، يجب استشارة الطبيب.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال والرضع:

على الأهل إبلاغ الطبيب المعالج عن كل عرض جانبي، وعن كل دواء إضافي يُعطى للطفل. انظر أعلى الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية التي قُبِّلت.