

فولتارين أكتي-جو® كبسولات ليكويد جل

المادة الفعالة وكميتها:
كل كبسولة تحتوي على:
17.5 مغ نيكلوفيناك بوتاسيوم
نسبة المواد غير الفعالة والنسبة للمصنعة: الرجاء أنظر بند 6.

الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن

الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن (Diclofenac Potassium 12.5mg)
الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن المادة الفعالة والمصنعة: الرجاء أنظر بند 6.
الفرق اللغوي بين المنتجين حتى نهايةها قبل أن يتم تعديل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن
الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن (Diclofenac Potassium 12.5mg)
الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن المادة الفعالة والمصنعة: الرجاء أنظر بند 6.
الفرق اللغوي بين المنتجين حتى نهايةها قبل أن يتم تعديل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن
الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن (Diclofenac Potassium 12.5mg)
الأرقام المرجعية للمعلومات على معلومات مخصصة عن المادة الفعالة والمصنعة: الرجاء أنظر بند 6.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لـ: علاج قصور الالتهاب (حتى 3 أيام) لدى البالغين والمرضى من 14 تخفيف الآلام
المفاصل والعضلات، آلام الظهر، الصداع (وجع الرأس)، آلام الأسنان، آلام الدورة الشهرية وتخفيف
السخونة.

الصيدلة العلاجية: فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل هو مسكن الآلام وينتمي لمجموعة مضادات
التهاب اللاستيرويدية (NSAID).

2. قبيل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- أنت حساس (ديك حساسية) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المكونات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- أنت في الثلث الأخير من الحمل أو مرضعة.
- كان لديك في السابق رد فعل تحسسي عند تناولك دواء لتخفيف الآلام، التهاب أو أسخونة، مثل: ديكلوفيناك، إيبوبروفين أو حمض أسيتيل ساليسيليك (مادة تستعمل لمنع تكون جلطات الدم).
يمكن لردود الفعل أن تشمل: الربو، قصور، طحج جلدي، انتفاخ بالوجه، زكام. إذا لم تكن متأكد يجب استشارة الطبيب.
- كنت تعاني من قرحة في المعدة أو في الأمعاء.
- كنت تعاني من نزيف في الجهاز الهضمي، يمكن للأعراض أن تكون: دم في البراز أو براز أسود.
- كنت تعاني من مرض كبد أو كلوي أو خبيث.
- كنت تعاني من إحتشاء عضلي قلبي وجهد.
- أجريت لنس أو إذا كنت مصد للخضوع لعملية جراحية في القلب.
- لا يجوز تناول هذا الدواء بالتزامن مع أدوية أخرى مع النوبة أخرى مع مضادات الالتهاب اللاستيرويدية.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء:

قبل العلاج بفولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل أخبر الطبيب إذا:
• كنت تعاني من عتيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (الذي يشمل: ضغط دم مرتفع غير المنضبط، قصور القلب الاحتقاني، مرض قلبي إقفاري، مرض شرايين محيطية).
- كنت صاحب عوامل خطر هلوسة مثل: ضغط دم مرتفع، مستويات مرتفعة من الكوليسترول، من أمراض الكلى، مرض السكرى، إذا كنت متخبط.
- إذا كنت في السابق من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة، نزيف أو براز أسود.
- عتيت في السابق من عدم راحة في المعدة أو من قرحة بعد تناولك مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب.
- كنت تعاني من مشاكل في الأمعاء.
- كنت تتناول مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب إضافية.
- تجاوزت عمر 10.
- كنت تستخدم أكثر من 3 مشروبات كحولية لليوم.
- كنت تعاني من نوبة حامية مجموعة (SLE) أو وضع طبي مشابه.
- كنت تعاني من حساسية.
- لديك مشاكل في الكلى أو الكبد.
- كنت تعاني من التهاب في الساقين.
- كنت موجود في خطر الجفاف (نزيف، إسهال، قيء أو بعد عملية جراحية).
- كنت تعاني من اضطراب في التمثيل الغذائي أو اضطرابات أخرى في جهاز الدم، بما في ذلك وضع نادر في الكبد يسمى **hepatic porphyria**.
- كنت حاملًا أو تحمطين للحمل، أخبري الطبيب.
- يجب تناول دواء من هذه المجموعة أو أي مسكن آلام آخر في الماضي أعراضًا جانبية خطيرة.
- كنت تعاني من مشاكل أخرى أو من مرض الشص الضام.

تحذيرات إضافية:

من الممكن أن تكون لأدوية كيتوفيناك عائلة الأرواح طفيف بالاختطار لسكتة قلبية (3 احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية. الاختطار أكثر احتمالًا بجرعة عالية وباستعمال مستمر.
عوضًا من المهم تناول الدواء بجرعة الأواني، تسكن الألم لأقصى مدة، بغية التخفيف قدر المستطاع الاختطار لأعراض حساسية قلبية وحساسية.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها حتى إلى ٦ كبسولات في اليوم أو الفترة الزمنية الموصى بها (المعالج ٣ أيام بسبب).
إذا شريت خلات استعمال فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل بعلمت أو أعراض لمشاكل في القلب أو الأوعية الدموية مثل ألم في الصدر، ضيق التنفس، ضيق أو خثيخ غير واضح يجب اتوجه إلى الطبيب فورًا.
إذا نقلت الدواء من علامت الفلوت (صداع، سخونة) وبالتالي التصعب من تشخيص الفلوت. إذا لم تتحسن جيدًا وتوجه إلى الطبيب، يجب إعلام الطبيب بذلك تتناول فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل.
إذا كنت مصد الاختطار لعملية جراحية (يشمل جراحة الأسنان)، يجب إبلاغ الطبيب عن تناول هذا الدواء.
من الممكن الحساسية ضد الأدوية أكثر لفراترين أكتي-جو مقارنة بالبالغين آخرين. لذلك يجب الحرس على تناول الدواء وفقًا تعليمات الطبيب وتجنب كمية الأواني من الكمولات المفترية لتخفيف الأعراض. من المهم إبلاغ الطبيب المعالج فورًا عن كل عرض جانبي.
عند تناول فولتارين أكتي-جو وفقًا تعليمات الطبيب، بجرعة عالية أو لفترة زمنية متواصلة، يؤمم بإجراء فحوصات مختبر (دم، بول، وظائف الكبد والكلى) من أجل التأكد بأن نتائج الفحوصات هي في النطاق الطبيعي. من المحتمل حدوث ارتفاع في إنزيمات الكبد حيث يتطلب وقف العلاج بعد استشارة الطبيب.

- أدوية التي تقلل الأيض فولتارين أكتي-جو ليكويد جل مثل فريكاتول
- تريمتوبريم (إملاح) ومنع التهابات في المسالك البولية، قد يسبب ارتفاعًا في مستويات البوتاسيوم في الدم).

استعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء قبل الأكل.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملًا، فتعد أنك حامل أو تحمطين للحمل، لا يجوز تناول فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل ويجب التوجه إلى الطبيب. خاصة لا يجوز تناول هذا الدواء بالاشور الثلاثة الأخيرة من الحمل.

إذا كنت مرضعة لا يجوز استعمال الدواء.

الوقاية واستعمال الأمان:

قد يؤدي استعمال الدواء في حالات نادرة لندوار، تعب أو تعب. لا تصنع التبليغ أيضًا عن مشاكل في الرؤية، إذا كانت تظهر بهذه الأعراض، عليك الانتقاء عن سيطرة المركبة، تشغيل مكبات خطرة وعن أي تقاطع يتطلب الوقاية. يجب إبلاغ الطبيب بمرح وقت ممكن إذا كنت تتضر بهذه الأعراض.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء:

الدواء يحتوي على سوربيتل. إذا قبل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب التوجه إلى الطبيب قبل الاستعمال.

4. كيف تستعمل الدواء؟

عليك التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:
البالغين والمرضى فوق 14 : ٢ كبسولات عند ظهور الأعراض. إذا لزم الأمر، أكمل العلاج مع كبسولة واحدة أو اثنتين كل ٦-٨ ساعات حسب الحاجة.
لا يجوز تناول أكثر من ٦ كبسولات خلال ٢٤ ساعة.
إذا لم تلمر تحسن على وضعك خلال ٣ أيام في حال وجود سخونة - ٢ أيام في حال وجود ألم، يجب التوجه إلى الطبيب.
إذا استمرت الأعراض يجب استشارة الطبيب.
هذا الدواء غير مخصوص للأطفال تحت 1٤ سنة.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
• يجب تناول الجرعة الأولى التي تحقق هدف الاستعمال.
• يجب تناول الدواء بكامله مع الماء.
• يجب تناول الدواء قبل الطعام.

إذا تناولت الدواء بقطعة جرعة أكبر، أو إذا فرطت في تناول الجرعة أو إذا بلغ طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء مطم.

إذا أصبحت لمرض عرجًا، يجب تناولها فور تشرك. إذا كان التهابت قريب من الجرعة التالية، يجب تعطي الجرعة التالية وتناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي. لا يجوز تناول جرعتين معًا.

لا يجوز تناول أدوية في الطحال حتى من المصنق والجرعة الدوائية هي كل مرة تتناول فيها دواء. ضع التحذيرات الطبية التالية الأمر ذلك.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فم باستشارة الطبيب أو الصيدلي.

5. الأعراض الجانبية:

كل أن دواء، قد يسبب استعمال فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل أعراض جانبية لدى جزء من المستعملين.

يجب إبلاغ استعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب فورًا إذا كنت تتضر بأحد الأعراض التالية:

- ألم بطن، مرضية في الهضم، حرقة، خازات، غثيان، قيء، (أعراض جانبية شائعة جدًا، تظهر لدى ١٠ بين ١٠٠)
- خزان قلب، ألم دوري، وشق في الصدر (علامات لسكتة قلبية أو احتشاء عضلة القلب)، ضيق التنفس، صعوبة في التنفس، صعوبة الاستقام، انتفاخ في الساقين (علامات لخلل في القلب). هذه الأعراض غير شائعة (تظهر بونتر ١-١٠ بين 1000).
- ضغط دم مرتفع.
- آلام بطن شديدة، براز دموي أو أسود، قيء دموي، إسهال دموي.
- رد فعل تحسسي، الذي يشمل صعوبة في التنفس أو البلع، انتفاخ الوجه، القم، اللسان أو الحلق المصحوب في أوقات تقاربة بطعم في الجلد.
- إغماء.
- صعوبة مفاجئة في التنفس، إحساس ضغط في الصدر المصحوب بصفير أو سُعال (علامات لربو)، صداع مفاجئ، وشديد، تصلب الرقبة، صعوبة في الكلام.
- تشنجات.
- طفح في الجلد المصحوب ببقور، نشر الجلد، يقع أرجوانية في الجلد، تورحت في الدم أو في العينين، التهاب في الجلد المصحوب بتقرح أو حثرة.
- تورم في الرضحين، العينين، الساقين، القدمين (وذمت).
- تغير في لون أو حجم البول، فرط البروتين في البول، دم في البول.
- اسفرار البشرة أو العينين (علامات الوراثي، فشل كبد)، ارتفاع بمستويات إنزيمات كبدية، حساسية في الحلق، التهاب، الإيون، البثور، احمرار، تورته، الطفح الجلدي.
- نزيف أو كدمات غير اعتيادية، ارتفاع بالحرارة أو ألم مستمر بالحرارة، ثلوث متكررة.
- فرط التنفس في الجلد الضام.

من المحتمل أن تكون هناك علاقة تبادلية بين زيادة الاختطار لسكتة قلبية (احتشاء عضلة القلب)، الاختطار أكثر ارتفاعًا بجرعة أعلى واستعمال مستمر.

أعراض جانبية إضافية: أعراض جانبية إضافية التي قد تحدث هي عذة متعلقة. إذا كنت تتضر بأحد هذه الأعراض اتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
تهورها هي أوقات متقاربة شوها حتى ١٠:٠٠ إسهال، انخفاض الشهية، صداع، دوخة، طفح جلدي، دوار.

تظهر في أوقات نادرة شوها حتى ١٠٠٠٠:٠٠٠ نطس، تب شاذ، طفح مصحوب بحكة، تظهر في أوقات نادرة جدًا شوها حتى ١٠٠٠٠:٠٠٠٠ نطس، بمستوى كريات الدم البيضاء أو الحمراء؛ إسهال، تورحت في الدم، انتفاخ اصراع أو ألم في البطن، اضطراب في التدرج، تسبجات في أخى العين، حكة وإحمرار في الجلد، تسببات الشعر، وخز أو اختداد (دمل) في اليدين أو في الساقين، رجفان، ضيق في الرؤف، طنين في الأذنين، إصابة في السمع، تغير السراج، صعوبة في النوم، إحساس بالارتقاع، دوران اكتفسي، كوابيس، إصابة، اضطراب التفكير، قرحة في شحري، إذا قامت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي، لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

6. كيف تخزن المستحضر؟

تجب اتسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال وأز أرضهم وذلك لمنع التسمم. لا تسبب التقيون تعليمات مبرجة من الطبيب.
لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة / الزجاجات الكرتونية، المصنق، تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
شروط التخزين: يجب التخزين دون 3٠ درجة مئوية.

7. معلومات إضافية:

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:
Macrogol 800 (Polyethylene glycol 800), Glycerol 85%, Purified Water, Gelatin, Polysorb 85/7000 (dry substance), Quinoline yellow 70% E104.

كيف يبدو الدواء وما هي مقومات العبوة:

فولتارين أكتي-جو كبسولات ليكويد جل هي كبسولات صفراء صغيرة.

صاحب التسجيل وعتوله: NCH جرمن، شارع ماسنيسفوس 14، بيتنكفا.

أحضت هذه النشرة وتم المصاغة عليها من قبل وزارة الصحة في تشرين الثاني 2٠١٣.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأنوية الحكومية في وزارة الصحة: 1٥٠-٩٩-3٣٧١-٠٠

للمتوسط وتصهيل التفرامة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المتكرر. لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.