

إذا كنت حساساً لطعام ما أو دواء ما، عليك إعلام الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول أدوية إضافية، بما في ذلك الأدوية التي تباع دون وصفة طبية وإضافات التغذية، أو إذا أنهيت اللتو علاج بدواء آخر، عليك إبلاغ الطبيب المعالج وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناجمة عن التفاعلات بين الأدوية، خاصة بالنسبة للأدوية من الجموعات التالية: أدوية لعلاج أمراض القلب / فرط ضغط الدم، سيميدين، مخدرات موضعية أخرى.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى الفعالية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء استعماله أعراض جانبية. إذا لم تنتهي الأعراض الجانبية أو أنها تسبب المضايقة، يجب استشارة الطبيب.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

عند ظهور تهيج، طفح جلدي أو التهاب موضعي (الذي لم يكن موجوداً قبل استعمال المستحضر) (نادرًا) - توقف عن العلاج وتوجه إلى الطبيب فوراً! علامات فرط الامتصاص: فرط التعرق، جلد شاحب، ضربات قلب بطيئة أو غير منتظمة، صعوبات في التنفس، تغيرات في الرؤية أو السمع، ارتباك، تشنجات، دوار، شعور بالسخونة، البرودة أو نمل (إحدار)، ارتجافات، فرط التيقظ، نعاس - توقف عن العلاج وتوجه للطبيب فوراً!

عند الاستعمال للبواسير: إذا لم يطرأ خسن خلال 7 أيام أو إذا طرأ تفاقم، يجب التوجه للطبيب.

في أي حالة تشعر بها أعراض جانبية لم تذكر بهذه النشرة، أو إذا طرأ تغيير على شعورك العام عليك استشارة الطبيب فوراً!

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية لدى الأطفال

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن أي عرض جانبي وعن أي دواء آخر يتناوله الطفل. أنظر الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية المفصلة أعلاه.

الجرعة الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

هذا الدواء غير مخصص بشكل عام للأطفال ما دون عمر سنتين. لدى الأطفال فوق عمر سنتين وحتى عمر 12 سنة: لا يجوز تدهين أكثر من

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) ١٩٨٦-
إقرأ النشرة بإيعاز حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

عزركائين كريم

التركيب:
المركب الفعال Lidocaine 5%

المادة الغير فعالة

Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, water, lactic acid.

الفصيلة العلاجية: مخدر موضعي من فصيلة الأميدات.

الفعالية الطبية: الدواء مخصص للتثدير الموضعي ولتحفيض موضعي للألام في الجلد والأغشية المخاطية، مثل التشدقات، المدوش والبواسير وأيضاً قبل علاجات موضعية للجلد.

متى لا يجوز استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كانت معروفة لديك حساسية لأحد مركباته، أو مادة مخدرة موضعية أخرى من فصيلة الأميدات.

لا يجوز الاستعمال على جروح متقرحة، جروح مفتوحة، جروح مفتوحة، حروق أو مساحات جلد واسعة. إن استعمال المستحضر في أوقات متقاربة، على مساحات جلد واسعة أو لفترة زمنية طويلة، بما في ذلك قبل العلاجات التجميلية قد يسبب ظهور أعراض جانبية وخيمة نتيجة إلى فرط الامتصاص. الأعراض مفصولة في ما يلي في فترة الأعراض الجانبية. هذا الدواء غير مخصص للاستعمال في العينين.

لا يجوز استعمال المستحضر دون استشارة الطبيب قبل بدء العلاج في الحالات التالية: إذا كنت حاملاً أو مريضاً. إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل بوظيفة: الكبد، الكلى، القلب وأو الأوعية الدموية، أو إذا كنت مريضاً مسنّاً.

تحذيرات:

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة متواصلة دون استشارة الطبيب.

الأطفال و/أو الرضع، وبذلك تمنع التسمم.
إذا قمت أنت أو طفل ببلع جزء من الدواء بالخطأ، فيجب التوجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، مصطحبًا عبوة الدواء معك.
لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
لا يجوز تناول الدواء في الظلام! حفظ من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

التخزين: يجب التخزين تحت ٢٥ درجة مئوية.
تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى في ظروف التعبير/
التخزين الموصى بها. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر! في أي حالة شك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.
لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم تسجيل الدواء: ١٦٣٠٢٧٧٩١

مختبرات رافا م.ض، ص.ب. ٤٠٥، القدس ٩١٠٠٣

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة وفحص محتواها ورخص من قبلها في تشرين الثاني ٢٠١١.

١. غرام كريم على كل كغم وزن جسم (تدهين ما يقارب ٣ سم كريم على كل ١٠ كغم من وزن الجسم). حتى ثلاثة مرات في اليوم (كل ٨ ساعات).
لدى البالغين والأطفال ما فوق عمر ١٢ سنة: لا يجوز تدهين أكثر من ٥ غرام كريم (ما يقارب ١٥ سم) مرة كل ٦ ساعات. لا يجوز استعمال أكثر من أنبوبة واحدة في اليوم.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.
لمشاكل الجلد المزمنة، الوخيمة أو الممتدة، يجب استشارة الطبيب.
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذن به:
ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.
يجب تجنب التماس مع العينين. في حالة التماس مع العينين، يجب شطفها بالماء جيداً.

كيفية الاستعمال:
يجب تدهين طبقة رقيقة موضعياً على المنطقة المصابة، حسب الحاجة. لا يجوز تضميد أو تسخين الموضع.

تجنب التسمم!
يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي