

סימני סיגת יתר: העט יתר, עור חיוור, פעימות לאויסיות או לא סידירות, קשיי נשימה, שיכרים בראש ואחור, בלוטן, עזיזה, מחרשת חום, קרן או נמלול, רעדות, עררות גוף, נמנם – הפסיק טיפול ופנה לחופא מיד!

בשימוש לתושפין: אם אל לשל שיפור תוך 7 ימים או אם חלה החמרה, יש לנפנות לחופא.

בכל מקרה שבו הין מרגיש תופעות לאויא שלוא צוין בעלון זה, או אם חילמי בהרגשת הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מידי!

#### **טופוטו ללוויית תובוגות בין תרופתיות בילדים ובינקות:**

על ההורים לדוחו לרופא המסלול על כל תופעת לוואי ועל כל תופעה נוספת נספתח הניתנתليل.

#### **מין מקובל בהעדר והואה אחרת מופוא:**

תופעה זו אינה עשויה דברך כלל לתפקידות מתלה לגיל.

בילדים מגיל שניים ועד גיל 12: אין למחרת יותר 0.1–0.5 גרם קרם על כל ק"ג משקל גוף (רומי של בערך 3 ס"מ קרם על כל 10 ק"ג של משקל גוף), עד 3 פעעים ביום (כל 8 שעות).

במבוגרים לילדיים מעל גיל 12: אין למחרת יותר מ- 5 גרם קרם (כ-15 ס"מ קרם) פעם ב- 6 שעות. אין להשתמש בירור משופורת אחת ליום.

אין ללבור על מהו מופולצת.

בליעותם תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

#### **שים לב:**

לא בליעות! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להינטע מגע עם העיניים. במרקחה של מגע עם העיניים, יש לשטוף אותן באופן ייטב במים.

#### **אופן השימוש:**

יש לרמות מוקנית בשכבה דקה על האזור הנגע, לפי הצורך. אין לחפש או לחפש את המוקם.

#### **מנע הרעלת!**

תרופה זו ולת תופעה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם של ילדים / או תינוקות ועל-ידי תינוקת הנעלאה.

אם בנסיבות אתה או ילד בלבד מחותך פנה מיד לחדר מין של בית-חולמים, והבא זאת תרופה אחרת.

אל תגרום להקאה לאוואה מופרשת מופוא!

אנו ליטול ואל תשתמש בתרופה בחולן! בדק התוויות והמנה בכל פעע שהין משתמש בתרופה. הרוכב משקפיים אם ההין זוקק להן.

בתרופה יש לאחחסן מתחת ל- 25°C.

אחסנה: יש לאחסן מתחת לאויא האירוח/אנטונה המומלץ, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים גם לפיעלי האירוח היפוגה של התכשיטי בבל מקרה של ספק, עליך להויעץ ברופך שיסיק לך את האירופה.

אין לאחסן תרופות שונות באווcie איזודה.

**שם רישום התרופה:** 163027791

**בזכרכ**  
מעובדות רפואי, ר'ב' ע"מ, ירושלים 405, 91003  
בנוסף עלון זה נקבע ע"מ משרד הבריאות ומתכו נבדק ואושר על ידו בדצמבר 2011.

עלון לצריך לפי תקנון הרוקחים (תקנירום) התשמ"ז – 1986  
קרא בעין את העלון עד סופו בטראם תשתמש בתרופה

## **עזרהין קרם**

**הרכב:**  
**Lidocaine 5% הפעיל**  
**הרכיבים נלווים פעילים**

**מרכיבים נלווים פעילים**  
Emulsifying wax, cetyl alcohol, glycerin, methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, water, lactic acid.

**קבוצה רפואיות:** מאלחש מקומי מוקבצת האמידים.

**פעילות רפואיות:** התגובה מיועדת לאלחוש מקומי ולהקלת כאבים בעור ובירית, כגון חתכים, שפשופים וחוורים וכן פין טיפולם מוקומים בעור.

#### **מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש בתכשיר אם ידעה גרשוש לוח מרביבין, או לחומר אלחוש מקומי אחר מוקבצת האמידים.

אין להשתמש לפצעים מוגלטים, פצעים פתיחים, כוויות או על שחיי עור נרכבים. שימוש בתכשיר לעיטם קרבונת, על שחיי עור נרכבים או לפחות זמן ממושך, כולל לפני טיפולים קוסמטיים. עלול לרום להויעץ תופעות לוואי חמורות עקב סופית יתרה. התגובה מופרעת הולך בסעיף תופעות אלה.

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בעיניים.

**אין להשתמש בתכשיר מבלי להויעץ ברופא לפני התחלה הטיפול במרקם,** הבאים: אם הין בהרין או מניקה. אם הין סובל או סובל בעור מלוקי בתפקודו: הכבד, הכלוון, הלב / ואילך דם, או אילך חולה גיראיסו.

**אזורות:** אין להשתמש בתרופה זו לעיטם קרבונת או תקיפה ממשוכת מבלי להויעץ ברופא.

אם הין וריש ורשות כלשהו או לתופעה כלשהי, אך להויעץ על-כן לרופא לפני נטילת התויה.

**תגובהות בין תרופתיות:** אם הין נטל תרופות נוספות, כולל תרופות הנמכרות ללא מרשם ותוספי תזונה, או אם סימת הין עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המסלול כדי למלען סוכנים או –א –יעילות הנכברים מתגובהות בין-תרופתיות, במקרה לגבי תרופה מההקטצות האבות: תרופות טיפול במלחות לב / יתר לחץ דם, סימטיין, מאלחשים מקומיים אחרים.

**תופעות לאויא:** בסופ עלילויות רציזיה של התרופה, בmoment השימוש בה עלולות להופיע תופעות לאויא. אם תופעות הלויא אין חולפה או שנאן מסטריזן, יש להויעץ עט החופא.

**תופעות המחייבות תחיתות מוחדרת:** בהופע ירי, פריחה או מדקה מוקמים (שלא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר) (MRI) –

הפסיק טיפול ופנה לחופא מיד!  
בהתשען את העלון עד סופו בטראם תשתמש בתרופה