

**نشرة للمستطك**، **بوجيب** للشفة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

يسوق الدواء بدين وصفة طبيب

## كالبيتين معلق

١٥ مل تحتوي على
٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

## كالبيتين فورته معلق

١٥ مل تحتوي على
٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

## كالبيتين اقراص

٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

## كالبيتين فورته حبسولات

٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

٦٢٢ ملج بسيموث سالبسيليلات (Bismuth Subsalicylate 262 mg)

٦ معلومات إضافية
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء إذا كانت لديك علامات (أمراض) المرض أو لم تتحسن بعد يومين كذلك إذا ترافق الإسهال بسخونة عالية. إذا حصل خنين في الأذنين، أو فقدان للسمع.

### ١) لأي غرض مخصص الدواء؟

• التخفيف في حالات الإسهال، الخثيان، الغازات، آلام البطن المشيوية، سعال المعدة وسعجات في الحمض.

### ٢) قبل إستعمال الدواء:

**لا يجوز إستعمال إذا:**

- كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء.
- لا يجوز الإستعمال في أمراض ترققها سخونة مثل الإنفلانزا وجدري الماء وخدشها متلازمة ريبلي.
- يحتوي الدواء على سالبسيليلات. لا يجوز إستعمال الدواء (أو إذا كانت تتناول مستحضرات أخرى تحتوي على سالبسيليلات).
- كنت تعاني من حمى في المعدة (قرحة)، أنزفة، براز دموي أو أسود.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

- ١) قبل بدء العلاج**
  - كما يجب تجنب الإفراط في شرب البيرة.
  - كنت في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة.
  - كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي(مثل الربو)، التليف، جهاز البول، الجهاز الهضمي (مثل القرحة المعدية)، جهاز الدم (مثل التخثر وأنخ)، الكلى، من جفاف. إذا كان لديك سخونة.
  - إذا كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، خاصة للأسبيرين والساليسيلات، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل إستعمال الدواء.
  - لا يجوز إستعمال الدواء لدى الأطفال والمراهقين حتى عمر ٢٠ سنة الذين يعانون من إنفلانزا أو جدري الماء أو لديهم سخونة أو طفحاً الكثير من السوائل.
  - لا يجوز إعطاء الدواء للأطفال أو للكبار لعلاج غثيان ذو خلفية عضوية.
  - لا يجوز إستعمال الدواء إذا تفاقمت علامات (أمراض) المرض أو لم تتحسن بعد يومين.
  - لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة أو لفترة طويلة يوم إستشارة الطبيب.
- ٢) إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية.**
  - عليك إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأدوية التي كنت تتناول الأسبيرين وسالبسيليلات، أدوية مضادة لتشنج، أدوية مضادة للقرص، بروبينيد أو سولفينديازول، نيكروتيكينيات، أدوية السكرتي، أدوية لتهاب المفاصل (arthritis).
- ٣) إستعمال الدواء والطعام:** يمكن تناول الدواء مع الطعام أو بدون.
- ٤) إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:** لا يجوز شرب البيرة أو المشروبات الراجعة أثناء فترة العلاج بالدواء.
- ٥) الحمل والإرضاع:** إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، يجب إستشارة الطبيب قبل إستعمال الدواء.
- ٦) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:** يحتوي الدواء على سالبسيلات. لا يجوز إستعماله إذا كنت حساساً للسالبسيليلات، بما في ذلك الأسبيرين، أو إذا كنت تتناول مستحضرات أخرى تحتوي سالبسيليلات.

### ٣) كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيفاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن ولتقاً المقار الدوائي الإحتيادي عادةً من:

**كالبيتين اقراص وكالبيتين فورته حبسولات:**

المقار الدوائي الإحتيادي عادةً من:

عمر المعلق
كربن واطفال فوق ١٢ سنة
١٢ سنة
كالبيتين فورته حبسولات

عمر المعلق	اقراص	كالبيتين فورته حبسولات
كبار واطفال فوق ١٢ سنة	قرصين	حبسولة واحدة

يحتسب من الأطفال دون عمر ١٢ سنة يجب إستشارة الطبيب في حال أروصي بذلك من قبل الطبيب.
أطفال دون عمر ٩ سنوات، بوصفهم بإستعمال كالبيتين معلق بالإمكان تكرار هذا المقار الدوائي حسب الحاجة كل نصف ساعة حتى سامة، حتى ٨ مرات في كل ٢٤ ساعة.
يجب بلع الدواء مع الماء.

لا يجوز سحق اقراص كالبيتين فورته. من أجل تسهيل عملية البلع، لكن يجب بلع الشطرين معاً.

لا يجوز تجاوز المقار الدوائي الموصي به.

**كالبيتين معلق وكالبيتين فورته معلق:**

المقار الدوائي الإحتيادي عادةً هو:

عمر المعلق	كالبيتين معلق	كالبيتين فورته معلق
كبار واطفال فوق ١٢ سنة	٢٠ مل	١٥ مل

الطال دون عمر ١٢ سنة يجب إستشارة الطبيب.
ساعة حتى سامة، حتى ٨ مرات في كل ٢٤ ساعة.

قبل الإستعمال يجب خض الدواء جيداً ثم الشرب حسب المقار الدوائي الموصي به.
يجب الحرص على قياس المقار الدوائي، وبشكل أو بغيره المرفقة بالدواء.

لا يجوز تجاوز المقار الدوائي الموصي به.
إذا تناولت بالإضافة مقار دواء أخرى:
إذا تناولت بالإضافة مقار دواء أخرى، بما في ذلك مطبق بالأشعة في المستشفى مصححياً عبوة الدواء معك.
لا تسيب النقيظ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا شعيت تناول الدواء، إذا شعيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فيجب تناول مقاراً بواحيما حال تذكرتك بذلك، ولكن في أي حال من الأحوال لا يجوز تناول مقارين دوايين معاً.

كيف يمكنك المساعدة في نجاح العلاج، في حالة حدوث إسهالات يجب الإنتظار في شرب المشروبات العادية من الكتلين من أجل التخلص على لغدان السوائل.

لا تتناول الأدوية في العتمة، يجب ششخص طابع الدواء والتأكد من المقار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. خضع النظارات الطبية إذا أزم الأمر كذلك.

إذا تكرر عليك إصابة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشِر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كالبيتين قد يسبب أحياناً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتشوش من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز إلا تعاني أما منها.
**يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً إذا:**

ظهرت الأعراض التالية: ضعف، تشنجات، مشاكل في التنفس، شعور أروية، ارتداد، خنين في الأذنين أو فقدان السمع، إسهال خفيف.

**يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب بأسرع وقت ممكن إذا:**

ظهرت علامات تناول مقار دوائي مغاير مثل تعاس صداد، في حال حدوث إسهال يترافق بسخونة عالية.
قد يؤدي هذا الدواء إلى تغير في لون البراز أو اللسان. هذه التغيرات لا تدعو للقلق.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

### ٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التشميم، يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان معلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لتفادي أضرارهم والتشميم.
لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتقاص تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة أو الغشيرة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
خزن الدواء بدرجة حرارة الغرفة حتى ٢٥ درجة مئوية.

### ٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

**كالبيتين اقراص:**

Mannitol, Povidone, Calcium Carbonate, Sodium Saccharin, Red Lake No. 3, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Polyorbate 80, Sodium Starch Glycolate, Microcrystalline Cellulose, Eudragit-E, Talc.

يحتوي كل قرص على ما يقارب ١,٥ ملج سوديوم

**كالبيتين فورته حبسولات:**

Povidone, Sodium Starch Glycolate, Polysorbate 80, Calcium Carbonate, Microcrystalline Cellulose, Coloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate, Red Lake No. 3, Opadry II.

يحتوي كل حبسولة على ما يقارب ١,٥ ملج سوديوم

### كالبيتين معلق

Aluminium Magnesium Silicate, Carboxymethylcellulose Sodium, Propylene Glycol, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Salicylic Acid, Saccharin Sodium, Sodium Salicylate, Ponceau, Methyl Salicylate, Purified Water.

يحتوي كل ١٥ مل على ما يقارب ٧ ملج سوديوم

### كالبيتين فورته معلق

Aluminium Magnesium Silicate, Carboxymethylcellulose Sodium, Propylene Glycol, Sorbic Acid, Benzoic Acid, Salicylic Acid, Saccharin Sodium, Sodium Salicylate, Ponceau, Raspberry Flavour, Purified Water.

يحتوي كل ١٥ مل على ما يقارب ١٥ ملج سوديوم

### كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة؟

كالبيتين اقراص زهرية مستطيلة ضمن لوجبة (بليستر) أو قنبية

كالبيتين فورته حبسولات زهرية مغولة ضمن لوجبة (بليستر).

كالبيتين معلق سائل زهري لزوج ضمن قنبية ١٠٠ مل.
كالبيتين فورته معلق سائل زهرمي لزوج ضمن قنبية ١٠٠ مل.

المنتج وصاحب الإقتياز:
سالم أورن دى، شارع فاعالورا ٢٥، بات، بام.

**ارقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

كالبيتين اقراص:

كالبيتين فورته حبسولات:

كالبيتين معلق:

كالبيتين فورته معلق:

القرن وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها أخص ولخص في تاريخ كانون الثاني ٢٠١٥.
تمت صياغة هذه النشرة من أجل سهولة وتعوين القراء.
تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.