نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريدازين ١٠ ملغ

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها: يحتوي كل قرص على:
١٠ ملغ تيوريدازين هيدروكلوريد (Thioridazine HCl 10 mg)

ريدازين ٢٥ ملغ

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها: يحتوي كل قرص على:
٢٥ ملغ تيوريدازين هيدروكلوريد (Thioridazine HCl 25 mg)

ريدازين ١٠٠ ملغ

أقراص مطلية

المادة الفعالة وكميتها: يحتوي كل قرص على:
١٠٠ ملغ تيوريدازين هيدروكلوريد (Thioridazine HCl 100 mg)

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

هذا الدواء غير موصى به عادة للأطفال وللرضع دون عمر سنتين.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لمعالجة مرضى إنفصام الشخصية الذين لا يستجيبون كما ينبغي لأدوية أخرى مضادة للذهان.

الفصيلة العلاجية: من فصيلة مستحضرات الفينوتيازين

٢) قبل إستعمال الدواء:

لا يجوز إستعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (أليرجي) للمادة الفعالة (تيوريدازين) أو لأحد مركبات الدواء الأخرى(أنظر الفقرة ٦).
- في حالات فقدان الوعي (السبات) أو التثبيط الشديد للجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك تثبيط ناتج عن الأدوية (أنظر فقرة "إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى").
- إذا كنت تعاني من خلل خطير في وظيفة القلب.
- بمشاركة أدوية أخرى التي تعرف بأنها تسبب إطالة المقطع QT (مثل مضادات حيوية من فصيلة الكوينولونات، ترفينادين، أستيميزول، سيساپريد، دروپيريدول، هالوپيريدول، ريسپيريدون).
- لدى مرضى متلازمة QT المطول الخلقي أو مرضى لديهم سابقة لإضطرابات في نظم القلب.
- بمرضى لديهم إضطراب وراثي الذي يسبب إنخفاضاً في نشاط سيتوكروم P450 2D6 (إنزيم يفكك الأدوية).
- بمشاركة الأدوية المثبطة لنشاط سيتوكروم P450 2D6 (مثل: فلوأوكسيتين وپاروكسيتين) والأدوية التي تثبط إستقلاب تيوريدازين (مثل: فلوفوكسامين، پروپرانولول وپيندولول).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- إن المعالجين الكبار الذين يعانون من الذهان المتعلق بالخرف معرضون لخطورة زائدة للوفاة.
- يجب إبلاغ الطبيب المخدر عن تناولك لهذا الدواء إذا كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية (بما في ذلك الأسنان) أو أي إجراء يتطلب التخدير.
- يجب الإمتناع عن الإنتقال المفاجئ من وضعية الإستلقاء أو الجلوس إلى وضعية الوقوف وذلك لتجنب حدوث دوار وفي حالات متطرفة الإغماء.
- إن إستعمال هذا الدواء قد يؤدي لحدوث إضطرابات في الجهاز العصبي المركزي، مثل: المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان (NMS) وخلل الحركة المتأخر (أنظر فقرة "الأعراض الجانبية").
- تيوريدازين قد يسبب إطالة المقطع QT كأمر متعلق بالمقدار الدوائي وبالتالي قد يؤدي لحدوث إضطرابات في نظم القلب (من نوع Torsades de pointes) و للموت المفاجئ.
  قد تزداد خطورة حدوث هذا الأمر بمشاركة أدوية معينة ولذلك، يجب إبلاغ الطبيب بأنك تتناول ريدازين قبل تناول أدوية جديدة.
- من شأن المعالجين الذين قاسوا من رد فعل تحسسي لأحد مستحضرات الفينوتيازين، أن يكون لديهم أيضاً ميل لتطوير رد فعل تحسسي لمستحضرات أخرى من فصيلة الفينوتيازينات.
- إذا كنت تعاني من مستويات منخفضة لكريات الدم البيضاء أو عانيت في الماضي من حالة قلة الكريات البيض/ قلة العدلات بعد تناول أدوية - فأنت معرض لخطورة زائدة لتطوير حالة قلة الكريات البيض/ قلة العدلات.
- إن تحمل مستحضرات الفينوتيازين هو أقل لدى المعالجين المسنين. الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً لدى هؤلاء المعالجين هي: الپاركينسونية (أعراض تشبه مرض پاركينسون) وصعوبة الجلوس (حاجة ملحة للتحرك). كما أن، هناك خطورة زائدة لحدوث فقد المحببات و قلة الكريات البيض (أنظر فقرة "الأعراض الجانبية") لدى المعالجين المسنين.
- لدى مرضى إنفصام الشخصية الذين يعانون من الصرع، يجب مواصلة تناول الدواء المضاد للصرع خلال العلاج بـ ريدازين.
- عند تناول مقدار دوائي أكبر من الموصى به، فإن هذا الدواء قد يؤدي لحدوث مرض إلتهاب الشبكية الصباغي في العينين، الذي يتميز بتناقص حدة الرؤية، رؤية تميل إلى اللون البني ورؤية محدودة في الليل.
- إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من اليقظة وبالتالي يتوجب الحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل الماكنات الخطرة وبأي نشاط يتطلب اليقظة. لذلك يجب تناول الدواء بحذر ورفع المقدار الدوائي بالتدريج.
- النساء المعالجات بهذا الدواء لديهن ميل أكثر للمعاناة من إنخفاض ضغط الدم الإنتصابي مما هو عليه لدى الرجال. يجب تجنب معالجة إنخفاض ضغط الدم بواسطة إپينفرين، لأن مستحضرات الفينوتيازين يمكن أن تزيد من تأثير إپينفرين. عندما يتطلب الأمر إستعمال مقلصات الأوعية الدموية، فإن ليڤارتيرينول وفينيل إيفرين هي الأكثر ملاءمة.
- تيوريدازين قد يزيد من تأثير المواد المثبطة للجهاز العصبي المركزي (مثل: الكحول، مواد التخدير، الباربيتورات، مواد من فصيلة المخدرات، مستحضرات الأفيون، الأدوية الأخرى ذات المفعول النفساني وإلخ)، الأتروپين والمبيدات الحاوية فوسفور. بلغ عن حدوث تثبيط تنفسي خطير وتوقف التنفس لدى المعالجين الذين تلقوا فينوتيازين بمشاركة الباربيتورات بجرعات عالية.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تتناول:

- الأدوية المثبطة للإنزيم سيتوكروم P450 2D6 (مثل: فلوأوكسيتين، پاروكسيتين). لا يجوز تناول تيوريدازين سوية مع هذه الأدوية.
- أدوية مثل: فلوفوكسامين، پروپرانولول و پيندولول. لا يجوز تناول تيوريدازين سوية مع هذه الأدوية لأن مشاركتها قد يسبب إطالة المقطع QT ويزيد من خطورة حدوث إضطرابات خطيرة بنظم القلب تشكل خطراً على الحياة (مثل إضطرابات نظم من نوع Torsades de pointes).
- الأدويـة التي تسبب إطالة المقطع QT (تأثير على التخطيط الكهربائي للقلب) (مثل مضادات حيوية من فصيلة الكوينولونات، ترفينادين، أستيميزول، سيساپريد، دروپيريدول، هالوپيريدول، ريسپيريدون) - لا يجوز تناول تيوريدازين سوية مع هذه الأدوية.
- أدرينالين (إپينفرين).
- المواد المثبطة للجهاز العصبي المركزي (مثل: الكحول، مواد التخدير، الباربيتورات، مواد من فصيلة المخدرات، مستحضرات الأفيون، الأدوية الأخرى ذات المفعول النفساني وإلخ)، الأتروپين والمبيدات الحاوية فوسفور.

إستعمال الدواء والطعام:

يجب تناول الدواء مع وجبة الطعام.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج بالدواء.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، يجب إستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.

إن الرضع الذين تعرضوا للأدوية المضادة للذهان خلال الثلث الأخير من الحمل، معرضين لخطورة زائدة لحدوث أعراض خارج هرمية و/أو أعراض الفطام بعد الولادة. بلغ عن حدوث هيجان، توتر عضلي أكثر من المعتاد، توتر عضلي منخفض، رجفة، الميل للنوم، ضائقة تنفسية وإضطرابات في الإطعام.

يتوجب إستعمال تيوريدازين خلال فترة الحمل فقط إذا كانت الفائدة للأم تفوق الخطورة المحتملة للجنين.

السياقة وإستعمال الماكنات:

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من اليقظة ويؤدي لحدوث إضطرابات في الرؤية وبالتالي يتوجب الحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل الماكنات الخطرة وبأي نشاط يتطلب اليقظة. بالنسبة للأطفال يجب تحذيرهم من الركب على الدراجات أو اللعب بالمقربة من الشارع وما شابه.

معلومات هامة بخصوص بعض مركبات الدواء:

المستحضر يحوي لكتوز وقد يسبب أعراض غير مرغوب فيها لدى الأشخاص الذين لديهم عدم تحمل للكتوز.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

- يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

الكبار:

المقدار الدوائي الإبتدائي عادة هو ٥٠-١٠٠ ملغ ٣ مرات في اليوم. يمكن للطبيب أن يرفع المقدار الدوائي بشكل تدريجي حتى حد أقصاه ٨٠٠ ملغ لليوم حسب الحاجة. بعد تحقيق سيطرة على الأعراض، يقوم الطبيب بخفض المقدار الدوائي بشكل تدريجي وذلك لتحديد المقدار الدوائي الداعم الأدنى.

يتراوح المقدار الدوائي اليومي بين ٢٠٠-٨٠٠ ملغ مقسمة إلى ٢-٤ جرعات.

الأطفال:

هذا الدواء غير موصى به عادة للأطفال وللرضع دون عمر سنتين.

المقدار الدوائي الإبتدائي الموصى به هو ٠,٥ ملغ/كغ/يوم بجرعات مقسمة. يمكن للطبيب أن يرفع المقدار الدوائي بشكل تدريجي حتى الحصول على التأثير الدوائي الأمثل أو حتى مقدار دوائي قدره ٣ ملغ/كغ/يوم كحد أقصى.

يجب إستعمال المقدار الدوائي الأخفض وللفترة الزمنية الأقصر التي تعطي إستجابة سريرية كافية. يقوم الطبيب بتقييم ضرورة مواصلة العلاج من حين إلى آخر.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

- لا يجوز المضغ، الشطر أو السحق!
- لا يجوز إبقاء الدواء في الفم لأكثر من الزمن المطلوب لبلعه.

الفحوص و المتابعة

قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج يوصى بإجراء فحص التخطيط الكهربائي للقلب وفحص نسبة البوتاسيوم في الدم، خاصة خلال فترات ملاءمة المقدار الدوائي.

إن مقاساة المعالجين من أعراض التي قد يكون لها علاقة بإضطرابات نظم القلب من نوع Torsades de pointes (مثل دوار، ضربات قلب، إغماء)؛ من شأنها تبرير إجراء تقييم إضافي للقلب؛ بالأخص، يتوجب دراسة إجراء مراقبة بجهاز هولتر.

لدى المعالجين الذين يعانون من إنخفاض مستويات كريات الدم البيضاء أو المعالجين الذين عانوا في الماضي من حالة قلة الكريات البيض / قلة العدلات بعد تناول أدوية - يجب متابعة تعداد دم شامل بأوقات متكررة في الأشهر الأولى من العلاج. يجب إيقاف العلاج إذا لوحظ تناقص بنسبة كريات الدم البيضاء، في غياب عوامل أخرى لحدوث هذا التناقص.

عند ظهور سخونة أو علامات وأعراض أخرى لحدوث تلوث لدى المعالجين الذين يعانون من قلة العدلات، يجب التوجه إلى الطبيب لتلقي علاج فوري.

إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر، فقد تظهر الأعراض التالية:

إضطرابات بنظم القلب، إنخفاض ضغط الدم، صدمة، تغيرات في التخطيط الكهربائي للقلب، تباطؤ نظم القلب، تسرع القلب الجيبي (نظم قلب سريع ولكنه منتظم)، حجب أذيني - بطيني (إنقطاع جزئي أو كامل لنقل السيالة الكهربائية من الأذينين إلى البطينين)، تسرع قلبي بطيني، رجفان بطيني، Torsades de pointes ("إنقلاب التدريجات")، تثبيط قلبي، سكون (الشعور بنعاس)، تأثيرات خارج هرمية، إرتباك، هيجان، إنخفاض حرارة الجسم، إرتفاع حرارة الجسم، قلة راحة، إختلاجات، غياب الإنعكاسات، سبات، توسع الحدقتين، تضيق الحدقتين، جفاف الجلد، جفاف الفم، إحتقان الأنف، إحتباس البول، تشوش الرؤية، تثبيط تنفسي، إنقطاع التنفس، وذمة رئوية، تناقص حركية الجهاز الهضمي، إمساك، إنسداد الأمعاء، قلة البول، تبولن الدم (تواجد كميات فائضة من البولة في الدم).

إذا تناولت مقدار دوائي مفرط أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول مقدار دوائي حال تذكرك، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدارين دوائيين بنفس الوقت.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

- لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال ريدازين قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا:

- كنت تعاني من خلل حركي متأخر - متلازمة تتميز بحركات لا إرادية تشرك اللسان، الوجه، الفم، الشفتين والفكين (مثل: بروز اللسان، إنتفاخ الخدين، تقلص الفم وحركات مضغية)، الجذع والأطراف. المتلازمة هي غير قابلة للعكس أحياناً. يكون الشيوع أكبر لدى الكبار، خاصة لدى النساء البالغات. تزداد خطورة حدوث المتلازمة، بما في ذلك خطورة أن تكون المتلازمة غير قابلة للعكس، طالما كانت فترة العلاج أطول وطالما كان المقدار الدوائي أكبر. مع ذلك، يمكن أيضاً أن تتطور المتلازمة بعد فترة علاج قصيرة بمقادير دوائية منخفضة. يمكن أن تظهر المتلازمة خلال العلاج، عند خفض المقدار الدوائي أو بعد التوقف عن العلاج.
- كنت تعاني من المتلازمة الخبيثة للدواء المضاد للذهان (NMS) التي من شأنها أن تشكل خطراً على الحياة وأعراضها هي: إرتفاع خطير بحرارة الجسم، تصلب العضلات، تغيرات في الحالة النفسية، وعدم ثبات ذاتي (عدم إنتظام النبض أو ضغط الدم، تسرع النبض، تعرق زائد وإضطرابات في نظم القلب).

يجب التوجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن إذا:

- كنت تعاني من إطالة المقطع QT أو من تغيرات في التخطيط الكهربائي للقلب.
- كنت تعاني من أعراض تدل على حدوث إضطرابات بنظم القلب، مثل: دوار، ضربات قلب أو إغماء.
- كنت تعاني من قلة الكريات البيض/قلة العدلات (تناقص عدد خلايا الدم البيضاء)، فقد المحببات (نقص خطير في العدلات، نوع من خلايا الدم البيضاء).

أعراض جانبية إضافية:

- نعاس، خاصة في المقادير الدوائية العالية التي تعطى في بداية العلاج. يزول هذا التأثير عادة في سياق العلاج أو عند تخفيض المقدار الدوائي. أعراض تشبه داء پاركينسون وأعراض خارج هرمية أخرى. إرتباك ليلي، فرط نشاط، إرهاق، ردود فعل ذهانية، قلة راحة وصداع.
- جفاف الفم، تشوش الرؤية، إمساك، غثيان، تقيؤ، إسهال، إحتقان الأنف وشحوب.
- إرتفاع مستويات هورمون الپرولاكتين الذي يمكن كشفه بفحوص الدم، ويمكن أن يؤدي ولكن ليس بالضرورة، لظهور أعراض مثل: إدرار الحليب (إفراز يشبه الحليب من الحلمتين في غير فترة الإرضاع)، تضخم الثديين، غياب الطمث، تأخير القذف، وذمة محيطية وعجز جنسي.
- إلتهاب الجلد (Dermatitis)، تفشي شروي جلدي وحساسية للضوء.
- تضخم الغدد اللعابية المتوضعة من تحت الأذنين.
- إنتصاب مستمر ومؤلم للقضيب التناسلي (Priapism).
- نوبات تشنجية.
- إنخفاض ضغط الدم عند النهوض من وضعية الإستلقاء أو الجلوس.

أعراض جانبية بمستحضرات فينوتيازين أخرى:

بالإضافة للأعراض الجانبية التي ذكرت أعلاه، لوحظت الأعراض الجانبية التالية عند إستعمال أدوية أخرى من فصيلة الفينوتيازينات:

- ردود فعل ذاتية: تضيق الحدقتين، إمساك شديد، قلة الشهية للطعام، إنسداد الأمعاء الشللي.
- ردود فعل جلدية: حمامى (erythema)، إلتهاب جلدي تقشري، إلتهاب الجلد بالتماس.
- إضطرابات في الدم: إرتفاع عدد الحمضات في الدم (eosinophilia)، قلة الصفيحات الدموية (thrombocytopenia)، فقر دم (تناقص عدد خلايا الدم الحمراء)، فقر دم لا تنسجي ونقص خلايا الدم الشامل (إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء والصفيحات الدموية بنفس الوقت).
- ردود فعل تحسسية: سخونة، وذمة في الحنجرة، وذمة وعائية، ربو.
- سمية للكبد: يرقان، ركود صفراوي (إنسداد تدفق الصفراء داخل الكبد).
- تأثيرات على جهاز القلب والأوعية الدموية: إنخفاض ضغط الدم الذي يؤدي في أوقات نادرة لحدوث سكتة قلبية.
- أعراض خارج هرمية: صعوبة الجلوس (حاجة ملحة للحركة)، هيجان، قلة راحة حركية، ردود فعل من خلل التوتر (تقلصات متواصلة لمجموعات من العضلات)، إنكماش الفكين (تشنج عضلات الفك، التي تبقي على الفكين مغلقين بشدة)، تشنجات لا إرادية للرقبة، تشنج عضلي الذي يؤدي لإنحناء الرأس، الرقبة والعمود الفقري إلى الخلف، أزمة عينية - دورانية (إختلاط نادر لداء پاركينسون، حيث تثبت فيه العينين عادة بإتجاه الأعلى والجانب، لعدة دقائق أو ساعات)، رجفة، تصلب العضلات، عدم الحركة (قلة القدرة على الحركة).
- إضطرابات الغدد الصماء: عدم إنتظام الطمث، تغيرات في الرغبة الجنسية، زيادة الوزن، وذمة. بلغ عن الحصول على نتائج إيجابية كاذبة في فحوص الحمل.
- إضطرابات في الجهاز البولي: إحتباس البول، تسرب البول.
- إرتفاع الحرارة، انفعال، أحلام غريبة، تفاقم الذهان وإرتباك. متلازمة التي تتجلى بإصطباغ متقدم لمناطق في الجلد أو في ملتحمة العين التي تترافق أحياناً بتغير لون بياض العين المكشوف أو القرنية. بلغ أيضاً عن حدوث تعكر في العدسة الأمامية والقرنية الذي وصف بأنه غير منتظم أو يشبه الكوكب. متلازمة تشبه الذئبة الإحمرارية الجهازية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية، في مكان بارد ومظلم.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

ريدازين ١٠ ملغ:

Lactose monohydrate, Corn starch, Microcrystalline cellulose, Hydroxypropylmethyl cellulose, Talc, Magnesium stearate, Titanium dioxide, Polyethylene glycol, D&C yellow #10 lake, Sunset yellow lake, Indigo carmine lake, Brilliant blue lake.

يحتوي كل قرص على ٤١,٦ ملغ لكتوز

ريدازين ٢٥ ملغ:

Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Talc, Hydroxypropylmethyl cellulose, Magnesium stearate, Iron oxide yellow, Polyethylene glycol, Iron oxide black, Iron oxide red, Titanium dioxide.

يحتوي كل قرص على ٨٦,٩ ملغ لكتوز

ريدازين ١٠٠ ملغ:

Lactose monohydrate, Pregelatinized starch, Microcrystalline cellulose, Talc, Hypromellose, Magnesium stearate, D&C yellow #10 lake, Polyethylene glycol, Titanium dioxide, FD&C Blue #2 lake, Brilliant blue lake.

يحتوي كل قرص على ١١٢,١ ملغ لكتوز

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

ريدازين ١٠ ملغ:

قرص مطلي، لونه أخضر، مستدير ومحدب من كلا الجانبين.

الأقراص معبأة ضمن عبوة لويحة (بليستر). تحتوي كل علبة على ٤٠، ١٠٠ أو ١٠٠٠ قرص.

ريدازين ٢٥ ملغ:

قرص مطلي، لونه بني، مستدير ومحدب من كلا الجانبين.

الأقراص معبأة ضمن عبوة لويحة (بليستر). تحتوي كل علبة على ٣٠ أو ١٠٠٠ قرص.

ريدازين ١٠٠ ملغ:

قرص مطلي، لونه أخضر، مستدير ومحدب من كلا الجانبين.

الأقراص معبأة ضمن عبوة لويحة (بليستر). تحتوي كل علبة على ٣٠، ١٠٠ أو ١٠٠٠ قرص.

من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.

المنتج وصاحب الإمتياز: تارو للصناعة الدوائية م.ض.، خليج حيفا ٢٦٢٤٧٦١

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ريدازين ١٠ ملغ: ٢٤٧٢٦ ٢٦ ٠١٥

ريدازين ٢٥ ملغ: ٢٤٧٢٧ ٠٩ ٠١٥

ريدازين ١٠٠ ملغ: ٢٤٧٢٨ ٢٧ ٠١٥

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في: تشرين الثاني ٢٠١٤.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.