

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат отпускается без рецепта врача

Зовиракс Крем

Активное вещество и его концентрация: Ацикловир 5% w/w
Вспомогательные вещества: приведены в разделе 6.

Внимательно и полностью прочтайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту. Данный препарат отпускается без рецепта врача. Правильно применяйте препарат. Если Вы нуждаетесь в дополнительной информации, посоветуйтесь с фармацевтом. Вам следует обратиться к врачу, если признаки заболевания (симптомы) после 10 дней становятся более выраженными или не улучшаются.

Содержание данной инструкции:

1. Для чего предназначен Зовиракс
2. Перед началом применения препарата
3. Каким образом применяют препарат?
4. Возможные побочные явления
5. Как следует хранить препарат?
6. Дополнительная информация

1. Для чего предназначен Зовиракс

Зовиракс применяется для лечения простуды губ (губного герпеса). Активным веществом препарата является противовирусное соединение ацикловир. Следует наносить при появлении первых признаков герпеса (таких, как ощущение покалывания и зуд). Возможно применять препарат также для ускорения выздоровления в тех случаях, когда уже появились герпетические высыпания.

2. Перед началом применения препарата

Не применяйте Зовиракс:

- Если у Вас когда-либо наблюдалась аллергическая реакция на ацикловир, валацикловир, пропиленгликоль или на какой-либо из других ингредиентов (перечислены в разделе 6).
- Внутри ротовой полости (например, при язвах во рту) или в Вашем носу.
- При любой кожной инфекции, не являющейся герпесом.
- Для глаз или в области половых органов.

При применении препарата Зовиракс следует соблюдать особую осторожность

- Мойте Ваши руки всякий раз до и после нанесения препарата Зовиракс.
- Не касайтесь Ваших глаз до тех пор, пока Вы не вымыли руки после нанесения препарата.
- Если случайно крем попал Вам в глаза, промойте их тщательно теплой водой. Если Вы обеспокоены, посоветуйтесь с Вашим врачом.
- Избегайте прикосновения к герпетическим высыпаниям, чтобы не допустить распространения инфекции или ее обострения.
- Если Ваш врач сообщил Вам, что Ваша иммунная система ослаблена, перед началом лечения любого вида инфекции, свяжитесь с Вашим врачом.
- Если у Вас имеется какое-либо сомнение о наличии у Вас герпеса, свяжитесь с Вашим врачом.
- Если Ваши герпетические высыпания очень усилились, свяжитесь с Вашим врачом.

Если Вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед применением препарата Зовиракс, если Вы беременны, пытаетесь забеременеть или кормите грудью.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата Пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Цетостеариловый спирт способен вызывать местные кожные реакции (например, контактный дерматит).

3. Каким образом применяют препарат?

Подходит для всех возрастов:

- Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, если Вы не уверены.
- **Общепринятая дозировка:** следует начинать смазывание при появлении первых признаков герпеса (таких, как ощущение покалывания и зуд). Обильно смазывайте пораженный участок 5 раз в день.
- Продолжайте лечение в течение 5 дней. Если Ваши герпетические высыпания не заживают по истечении этого времени, Вы можете применять крем в общей сложности до 10 дней.
- Проводите лечение Вашего герпеса в течение полных 5 дней, чтобы обеспечить быстрое выздоровление.
- Если Вы забыли применить препарат, смажьте сразу, как только Вы об этом вспомнили, и продолжайте лечение, как и прежде.
- Если у Вас не произошло полного излечения герпетических высыпаний по истечении 10 дней, или в какой-то момент состояние ухудшилось, свяжитесь с Вашим врачом.
- Никогда не передавайте Ваш Зовиракс другим, даже если симптомы заболевания у них схожи с Вашими.
- Количество крема в данной упаковке достаточно для лечения одной вспышки герпеса. При возникновении рецидивов в будущем начинайте лечение с появлением первых признаков развития герпеса (таких, как ощущение покалывания или зуд). Возможно начать лечение также на стадии появления пузырька.
- Не превышайте рекомендуемую дозу.
- Не глотайте крем. Только для наружного применения. Если Вы случайно проглотили какое-либо количество крема, вряд ли это вызовет негативные последствия, однако, если это Вас беспокоит, проконсультируйтесь с Вашим врачом. Если ребенок случайно проглотил препарат, немедленно обратитесь к врачу или в приемное отделение больницы и возьмите с собой упаковку препарата.
- Не принимайте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

4. Возможные побочные явления

Как и при лечении любым лекарством, применение препарата Зовиракс способно вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к Вашему врачу, если Вы заметили:

- Явления, которые выглядят как аллергические реакции, например, опухание губ, лица и век.

Дополнительные побочные явления:

• Легкое жжение или покалывание, возникающие после нанесения крема. Эти явления быстро прекращаются.

• Покраснение, зуд или легкие сухость или шелушение кожи, кожные сыпи, крапивница или кровоподтеки.

Если появилось побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или если Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом.

5. Как следует хранить препарат?

Подходит для всех возрастов:

- Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте, и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.
- Не применяйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.
- Храните препарат при температуре ниже +25°C, но не в холодильнике.

6. Дополнительная информация

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит:

Propylene glycol, white soft paraffin, cetostearyl alcohol, liquid paraffin, arlacet 165 (glycerol monostearate, macrogol stearate 100), poloxamer 407, dimeticone 20, sodium laurilsulfate, and purified water.

Как выглядит лекарство и каково содержимое упаковки:

Зовиракс выпускается в виде помпы-дозатора или тюбика, с 2 г препарата. Возможно, что не все виды упаковок будут в продаже.

Дополнительная информация о герпесе

Герпес – это инфекционное заболевание, вызываемое вирусом простого герпеса (HSV), который находится в «древнем» состоянии и располагается в нейронах, иннервирующих губы и кожу вокруг них.

Когда происходит первичное заражение?

Первичное заражение происходит обычно в раннем детстве, по-видимому, при поцелуе человека, инфицированного этим вирусом. Вирус проникает через кожу, продвигается в направлении нерва и сохраняется в нервном синапсе в течение неограниченного времени.

Что может способствовать активации вируса?

Различные факторы, включая простуды, грипп, менструации, усталость, эмоциональное потрясение, стресс, физическую травму, воздействие сильного солнечного света и в случаях, когда Вы чувствуете себя «измождённым». В момент, когда вирус активизируется, он двигается в обратном направлении – по нерву к коже губ и вокруг них, и там уже вызывает развитие герпеса.

Помните - герпес заразен

Вирус способен инфицировать другие участки тела. Чтобы снизить риск распространения инфекции, не позволяйте другим прикасаться к Вашим герпетическим высыпаниям или пользоваться Вашими полотенцами и т.п. Вам следует избегать поцелуев и орального секса, если у Вас или у Вашего партнёра/Вашей партнёрши имеется активная форма герпеса. Всегда мойте Ваши руки до и после контакта с участками, поражёнными герпесом.

- Избегайте контакта с Вашими глазами. Инфицирование глаз вирусом простого герпеса (HSV) может привести к возникновению язв переднего отдела глаза (роговицы).
- Избегайте поцелуев – в особенности, с детьми, когда у Вас имеются проявления герпеса.
- Не вскрывайте пузырьки и не удаляйте корочки. Так Вы можете не только инфицировать Ваши герпетические высыпания другими микробами, но и инфицировать вирусом Ваши пальцы.
- Не давайте другим пользоваться Вашей посудой для еды и питья.

Владелец лицензии: ГлаксоСмитКлейн (Израиль) Лтд.,

ул. Базель 25, Петах Тиква.

Производитель: Глаксо Оперейшнс Англия Лтд.,

Барнард Касель, Англия.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в: Августе 2014.

Регистрационный номер препарата в Государственном реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения:

126-38-30532.