

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها
فُحص ورُخص من قبلها

الكاسولف

أقراص مغلفة

التركيب:

كل قرص مغلف يحتوي على:

Sodium Citrate 300 mg
Potassium Citrate 330 mg

المواد غير الفعالة:

Powder Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Quinoline Yellow Lake E104, Eudragit L 12.5, Talc, Castor Oil

تأثيرات الدواء الطبية:

لجعل البول قلويًا ولعلاج ومنع تشكل الحصى والرمال الحاوية على الكلس في الكلى.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

تحذيرات:

يجب عدم تناول هذا الدواء دون استشارة طبية.
يجب إعطاء الدواء بحذر للمرضى الذين يعانون من قصور قلبي، من ضغط دم مرتفع، مرضى القلب أو الكلى.

المرضى الذين يعانون من خلل في الغدة الكظرية، وكذلك المرضى الموجودين في حالة من نقص السوائل - يجب عليهم أن يكونوا تحت المراقبة الطبية الدائمة.

على المرضى الموجودين في ظروف مناخية قاسية الحذر عند تناول الدواء.

يجب الإكثار من شرب السوائل أثناء العلاج بالدواء.
يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر،

فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

غثيان، طغخ جلدي وتهيج والسخ - توقف/ي عن تناول الدواء وراجع/ي الطبيب المعالج حيث يرشدك بخصوص مواصلة العلاج.
أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية:

٩ - ١٦ قرصاً مغلفاً في اليوم، ٢ - ٣ أقراص مغلفة دفعة واحدة أو حسب تعليمات الطبيب.

بالإمكان شطر الأقراص إلى نصفين أو سحقها حالاً قبل بلعها.

لا يجوز تخزين أقراص مشطورة أو مسحوقة.

يجب تناول الدواء مع الإكثار من شرب الماء، ومن المفضل بعد الطعام.

لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي أخطارهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة: يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

الخزّين: أغلق/ي العبوة بإحكام لمنع نفاذ الهواء والرطوبة إليها.

يجب إتلاف ما قد يتبقى من الدواء بإنهاء العلاج.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك

استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢١٢٤٧-٠٩-٢٨

المنتج: سام - أون م.ض.، شارع هاعابودا ٢٥، بات - يام.