

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات صيدلانية) ١٩٨٦
اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

بيبي أف سالين

قطرة للأنف

التركيب: Sodium Chloride 0.9% w/v

المواد غير الفعالة: Benzalkonium Chloride, Purified Water

تأثيرات الدواء الطبية:

لترطيب مخاطية الأنف الأمر الذي يخفف من افرازاتها وتنظيفها.

■ **الاستطباب:** هذا الدواء مخصص للتخفيف من احتقان الأنف لدى
■ الرضع والأطفال الصغار.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر اذا وجدت لديك حساسية لأحد
مركباته.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

اذا كنت تعاني/ن أو اذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب
و/أو الأوعية الدموية، ضغط الدم العالي، الكبد.

تحذيرات:

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون
استشارة الطبيب. يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو
عقاقير قبل استعمالك للدواء. لا يجوز استعمال المستحضر اذا طرأ تغير
على لون المحلول أو اذا أصبح عكراً.

التفاعلات بين الأدوية: اذا كان الطفل يتعاطى دواءً إضافياً أو إذا أنهى
العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي
الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية: إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد
تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كالطفح، تهيج
موضعي أو حرقان موضعي.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:

ضغط الدم العالي (كالإحمرار في الوجه)، طفح والتهاب موضعي (لم
تكن هذه الأعراض قبل استعمال المستحضر) - (نادراً): توقف/ي عن
العلاج وراجع/ي الطبيب. أما اذا ظهرت لدى الطفل أعراض جانبية لم
تذكر في هذه النشرة، أو اذا طرأ أي تغيير على شعوره العام نتيجة

لاستعماله لهذا الدواء، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:
على الوالدين ابلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل
وعن أي دواء آخر يتناوله.

راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية الخاصة المذكورة أعلاه.

المقادير الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من
الطبيب:

قطرة - قطرتين في كل من منخري الأنف ٣ - ٤ مرات في اليوم.

لا تتجاوز/ي المقادير الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب اذا لم يطرأ تحسن على حالة الطفل الصحية خلال
٣ أيام.

انتبه/ي!

هذا الدواء ليس للبلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

يجب الحرص على قياس المقدار الدوائي بالقطرة.

ارشادات الاستعمال: نظف/ي القسم الداخلي من الأنف بلطف.
ميل/ي رأس الطفل/ة الى الوراء أو اضجعه على فراش. نقط/ي من
الدواء في كل منخر مع الاستمرار بإحناء الرأس خلال عدة دقائق وذلك
لتأمين انتشار الدواء في جوف الأنف.

لمنع انتشار التلوث - لا تستعمل/ي ذات القنينة لأكثر من شخص واحد.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق
بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي اصابتهم
بالتسمم. اذا أفرطت في اعطاء المقادير الدوائية أو اذا بلع الطفل/ة خطأ
من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من
المقادير الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات
الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.

بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الإستعمال خلال ١٢ شهراً. تبقى الأدوية
صالحة لفترات محدودة فقط حتى ولو ظلت في علبتها الاصلية وتم
حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية
المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي
الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٧٤٤١ - ٩٠ - ٥٨

المنتج: سام - أون م.ض.، شارع هاعابودا ٢٥، بات - يام ٥٩٦٠٢