

היו קיימות לפני השימוש בתכשיר) - (נדיר): הפסקו את הטיפול ופנה/י לרופא. בכל מקרה שבו הילד/ה מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשה הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בילדים ותינוקות:
על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!
ראה/י לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.

מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא:

1-2 טיפות בכל נחיר 3-4 פעמים ביום.
לא לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור במצב הילד/ה תוך 3 ימים יש לפנות לרופא.

שימו לב:

לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

יש להקפיד על מדידת המנה במזלף.

אופן השימוש:

קנחי/י את האף בעדינות. הטה/י ראש הילד לאחור, או תשכיבי/י אותו על מיטה. טפטפי/י את הטיפות לכל נחיר, והמשכי/י להטות ראש הילד למשך מספר דקות, לאפשר פיזור התרופה בכל איזור האף.

למניעת הפצת הזיהום - אל תשתמש/י באותו הבקבוק ליותר מאדם אחד.

מנע/י הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!
אין ליטול תרופות בחושך! בדוק/י התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. הרכב/י משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה: אחסון מתחת ל- 25°C. לאחר פתיחה ראשונה ניתן להשתמש במשך 12 חודשים. גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברקוח שסיפק לך את התרופה. אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מס' רישום התרופה: 58-90-27441

יצרן: סם-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים 59602

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו - 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

בייביאף סליין

טיפות אף

הרכב:

Sodium Chloride 0.9% w/v

חומרים בלתי פעילים:

Benzalkonium Chloride, Purified Water

פעילות רפואית:

גורם ללחלוחית בריית האף ובכך מקל על הפרשת הריר ועל קינוח האף.

התוויות:

התרופה מיועדת להקלה בגודש האף אצל תינוקות וילדים קטנים.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב ו/או כלי הדם, יתר לחץ דם, הכבד.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא. אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה. אין להשתמש בתרופה זו כשחל שינוי בצבע התמיסה או שהיא הופכת לעכורה.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הילד/ה נוטל/ת תרופה נוספת, או אם סיים/ה זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי, כגון: פריחה, גירוי או צריבה מקומית.

תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

יתר לחץ דם (כגון אודם בפנים), פריחה או דלקת מקומית (שלא