

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

إقرأ/ي النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

اقررت وزارة الصحة صحة صيغة هذه النشرة ومحتهاها

الشخص ورخص من قبلها في تشرين الثاني ٢٠١١

بيبيريزيم نقط

التركيب: كل ملعقة صغيرة (٥ مل) تحتوي على:

Pepsin 1:10,000	30 mg
Sodium Glycerophosphate	40 mg
Nicotinic Acid	10 mg

المواد غير الفعالة:

Calcium Chloride, Hydrochloric Acid, Sodium Methylparaben (Nipagin), Glycine, Glycerin, Ethanol, Lactic Acid, Tutti Frutti, Purified Water.

كل ٥ مل تحتوي حوالي ٣٠ غرام كحول

الفصيلة العلاجية: إنزيمات هضمية.

دوعي الإستعمال: هذا الدواء مخصص لمعالجة الإمساك والغازات.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال المستحضر إذا وجدت حساسية لأحد مركبات الدواء.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل إستشارة الطبيب مقدماً:

إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب وأو الأوعية الدموية، الكلى/المسالك البولية.

تحذيرات:

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطي/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، بما في ذلك أدوية تصرف بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ إستشارة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر يتم تناوله!

الجرعة الدوائية:

في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب، الجرعة الموصى بها هي: رضيع حتى عمر سنة: ٥ نقط قبل الطعام و ٥ نقط بعد الطعام، في كل وجبة تغذية (حتى ٥٠ نقطة لليوم).

رضيع بأعمار ١ - ٢ سنة: ٤ - ٢٠ نقط بعد كل وجبة طعام.

أطفال بأعمار ٢ - ٥ سنين: ٤٠ - ٦٠ نقط بعد كل وجبة طعام.

أطفال بأعمار ٥ - ١٤ سنة: نصف ملعقة صغيرة - ملعقة صغيرة (٥ مل) بعد كل وجبة طعام.

لا تتجاوزز/ي الجرعة الموصى بها.

لمعالجة الإمساك، اذا لم يطرأ تحسن خلال أسبوع، يجب مراجعة الطبيب.

إرشادات الإستعمال:

يجب تناول هذا الدواء مع وجبة الطعام.

يجب التنقيط أولًا لداخل ملعقة صغيرة وليس مباشرة إلى فم الرضيع.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً

عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادي إصابتهم بالتسوس.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية، أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا

الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحبًا/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من

الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يحفظ مغلق يراكم في درجة حرارة الغرفة - ٢٥ درجة مئوية.

تبقي الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها

الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ

انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك

إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

معلومات مفصلة عن هذا الدواء تعتمد على المصدر: مارتيندل

رقم سجل الدواء: ٢١٢٤٥ - ١٧ - ٢٥

المنتج: سام-أون م.ض، شارع هاعابودا ٢٥، بات-يام.