

**עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים
(תק Shirim) התשמ"ו – 1986**

קוראי/י בעיון את העلون עד סופו בטרם תשמש/י בתרופה
פרומט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות
ותוכנו נבדק ואושר על-ידי בנובמבר 2011

ביביזים

טיפול

רכבי:

כל כפיה (5 מ"ל) מכילה:
Pepsin 1:10,000 30 mg
Sodium Glycerophosphate 40 mg
Nicotinic Acid 10 mg

חומרם בלתי פעילים:

Calcium Chloride, Hydrochloric Acid, Sodium Methylparaben (Nipagin), Glycine, Glycerin, Ethanol, Lactic Acid, Tutti Frutti, Purified Water.

כל 5 מ"ל מכילים כ- 0.3 גרם אלכוהול

קבוצה תרפיטית: אנטסייער עכלי.

התוויה: התרופה מיועדת לטיפול בעצירות ובגזים.

חותי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש בתכשיר אם ידועה רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

הטיפול:

אם הנק סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב / או קל, דם, הכליה/מערכת השתן.

اذירות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיטים קרובות או תקופה ממושכת בלבד להיוועץ ברפואה. אם הנק רגש/ה למזהן כלשהו או לתרופה כלשהו, עליה להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

תגובה בין-תרפיטיות:

אם הנק נסולט/ת תרופה נוספת/האחסנה הממליצים, תרפות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. לאlixים לב לתאריך התוגoga של התכשיר בלבד מקרה של ספק עליר להתייעץ עם הרופך שטיפיק לך את התרופה. אין לאחסן תרפות שונות באותו איזה. מודיע מפורט על תרופה זו מבוסס על האסמכתא: MARTINDALE מס' רישום התרופה: 25-17-21245 היצרון: ס.מ-או בע"מ, רח' העוזה 25, בת-ים.

תופעות לוואי:
בנוסף לפועלות הרציפה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע תופעות לוואי.
במל מקרה שבו הנך מריש/ה תופעות לוואי שלא צוין בעلون זה, או אם חל שינוי בהרגשות הכללית עליו להתייעץ עם הרופא מיד.

תופעות לוואי ותגובה בין-תרפיטיות ילדים ותינוקות:
על ההורים לדוחו לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד/ה!

מינים:

במיידר הרואה אחרת מהרופא, המינון המומלץ הוא:
תינוקות עד גיל שנה: 5 טיפות לפני האוכל ו- 5 טיפות אחריו האוכל, בכל האכלת (עד 50 טיפות ליום).

תינוקות בגילאים 1-2 שנים: 20-40 טיפות אחריו כל ארוחה.
ילדים בגילאים 5-2 שנים: 40-60 טיפות אחריו כל ארוחה.
ילדים בגילאים 5-14 שנים: 0.5-1.5 כפית של 5 מ"ל אחריו כל ארוחה.

אין לעבור על המנה המומלצת.
בטיפול בעצירות, אם לא חל שיפור תוך שבוע יש לפנות לרופא.

אופן השימוש:

יש לטלול התרופה עם הארוחה.
יש לטפוף קודם לתוך כפית ולא ישירות לפינוק.

מנע' הרעליה:

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידים של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כרך תומגע/ רעליה. אם נמלת מנת יתר או אם בטעות בעליל מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מין של בית-חולם, והבא/י רזרית תרופה אחרת.

אין לגרום להתקאה ללא הרואה מפורשת מרופאי!
אין לטלול תרפות בחושן יש לבדוק את התוויה וממנה בכל פעם שהנין נסולט/ת תרופה. יש להריב משקפים אם הנק זקוק/ה להם.

אחסנה: שומר סגור היטב בטמפרטורת החדר - 25°C.
גם לפני האחסנה/האחסנה הממליצה, תרפות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. לאlixים לב לתאריך התוגoga של התכשיר בלבד מקרה של ספק עליר להתייעץ עם הרופך שטיפיק לך את התרופה. אין לאחסן תרפות שונות באותו איזה.

מודיע מפורט על תרופה זו מבוסס על האסמכתא: MARTINDALE מס' רישום התרופה: 25-17-21245 היצרון: ס.מ-או בע"מ, רח' העוזה 25, בת-ים.