

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים רפואיים) התשמ"ו – 1986

נטילת תרופה זו היא אך ורק ע"פ הנחיות הרופא
קרא/י בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש/י בתרופה

בי-סיקס 300 טבליות

הרכב:

כל טבליה מכילה:
Pyridoxine Hydrochloride 300 mg

חומרים בלתי פעילים:

Amylum, Povidone, Powdered Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Dioxide, Yellow No. 6 lake, Blue No. 2 lake.

פעילות רפואית:

התרופה מיועדת לתוספת ויטמין B₆.

מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.

אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון או מיניקה.

אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
אם הינך רגיש/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.
שימוש במינון מופרז עלול לגרום לנזקים במערכת העצבים.

תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות, במיוחד לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:
לבודופה (פרקינסון), הידרלזין (ללחץ דם), גלולות למניעת הריון, תרופות המדכאות את המערכת החיסונית, כגון:

קורטיקוסטרואידים, ציקלוספורין (להשתלות), איזוניאזיד (לשחפת), פניצילאמין (להרעלה).

תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות להופיע השפעות לוואי.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת:

גירוי או פריחה בעור: הפסק/י הטיפול ופנה/י לרופא.
בכל מקרה שבו הינך מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא מיד.

מינון:

מינון לפי הוראות הרופא בלבד.
אין לעבור על המנה המומלצת.

מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר מיון של בית-חולים והבא/י ארזית התרופה איתך.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך, בחולה אחר/ת היא עלולה להזיק.

אל תתנ/י תרופה זו לקרוביך, שכניך או מכריך.

אין ליטול תרופות בחושך!

יש לבדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה להם.

אחסנה:

אחסון מתחת ל- 25°C.

גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שטיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מידע על התרופה זו מבוסס על USPDI.

מס' רישום התרופה: 57-45-21250

יצרן: סם-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים.