

للدواء. يجب التوقف عن العلاج بهذا الدواء قبل ٤ أيام من إجراء فحص اختبار الحساسية في الجلد.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (كالأدوية المهدئة، المنومة، أدوية باركينسون، أدوية الصرع)، مضادات الاكتئاب النفسي من نوع معيقات MAO، مخفضات ضغط الدم، مدرات البول، العقاقير الأخرى المضادة للسعال والزكام.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، نعاس، خفقات قلب متسارعة.

الأعراض التي تقتضي اهتماماً خاصاً: عصبية، عدم الشعور بالإرتياح (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً! أرق (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً! غثيان أو تقيؤ (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً! أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً!

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع: على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل وعن أي دواء آخر يتناوله.

الجرعة الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لللبّار: ١٥ ملل ٣ مرات في اليوم.

للأطفال ما فوق عمر ٦ سنين: ٥ ملل ١ - ٣ مرات في اليوم.

للأطفال من عمر ١ - ٦ سنين حسب وصفة طبيب فقط.

لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال دون عمر سنة واحدة.

يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٥ أيام.

انتبه/ي! يجب الحرص على قياس الجرعة الدوائية بواسطة ملعقة الكيل أو الكأس المعدة للكيل الخاصة، قطارة وما شابه.

ارشادات الاستعمال:

يبلع الدواء مع الكثير من الماء، القليل من الطعام أو الشراب عند وجود حرقان.

تجنب/ي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول

أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي أصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأً من هذا الدواء، عليك

التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة

الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: في مكان بارد ومظلم. تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى

ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة

تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة

الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٩٨-٣٠-٢٤-١٢١

المنتج: سام - أون م.ض.، شارع هاعافودا ٢٥، بات - يام.

نشرة طبية للمستهلك بموجب انظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحُص ورُخّص من قبلها

برونكولات شراب

التركيب: كل ٥ ملل تحتوي على:
Diphenhydramine HCl 10 mg
Pseudoephedrine HCl 20 mg

المواد غير الفعالة:

Sugar, Sorbitol, Alcohol, Potassium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Saccharine, Cherry Flavour, Menthol, Ponceau 4R, Purified Water.

الفصيلة العلاجية وتأثيرات الدواء الطبية:

يسودوإفيدرين: مقلد للأعصاب الودية ذو تأثير مضاد للإحتقان.

ديفينهيدرامين: مضاد للهستامين ذو تأثير مضاد للأليرجيا.

الإستنبابات: للتخفيف من أعراض إحتقان الأنف على خلفية الإنفلونزا، حمى

العلف وفي التحسسات الأخرى في المجاري التنفسية العلوية.

إحتقان الأنف المترافق بالتهاب الجيوب الأنفية. للتخفيف من أعراض إحتقان قناة

أستاخيو (القناة السمعية بين الأذن الوسطى والبلعوم) وذلك في تلوثات الأذنين.

للتخفيف من أعراض السعال، العطاس والزكام (المترافق أو غير المترافق بغثيان).

للتخفيف من أعراض الرشح من مصدر اليرجي أو تلوثي.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا تستعملي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الرضاعة. لا يجوز لك استعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته. لا يجوز استعمال هذا المستحضر إذا كنت تتعالج/ين بشكل متزامن مع أدوية من فصيلة مثبطات مونوأمين أوكسيداز (للإكتئاب النفسي) أو خلال ١٤ يوماً من التوقف عن العلاج بها.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في الثلث الأول/في الثلث الأخير من الحمل. إذا كنت تعاني/ن أو إذا

عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (كالربو)، القلب و/أو الأوعية

الدموية (كضغط الدم العالي)، العينين (كالجلوكوما)، الكبد، الكلى/المسالك البولية،

الجهاز الهضمي (كالقرحة)، الغدة الدرقية، غدة البروستات، السكري.

على المسنين أيضاً مراجعة الطبيب قبل البدء بإستعمال هذا الدواء على اعتبار إمكانية

كونهم حساسين للمستحضرات المانعة للإحتقان.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية؟

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء

قيادة المركبات، تشغيل ماكنات خطرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة.

يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء فترة تناول هذا الدواء.

تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت على وشك إجراء عملية جراحية وذلك خشية

حدوث ردود فعل ممكنة مع مواد التخدير. قد يسبب هذا الدواء تشوشاً في الرؤية.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة

الطبيب. يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك