

## نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص من قبلها

## برونكولات بلوس أقراص

|                     |        |                        |
|---------------------|--------|------------------------|
| Paracetamol         | 400 mg | التركيب: كل قرص يحتوي: |
| Pseudoephedrine HCl | 30 mg  |                        |
| Diphenhydramine HCl | 20 mg  |                        |

المواد غير الفعالة:

Sodium Starch Glycolate, Colloidal Anhydrous Silica, Quinoline Yellow AI, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Purified Water, Sepifilm LP 770

**تأثيرات الدواء الطبية:** للتخفيف من أعراض الرشح، السعال، احتقان الأنف والتي ترافقها السخونة والآلام. كعلاج مساعد في احتقان الأذن الوسطى.

### متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا تستعلمي هذا الدواء عندما تكونين في فترة الرضاعة. لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته. لا يجوز إعطاء هذا الدواء لمرضى يعالجون بمثبطات موناأمين أو أكسيداز وكذلك خلال أسبوعين من اليوم الذي تتوقف فيه عن العلاج بها.

### لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل. إذا كنت تعانين/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسي (كالربو)، القلب و/أو الأوعية الدموية، العينين (كالجوكوما)، الكبد، الكلى/المسالك البولية، الجهاز الهضمي (كالقرحة)، الغدة الدرقية، غدة البروستات، السكري، ضغط الدم العالي، أمراض نفسية.

### كيف سيؤثر هذا الدواء على سير امورك اليومية؟

إن استعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل ماكنات خطيرة وممارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة. يجب تحذير الطفل/ة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

**تحذيرات:** إن الباراسيتامول قد يسبب الضرر للكبد في الحالات التالية: عندما يعطى بجرعات أعلى من الموصى بها، إذا أعطي لفترة طويلة، عند تعاطي المشروبات الكحولية أثناء فترة العلاج، إذا تم تناول أدوية إضافية تؤثر على فعالية الكبد. لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيض السخونة وتسكين الآلام أو أدوية للرشح بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي وذلك لمنع حصول زيادة في الجرعة الدوائية/التسمم بالباراسيتامول.

يجب ابلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء. يجب ابلاغ الطبيب المعالج عن تناولك لهذا الدواء قبل إجراء أي عملية جراحية (بما في ذلك جراحة الأسنان) أو معالجة طبية مستعجلة. يجب التوقف عن العلاج بهذا الدواء قبل ٤ أيام من إجراء أي اختبار لردود فعل على الجلد. لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة بدون استشارة الطبيب.

**التفاعلات بين الأدوية:** إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصة الأدوية التي تنتمي الى المجموعات

التالية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي (كالأدوية المهدئة، المنومة، أدوية باركينسون، أدوية الصرع)، مضادات تخثر الدم، مضادات الاكتئاب النفسي كمثبطات موناأمين أو أكسيداز (انظر/ي الى فقرة "متى لا يجوز لك استعمال المستحضر"). مخفضات ضغط الدم العالي، الأدوية التي تصرف بدون وصفات طبية والتي تحتوي على الباراسيتامول، العقاقير الأخرى المضادة للسعال والرشح، الأدوية التي تؤثر على الكبد (كالباربيتورات، مضادات التشنج)، الإستعمال الطويل الأمد بالأدوية المضادة لإلتهاب المفاصل، الأدوية التي تعالج القلب (من نوع معيقات المستقبلات الأدرينالية الإثارة من نوع بيتا أو جليكوزيدات الديجيتال).

**الأعراض الجانبية:** إضافة الى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، نعاس، دوام، عصبية أو الشعور بعدم الإرتياح، تهيجات.

**الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:** غثيان، تقيؤ أو آلام في البطن، ارتفاع في ضغط الدم: استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً. صعوبة في التبول أو ألم عند التبول (نادراً): استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً. نزف دموي، ارهاق أو ضعف خاص (نادراً): استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً. حكة وطفح جلدي (نادراً): استمر/ي في العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

### الجرعة الدوائية:

الجرعة الدوائية الاعتيادية للكبار في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب: قرص - قرصان ٣ مرات في اليوم.

يستعمل الدواء حسب تعليمات الطبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

يجب مراجعة الطبيب إذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٧ أيام.

إذا حدث ونسيت تناول الجرعة في الوقت المعين ثم تذكرت بذلك، فيجب تناولها حالاً؛ ولكن لا يجوز تناول جرعتين معاً في أي حال من الأحوال.

أما المرضى المسنون فقد يكونوا أكثر حساسية لتأثيرات هذا الدواء.

**ارشادات الاستعمال:** يبلع هذا الدواء مع الماء. بالإمكان شطر القرص إلى نصفين أو سحقه حالاً قبل إبتلاعه. لا يجوز تخزين أقراص مشطورة أو مسحوقة.

**تجنب/ي التسمم!** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي اصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

**لا تتناول/ي الدواء في العتمة!** يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء. ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

**التخزين:** في مكان بارد ومظلم.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الاصلية وتم حفظها بموجب تعليمات التخزين. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك؛ عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٤٧٩ ٠٧٣٠ ١٢٦

**المنتج:** سام - أون م.ض.، شارع هاعاقودا ٢٥، بات - يام.