

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقراري النشرة بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة ب safة هذه النشرة ومحوها

شخص ورخص من قبلها في ٢٠٠٧ آب

برونخو - د شراب

التركيب: كل ملعقة صغيرة (٥ مل) تحتوي على: Diphenhydramine HCl 10 mg
Ammonium Chloride 136 mg

المواد غير الفعالة: Sodium Citrate, Citric Acid, Sodium Saccharine, Alcohol

95%, Nipagin, Menthol, Liquorice, Vino Grape, Sorbitol, Purified Water.

كل ملعقة صغيرة تحتوي ١٤,٥ مل صوديوم.

تأثيرات الدواء الطبية:

يحتوى المستحضر على: مادة مضادة للهيستامين ذات تأثير مضاد للسعال والاحتقان نتيجة البريجيا أو رشح. مادة مقشعة (تساعد على اخراج البلغم).

الاستطباب:

هذا الدواء مخصص للتخفيف من السعال والإحتقان في المجرى التنفسية.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.

لا تستعمل هذا الدواء عندما تكونين في فترة الرضاعة.

كما لا يجوز استعماله لدى المراهقين حديثاً وفي التقيمات الحادة من الربو، حصر

البول، تضخم البروستات، الجلوكوما من نوع الزاوية الحادة.

لا يجوز إستعمال هذا الدواء إذا كنت تستعمل بين أو إستعملت في الأسبوعين

الآخرين أدوية من نوع مثبطات مونوامين أوكتسيدان.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل، إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل

في وظيفة الجهاز التنفسي (كالاربو)، القلب، الكلى/المسالك البولية، الجهاز الهضمي

(الكلري)، العينين (كالجلوكوما)، الكبد، أو الأوعية الدموية، ضغط الدم

(الartery)، الغدة الدرقية، تضخم البروستات. يجب إستشارة الطبيب في حالات

السعال الزمن أو المتواصل، أو عندما يكون السعال متراافقاً بإفرازات كثيرة.

على المنسن استشارة الطبيب قبل البدء بإستعمال المستحضر لأنهم أكثر عرضة

للتأثيرات الجانبية من غيرهم. لا يحتوى المستحضر على السكر لذا فهو ملائم

لمرضى السكري بعد مراجعة الطبيب.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

إن إستعمال هذا الدواء قد يضعف من يقظتك، لذا يجب اتخاذ الحيوة والحد من إثناء

قيادة المركبات، تشغيل مراكبات خطيرة ومارسة أي نشاطات أخرى تتطلب اليقظة.

يجب تحذير الملقفلة من ركوب الدراجات، اللعب بمقربة من حركة المرور وما شابه.

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء فترةتناول هذا الدواء.

تحذيرات: لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون

استشارة الطبيب.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير قبل إستعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتعاطى/ن دواءً آخريًّا أو إذا أنهيت العلاج الآن

بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتقادري الأخطر أو عدم النجاعة

الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير. خاصةً الأدوية التي تنتمي إلى المجموعات التالية:
العقاقير المهدئة والمنومة، مضادات الإكتئاب النفسي (خاصةً معقات مونوامين اوكتسيدان)، العقاقير المضادة لولادات الكولين (كالاتروپين)، كودين، أدوية معالجة الآلام (مضادات الهيستامين).

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطيبة المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، الأنف والحنجرة، طفح، غثيان وقيءات، نعاس، احمرار الفم، دوار، إضطرابات في الهضم، صعوبة التبول.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً: تظهر عادة نتيجة فرط في الجرعات الدوائية، اذا ظهرت الأعراض الثانية السابقة الذكر بشكل ملحوظ أو عند حصول اضطرابات في الرؤية، ارتباك، اضطرابات في النوم أو تعرق، راجع/ي الطبيب.

عند ظهور ضعف عام، آلام في الحنجرة، سخونة، نزف دموي، قصر التنفس، تشنج، انخفاض ضغط الدم (الشعور بالدوخة) أو تسارع خفقات القلب، توقيف/ي عذق العضلات، ارتجاع/ي الطبيب حالاً. أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية عند الأطفال والرضع:
على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعنه أي دواء آخر يتم تناوله. راجع/ي الفقرات المتعلقة بالأعراض الجانبية والتفاعلات الخاصة بين الأدوية المذكورة أعلاه.

الجرعة الدوائية:
الجرعة الدوائية الاعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

للبالغ: ٣ ملاعق صغيرة (٥ مل) كل ٤ ساعات.

للأطفال ذوي عمر ٦ - ١٤ سنة: ملعقة صغيرة حتى ملعقتين صغيرتين (٥ حتٰ١٠ مل) كل ٤ ساعات.

للأطفال من عمر ١ - ٦ سنين حسب وصفة طبيب فقط.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال دون عمر سنة واحدة.

انتبه/ي! يجب الحرص على قياس الجرعة الدوائية بواسطة ملعقة الكيل أو الكأس

العدة الكيل الخاصة أو القطارة وما شابه.

ارشادات الاستعمال: يجب تناول هذا الدواء مع الطعام.

تجنب/ي التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتقادي اصابتهم بالتسوس.
إذا أفترطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك

التجوّه إلى المستشفى حالاً صطحبًاً عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقطيع بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العادة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء، ضع/ي النظارات الطبية اذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية.

بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان الإستعمال خلال ٦ أشهر.

يبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في علبتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الدوائية على العبوة. في حالة الشك! عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء. لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ٢٧١٧٨ - ٨٨ - ٥٨

المنتاج: سام - أون م.ض، شارع هاعابودا، ٢٥، بات - يام ٥٩٦٠٢