

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرراً/ي النشرة بإيمان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء
أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتوها فحص ورخص من قبلها

برونخو - كيد شراب

ال التركيب: كل ٥ مل لحتوى:

المادة غير الفعالة:

Sugar, Sorbitol 70% Sol, Potassium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Saccharine, Strawberry Flavour, Ponceau 4R, Purified Water.

الفصيلة العلاجية وتأثيرات الدواء الطبية:

پسيدوإيفيرين: مقلد اللودي ذو تأثير مضاد للإنفلونزا.

ديفينهيرامين: مضاد للهيستامين ذو تأثير مضاد للأليرجيا.

الإستطباب: للتخفيف من الأعراض في احتقان الأنف على خلفية الإنفلونزا، حمى العلف

وفي الآليرجييات الأخرى في المجرى التنفسية العلوية.

احتقان الأنف المترافق بالتهاب الجيوب الأنفية.

للتحفيض من الأعراض في احتقان قناة استاكوس وذلك في التهابات الأذنين.

للتحفيض من الأعراض في السعال، العطاس والرشح (الترافق أو غير الترافق بغيرها).

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يستعمل هذا الدواء عندما تكوني في فترة الرضاعة. لا يجوز لك استعمال هذا المستحضر إذا كنت تعالج/ين بشكل متزامن مع أدوية من فصيلة مثبطات موئامين أو كسيданز (الإكتاب النفسي) أو خلال ١٤ يوماً من التوقف عن العلاج بها.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

إذا كنت في الثلث الأول/في الثلث الأخير من الحمل. إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز التنفسى (كاربوب)، القلب و/أو الأوعية الدموية (تضيق

(كالقرحة)، الغدة الدرقية، غدة الپروستات، السكري.

على المسنين أيضاً مراجعة الطبيب قبل البدء باستخدام هذا الدواء على اعتبار أنه قد يكون أكثر حساسية للمستحضرات المانعة للاحقان.

كيف سيؤثر هذا الدواء على سير أمورك اليومية؟

قد يضعف هذا الدواء من يقطلك، لذا يجب اتخاذ الحيبة والحذر أثناء قيادة المركبات، تشغيل مakensات خطرة ومارسة أي نشاطات أخرى تتطلب البصرية.

يجب تحذير الملقف/ة من ركوب الدراجات، اللعب بعيقية من حركة المروه وما شابه.

لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية الأخرى أثناء فترة تناول هذا الدواء.

تحذيرات: يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت على وشك إجراء عملية جراحية وذلك خشية حدوث

رددود فعل ممكنة مع مواد التخدير. قد يسبب استخدام هذا الدواء تنشوشًا في الرؤية.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

يجب التوقف عن العلاج بهذا الدواء ٤ أيام قبل إجراء فحص اختبار الحساسية في الجلد.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب
المعالج، وذلك لتغادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير، خاصةً
الأدوية التي تنتهي إلى المجموعات الثانية: الأدوية التي تؤثر على الجهاز العصبي المركزي
(كالأندوية المهدئـة، النـومـةـ، أدوـيةـ بـارـكـينـسـونـ، أدوـيةـ الـلـصـرـعـ، مـضـادـاتـ الـإـكتـابـ النفـسيـ)
من نوع مثبطـاتـ MAOـ، الأدوـيةـ الـخـافـخـةـ لـضـغـطـ الدـمـ والأـدوـيةـ الـمـدـرـةـ للـبـولـ، العـقـاقـيرـ
الـآخـرىـ المـضـادـةـ لـالـسـعالـ وـالـرـشـحـ.

الأعراض الجانبية: إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة
استعماله بعض الأعراض الجانبية كجفاف الفم، نعاس، خفقات قلب متضارعة.

الأعراض الجانبية التي تقتضي اهتماماً خاصاً:
عصبية، الشعور بالاستياء (نادر): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!

أرق (نادر): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!
غثيان أوقيعات (نادر): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب حالاً!

اما اذا ظهرت لديك اعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، او اذا طرأ اي تغيير على

شعورك العام، عليك عند ذلك مراجعة الطبيب حالاً.

الأعراض الجانبية والتفاعلات بين الأدوية ضد الأطفال والرضع:
على الوالدين ابلاغ الطبيب المعالج عن كل تأثير جانبي يبدو لدى الطفل/ة وعن أي دواء آخر

يتم تناوله!

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

للكبار: ٥ مل ٣ مرات في اليوم.

للأطفال ما فوق عمر ٦ سنين: ٥ مل ١ - ٢ مرات في اليوم.

للأطفال من عمر ١ - ٦ سنين حسب وصفة طبيب فقط. لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الأطفال دون عمر سنة واحدة.

يجب مراجعة الطبيب اذا لم يطرأ تحسن على حالتك الصحية خلال ٥ أيام.

انتبه/ي! يجب الحرص على قياس الجرعة الدوائية بواسطة ملعقة الكيل أو الكأس المعدة

للكيل الخاصة أو القراءة وما شابه.

ارشادات الاستعمال: يبلع الدواء مع الكثير من الماء، القليل من الطعام أو الشراب عند وجود

حرقان.

تحذيف/ي التسميم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي

الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتغادي اصابتهم بالتسوس. اذا افترطت في تناول الجرعة

الدوائية او اذا بلع الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً.

مصطحبة عينة الدواء.

لا تسبـبـ يـ التـقـيـءـ بـدونـ تعـليمـاتـ صـريـحةـ منـ الطـبـيبـ!

لا تتناول/ي الدـوـاءـ فـيـ العـمـقـةـ. يجبـ تـشـخـصـ طـابـ الدـوـاءـ وـالتـأـكـدـ مـنـ

الـدوـائـةـ فـيـ كـلـ مـرـةـ تـتـناـولـ /ـيـ فـيـهـ دـوـاءـ. ضـعـ /ـيـ النـظـارـاتـ الطـبـيـةـ اـذـ لـمـ اـلـمـ اـلـدـرـ

الـتـخـزـينـ فـيـ مـكـانـ بـارـدـ وـمـظـلـمـ. تـقـىـ الأـدوـيـةـ صـالـحةـ لـفـقـرـاتـ مـدـدـوـدةـ فـقـقـ.

فـيـ عـلـيـتهاـ الأـصـلـيـةـ وـتـمـ حـفـظـهـ بـمـوجـبـ تـعـليمـاتـ الـخـزـنـ. الرـجـاءـ مـلـاحـظـةـ تـارـيـخـ اـنـتـهـاءـ

صـلـاحـيـةـ الـمـسـتـخـرـ المـدـوـنـ عـلـىـ الـلـعـبـ. فـيـ حـالـةـ الشـكـ! عـلـيـكـ اـسـتـشـارـةـ الصـيـدـلـيـ الـذـيـ

صـرـفـ لـكـ هـذـهـ دـوـاءـ. لاـ يـجـوزـ خـزـينـ أـدوـيـةـ خـتـلـفـةـ فـيـ نـفـسـ الـعـبـوـةـ.

رقم سجل الدواء: ٦٦ - ٨٣ - ٢٧٥٢٩

المنتاج: سـامـ -ـ أـونـ مـضـ، شـارـعـ هـاعـبـوـدـاـ، بـاتـ -ـ يـامـ.