

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקנירם) התשמ"ז-1986

קראי/י ביעין את העalon עד סוף בטראם תשמש/י בתרופה

פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות ותוכנו נבדק ואושר על-ידי

ברונקו-קיד סירופ

רכב: כל 5 מ"ל כוכלים:

חומרים בלתי פעילים:

Sugar, Sorbitol 70% Sol, Potassium Citrate, Citric Acid, Sodium Benzoate, Sodium Saccharine, Strawberry Flavour, Ponceau 4R, Purified Water.

קובזה תרפיטית ופיג'לט רפואית:

ספאודיאפרין: סימפטומטי בעל פעילות נגד גודש.

דיפנגיירין: אנטיסטמי בעל פעילות נגד אלרגיה.

תרכזיות: והלה סימפטומטית בגודש באך על קרע שפעת, קדחת השחט

ואלרגיות אחרות בדרכי הנשימה העליונות. גודש באך ממלואה בסינסיטיס.

הקללה סימפטומטית בשיעול, עישוש וצטננות (מלואה או לא מלואה בבחילות).

הקללה סימפטומטית בנזלת על רקע אלרגי או זיהומי.

מיון אין להשתמש בתכשיר?

אין לשימוש בתכשיר כאשר הנקן מניע.

בתחריר האם הנקן מטופל/ת בו מנתת תרופה מוקצת גולמי מונאשין אוקסיז MAOI (טיפול בדכו) או בתוך 14 ימים מהפסקת הטיפול בה.

אין לשימוש בתכשיר מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם אין ברווח שלוש אמצעים. אם אין טיפול בעור מילקי בתפקיד: מערכת גושימה (כגון אסטטהי), הלב / או קל דם (כגון לחץ דם גבוה), עיצום (כגון דלאוקומה), הכבד, הכליה/מערכת השתן, מערכות העיכול (כגון אלוקוט), בלוטת התריס (תירואזיד), בלוטת הערמות, סוכרת.

אם על קשישים להיוועץ ברופא לפני נתילת תרופה זו, מאוחר והם עלולים להיות רגישים לתרופות מסווגות.

אין תשיעת התרופה על ידי חיים ים של?

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בעורו על כן מחייב זיהורו בנהוגה ברוב, בהפעלת מנגנות מונאות ובבל פעלות מחיקת עוננות. אולם לילדים יש להחוירם מרכיבה על אונינים או ממשחקים בקרבת הכבש וגדומה.

אי לשתיות ינית או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

אזהרות: עליך לרופא אם הנקן עמד/ת לעבר ניתוח, לאור תגובה אפסרת עם חוםם הרמה. השימוש בתרופה זו עלול לגרום לטישוטש הראייה. אין לשימוש בתרופה זו ולעתם קרובות או תקופת ממושכת בליך להיוועץ ברופא. אם הנקן רגש/ה לפחותו או לתרופה כלשה, עליך להחווע על-כך לרופא לפני נתילת התרופה.

יש להפסיק הטיפול 4 ימים לפחות ביצוע טסיטים של רגשות עוז.

תగובות בין תרופתיות: אם הנקן גוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה שתה סיפול תרופה אחרת עליך לרופא המטפל כי למונע סיכונים או אי-יעילותם מתגובה בין תרופתיות, במיוחד, לבת התופות מהקבוצות הבאות: תרופות המשפעות על מערכת העצבים המרכזית (כגון: תרופות להרעה, לשינה, פחד/恐惧, אפלפסיה), תרופות נגד דיכאון מוגבל (MAD, MAO), תרופות להורדת לחץ דם ותרופות משתנות, תרופות אחרות נגד שיעול והצננות.

תופעות לוואי: בנוסח לפועלות הרצוויה של התרופה, שכן השימוש בה עלול להופיע השפעות לוואי כגון: יובש בפה, נמנום, דיפיקת לב מגברות.

תופעות לוואי המחייבות התיחסות מיוחדת:

עקבנה, חסור מנוחה (דייר): הפסיק/ הפסיק ונהה/ לחופא מידי!
מדוי שינה (דייר): הפסיק/ הפסיק ונהה/ לחופא מידי!
בחילה ותגובה (דייר): הפסיק/ הפסיק ונהה/ לחופא מידי!
בכל מקרה שבו הנקן מרגיש/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעalon זה, או אם לה שניי בהרשות הכללית עליך להיוועץ עם הרופא מידי.

תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות בלבדים ותינוקות:
על החורים לדוחות לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת ניתן להזכיר לדין:

מיון מוקובל בעקבוד הרואה אחרת רפואי:

מג'וררים: 15 מ"ל 3 פעימים ביום.
ילדים מעל גול 6 שפם: 5 מ"ל 1-3 פעימים ביום.
ילדים בגילאי 1-6 שנים על-פי מרשם רופא בלבד.

או לעבור על הנהגה הממלצת או מוגבלת
תרופה זו אינה מיעדרת ילדים מוגבלים לגיל 1 שנה.
אם לא לה שיפור במצב תוך 5 ימים יש לפנות לרופא.

שמי' לב: יש להקפיד על מדידת המנה בքבית מידה או כוסית מדידה מיוחדת, מולף וכו'.

אופן השימוש: לבולע את התרופה עם הרבה מים, מעט מזון או שתיה טישיש צברת.

משמעות הרעלתני: תרופה זו וכל תרופה אחרת של שימוש במקסם סגור מחוץ להריאזים שעליים / או תינוקות ועל-ידי קר המגע/ הרעלת-

אם נמלת מנתן יתר או אם בכטוטן בעל ילד בן התרופה, פנה/ מיד לחדר מיען של בית-חולון, ובבאי/ או ריאת התרופה אינה.

אין לזרום לזרקה לא לא-ריאה פפרושת רפואי!
אין לשלול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויה והמנה בכל פעם שהנקן גוטל/ת

תרופה. שי להרכיב משקעים אם הנקן קוקה/ להם.
אחסנה: במקום קיר או אפל. גם לפ' תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התגובה של חיבור! כל מקרה של פסק, עליך להיוועץ ברופח שיפיק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

מספר רישום: 66-83-27529

צורך: סם-אונ בע"מ, רח' העובדה 25, בית-ים.