

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם חפא בלבד

איזילקס טבליות

החומר הפעיל וכמותו:
כל טבליה מכילה:

120 מ"ג פנולפ்தלאלין צהוב (Yellow Phenolphthalein 120 mg)
לרשימת החומרים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה. תרופה זו אינה מיועדת בדרך כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12 שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

• התרופה משלשלת ומיועדת להקלת עצירות.

• **קבוצה תרופית:** משלשלים.

2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (פנולפ்தלאלין צהוב) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים.
- במקרה של חסימת המעינים או חוסר תפקוד כרוני של המעינים.

אזהרות מיוחדות לנוגעות לשימוש בתרופה:

- זיהרות! שימוש ממושך עלול לגרום לתלות בתכשירים משלשלים כגון זה ולשלשולים.
- אין להשתמש בילדים מתחת לגיל 12 שנים מבלי להיוועץ ברופא.
- תכשיר זה מיועד רק לעצירות הנמשכת מספר ימים. חוסר פעילות מעיים ליום או יומיים אינו מצדיק שימוש בו. כמו כן, אין להשתמש בו למטרות אחרות כגון "ניקוי הגוף" וכדומה.

לפני הטיפול באיזילקס ספר לרופא אם:

- את בהריון או מניקה.
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: הלב או הכליה, מכאב בטן חזק, מסוכרת, מדימום בפי הטבעת, מסימנים של דלקת התוספתן (כגון כאב בטן, בחילות והקאות בלתי מזהים).
- אתה רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
• תרופות משלשלות אחרות.

• נוגדי חמצות.

הריון והנקה:

אין עדויות לכך ששימוש באיזילקס טבליות מזיק בזמן הריון או הנקה. אולם, בדומה לתרופות אחרות, אין לקחת איזילקס טבליות ב- 12 השבועות הראשונים להריון. אם את בהריון או מניקה יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות.

הנייה ושימוש במכוונת:

לא ידועה השפעה של התרופה על ביצוע פעולות אלו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

• תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים: חצי טבליה עד טבליה וחצי לפני השינה.

השימוש בתרופה זו לא מומלץ לילדים מתחת לגיל 12 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

- יש לבלוע עם מים, חלב או מיץ.
- ניתן לחצות או לכתוש את הטבליות מיד לפני בליעתן.
- אין לאחסן טבליות חצויות או כתושות.
- יש להקפיד על שתיית נוזלים במשך היום שתעזור בריכוך הצואה.

יש לחכות פרק זמן של שתיים לפחות בין נטילת תרופה זו לבין נטילת תרופות אחרות דרך הפה.

התכשיר פועל בדרך כלל תוך 4-8 שעות, אך לפעמים דרוש יותר זמן (עד 3 ימים).

אם לא חל שיפור במצבך תוך שבוע יש לפנות לרופא. אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבלי להיוועץ ברופא.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריות התרופה איתך. מינון עודף עלול לגרום לשלשול עם איבוד נוזלים ואלקטרוליטים, במיוחד אשלגן. יש לטפל בתסמינים הללו. קיימת אפשרות שיתפתח מצב רפואי בו אין תפקוד של המעי הגס.

אם שכחת ליטול את התרופה המתן לערב הבא וטול את המנה הבאה בזמנה. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

• אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיזילקס טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי. בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא אם הנך סובל:

- מכאבים או עוויתות בבטן.
- מתופעות אלרגיות כגון: פריחה, נפיחות בפנים או בצוואר, או קשיי נשימה.
- מבעיות לב.
- מבעיות נשימה.
- מנזק כליתי.
- מסימנים של אובדן אלקטרוליטים (עייפות או חולשה, קצב לב מוגבר, בלבול). סימנים אלו עלולים להופיע עקב מינון יתר.
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטמפרטורת החדר, עד 25°C.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Magnesium Carbonate, Powdered Agar, Docusate Sodium, Strong Ginger Tincture, Povidone, Magnesium Stearate, Pigment Blend, Chocolate Flavour, Saccharin Sodium, Methylparaben.

כל טבליה מכילה כ- 5.5 מ"ג נתרן.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

האריזה מכילה בקבוק ובו 20 טבליות בגוון חום.

בעל הרישום, היצרן וכתובתו:

סם-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 35 84 22447

עלון זה נבדק ואושר ע"י משרד הבריאות במאי 2014.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.