

إيزيلاكس أقراص

المادة الفعالة وكيفيتها:

يحتوي كل قرص على:

١٢ ملء أصفر فينولفاتلين (Yellow Phenolphthalein 120 mg)

لأقراص الماء غير الفعالة، الرجاء انظر الفقرة ٦.

إن النشرة تعمم حتى تهايتها قبل إستعمال الماء، تحتوي هذه النشرة على معلومات

موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك إسفلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصفت هذا الدواء للعلاج من أجله، لا تعطيه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى وإن بدأوا

أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

إن الدواء غير مخصص عادة للرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

(١) لأى غرض مخصص الدواء؟

• الدواء مُسهل ومحضن للتخفيف من الإمساك.

الفضيلة العلاجية: من المُسهلات.

(٢) قبل إستعمال الدواء:

☒ لا يجوز استعمال الدواء:

• إذا كنت حساساً (أيجي) للمادة الفعالة (أصفر فينولفاتلين) أو لأحد مركبات

الدواء الأخرى.

• في حالة إنسداد الأمعاء أو قلة نشاط الأمعاء المزمن.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• تحذير! قد يؤدي الإستعمال المطول إلى التعلق بالمستحضرات المُسهلة مثل هذا المستحضر وحدث إسهالات.

☒ لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال دون عمر ١٢ سنة بدون إستشارة طبيب.

• هذا المستحضر مخصص فقط للإمساك الذي يستمر لعدة أيام، قلة نشاط الأمعاء

ليوم أو يومين لا يبرر إستعماله. كذلك، لا يجوز إستعماله لأهداف أخرى مثل «تنظيف

الجسم» وما شابه.

(٣) قبل العلاج بـإيزيلاكس إحكام للطبيب إذا:

• كنت في فترة الحمل أو مرحلة.

• كنت تعاني أو عانيت في الماضي من خلل في وظيفة القلب أو الكلية، من الم شديد في

البطين، من السكري، من نزف في فتحة الشر، من علامات لارتفاع الراية الدودية

(مثل الم في البطين، شتان ونقيوات غير مشخصة).

• كنت حساساً لأي طعام أو لأى دواء.

☒ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، دواء آخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة

طبية وأضافاته ذاتية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو

الصيدلي بالأخضر إذا كنت تتناول:

• أدوية سهلة أخرى.

• مضادات حموضة.

(٤) الحمل والرضاع:

لا توجد شواهد على أن إستعمال إيزيلاكس أقراص يسبب الضرر خلال فترة الحمل

أو الإرضاع، ولكن، على غرار الأدوية الأخرى، لا يجوز تناول إيزيلاكس أقراص خلال

الأشباب الـ ١٢ الأولى من الحمل، إذا كنت في فترة الحمل أو مرحلة يجب إستشارة

الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الأدوية.

(٥) السياقة واستعمال المركبات:

لا يعرف من أي تأثير للدواء على القيام بهذه النشاطات.

(٦) كيفية إستعمال الدواء؟

• يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الإستیصال من الطبيب أو

الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية

الاعتيادية عادة هي:

للكبار والأطفال فوق عمر ١٢ سنة: نصف قرص حتى قرص ونصف قبل النوم.

لا يوصى بإستعمال هذا الدواء للأطفال دون عمر ١٢ سنة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

• يجب البلع مع ماء، حليب أو عصير.

• يمكن شطر أو سحق الأقراص مباشرة قبل بلعها.

١٠١
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٥
١٠٦
١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١

- لا يجوز تخزين أقراص مجذدة أو مسحوبة.
- يجب الانتظار فترة ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول أدوية أخرى عن طريق الفم.
- يدخل المستحضر عادة خلال ٨-٤ ساعات، ولكن يتطلب أحياناً وقت أطول (٣ أيام).

إذا لم يطرأ تحسن على حالتك خلال أسبوع يجب مراجعة الطبيب.

لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات قمارية أو فقرة ملوكية بدون إستشارة الطبيب. إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا باع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر عليه الدواء ملوك. جرعة دوائية مفرطة قد تسبب الإسهال مع فقدان سوائل وشوارد كهربائية، خاصة البروتاسيوم. يجب معالجة هذه الاعراض من المحظوظ أن تتطور حالة طيبة لا يؤدي فيها الفم وطفنه.

إذا نسيت تناول الدواء إنترفول حتى مساء اليوم التالي وتناول الجرعة الدوائية التالية في موعدها، لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتغويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

يجب المراقبة على العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

• لا تتناول الأدوية في اللعنة؛ يجب تشخيص طابع الداء والتاكيد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك إصابة حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

(٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن إستعمال إيزيلاكس أقراص قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدشن من قائمة الأعراض الجانبية، من الجائز انتهاي أي منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب إذا كنت تعاني:

- من آلام أو شنجات في البطن.
- من مشاكل قلبية.
- من مشاكل في التنفس.

• من علامات فقدان الشوارد الكهربائية (إرهاق أو ضعف، نظم قلب متزايد، ارتباك)، قد تظهر هذه العلامات جراء جرعة دوائية مفرطة.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

(٥) كيفية تخزين الدواء؟

• يجب التنسيم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي

ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضيع وذلك لنقاوم أصابعهم بالتسنم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إقصاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على

ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين درجة حرارة الغرفة، حتى ٢٥ درجة مئوية.

• لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو في النفايات. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص

من الأدوية التي لم تعد فيد لاستعمال. تساعد هذه الوسائل في المفاظ على البيئة.

(٦) معلومات إضافية:

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضًا:

Magnesium Carbonate, Powdered Agar, Docusate Sodium, Strong

Ginger Tincture, Povidone, Magnesium Stearate, Pigment Blend,

Chocolate Flavour, Saccharin Sodium, Methylparaben.

يحتوى كل قرص على نحو ٥,٥ ملء صوري.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

تحتوي العلبة على قنفية وقبة ٢٠٢ قرصاً بلون بني.

صاحب الإبتلاء، المنتج وعنوانه:

سام - أول مرض، شارع هاغافردا، بات. يام.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

٢٥ ٨ ٢٢٤٧

اقرر وزاراة الصحة صيغة هذه النشرة ومحظوها فحص ورخص في ٢٠١٤

من أجل سهولة وفهم القراءة، تحت مساغة هذه النشرة بصيغة المذكرة على الرغم

من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.