

فولكس ٤٠٠ أقراص

التركيب: المواد الفعالة:
كل قرص يحتوي على:

Ferrous Iron (as ferrous fumarate) 100 mg
Folic Acid 400 mcg

المواد غير الفعالة: Lactose, Ascorbic Acid, Povidone, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Sodium Bicarbonate, Opadry OY-29020, Talc, Titanium Dioxide, Red Lake No. 3

المجموعات العلاجية: فيتامينات ومعدن.

التاثيرات الطبية:

هذا الدواء مخصوص لمنع وعلاج نقص الحديد وحمض الفوليك لدى النساء غير الحوامل، لدى النساء الحوامل والمرضعات، ولدى الرجال.

متى لا يجوز لك استعمال المستحضر؟

لا يجوز استعمال المستحضر إذا وجدت حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز استعمال المستحضر إذا كنت تعاني/ن من إنسداد في الأمعاء أو من نسبة عالية للحديد. لا يجوز استعمال هذا الدواء في حالات أخرى من فقر الدم غير مترافقه بنقص الحديد كفقر الدم الإنحلالي.
لا يجوز الاستعمال لدى مرضى يعانون من الصياغ الدموي - إمتصاص زائد للحديد وتذريته في أنسجة في الجسم، أو الدم الحديدي - ترسب زائد للحديد في الجسم.
لا يجوز الاستعمال لدى مرضى يقللون الحديد عن طريق الوريد.

لا يجوز استعمال هذا الدواء قبل مرحلة الطبيب مقدماً في الحالات التالية:
عندما تكونين في فترة الحمل أو في فترة الرضاعة (من أجل ملائمة الجرعة الدوائية) و/أو إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز الهضمي (كالقرحة أو إلتهاب في الأمعاء)، الكلى، الأكلن /المسالك البولية، جهاز الدم (مثل فقر الدم الخبيث أو البيرفيري) وإذا كنت تتلقى/ن نقل مد تكرر/ن تناوله.

تحذيرات: يجب إبعاد المستحضر عن متناول أيدي الأطفال، من أجل منع خطورة التسمم بجرعة مفرطة من الحديد. التسمم لدى الأطفال دون عمر ٦ سنوات هو خطير بشكل خاص. إذا بلغ الطفل أقراص الحديد يجب التوجه إلى المستشفى دون تأخير. يحتوي المستحضر على الكتون الذي قد يسبب الضرر للأشخاص الحساسين له.

لا يجوز لك استعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون إشتارة الطبيب. يجب اجراء الفحوص الطبية أثناء فتره تناول هذا الدواء للدم.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك ل الطعام أو عقاقير قبل استعمالك للدواء.

التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تعاني/ن من دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفاديه الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير خاصة، الأدوية التي تنتهي إلى المجموعات التالية: مستحضرات تحتوي على الحديد، المضادات الحيوية من فصيلة التتراسيكلين المتناولة عن طريق الفم، بيسيلين، كلورامfenيكول. إن إمتصاص أملاح الحديد يخفيض ندماً يتم تناولها مع مضادات المجموعة، أملاح التوتية، بنسيلامين أو كوليستيرامين (لتحفيض الكوليسترول). إن وجود أملاح الحديد

يعرق من إمتصاص أملاح التوتية، سيفروكسيسين، ميتيل دوبا (اضغط الدم)، فيتامين E، إن شرب كييات كبيرة من الشاي تمنع إمتصاص الحديد.

الأعراض الجانبية: أضفاف إلى التاثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة استعمال بعض الأعراض الجانبية، مثل: أمساك، غثيان، ألام البطن. تزول هذه الأعراض ذاتاً خلال فترة تصيرها بعد أن يتعدى الجسم على المستحضر، أما إذا استمرت الأعراض، يجب مراجعة الطبيب. قد يسبب هذا الدواء تغيراً في لون البراز ليصبح داكناً أو أسود. ليس لهذا التغير أي أهمية سريرة.

الأعراض الجانبية الأخرى: تقيضي اهتماماً خاصاً، عند ظهور ألام شديدة في البطن، تقيض، فحص جلدي مع تهيجات، تقيض نفس (نار)، توقف/اي عن العلاج وراجح/ي الطبيب حالاً، أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ اي تغيير على شعورك العام، عليك عند ذلك مراعاة الطبيب حالاً.

الجرعة الدوائية الإعتيادية في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:
أثناء الحمل: قرص واحد في اليوم، يومي بالاستمرار حتى ٣ أشهر بعد الولادة.
فقر الدم نتيجة نقص الحديد: قرص واحد في اليوم.
لا تتجاوزوا/ي الجرعة الموصي بها.
هذا الدواء غير مخصص للاستخدام عادة لدى الرضع والأطفال دون عمر ١٢ سنة.

انتهاء/ اي

يجب الانتظار فترة ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وبين تناول الكاس، والمكونات التالية (باليكعك): مضادات المجموعة، الحليب ومنتجاته، إضافات الكاس، الكحول، الشاي، القهوة، البيض، السبانخ، الخبز من القمح الكامل، الحبوب، الطعام الذي يحتوي على ألياف غذائية، كوبينولونات، تتراسيكلينات (الثلوث)، أدوية لعلاج فرط الكالسيوم (إيتيدروتونات).

ارشادات الاستعمال:

يجب تناول الدواء ساعتين بعدوجبة الطعام أو ساعة قبلها مع كأس من الماء. فإذا

أيضاً أعراض جانبية في الجهاز الهضمي يجب تناول الدواء مع أو بعدوجبة الطعام.

كيف تستخلص/ين أن تساهم/ي في نجاح العلاج؟
أ يجب إكمال العلاج الموصي به من قبل الطبيب. لا تترافق/ي عن استعمال هذا الدواء بدون تعليمات من الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

تحسن/ي التحسن/ي يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال / أو الرضيع، وذلك لتفادي اصطياده بالتسهيل.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو اذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه الى المستشفى حالاً مصطحبها/ة عبوة الدواء.

لا تنسى/ي التحقق/ي بدوره تعليمات طابع الدواء والتاكيد من الجرعة الدوائية.

في كل مرة تتناول/ين فيها دواء، ضع/ي التفاتات الطبية اذا لزم الامر ذلك.

التخزين: يجب حفظ الدواء دون ٢٥ درجة مئوية.

تفريح الأمامية صالحة لفترات محددة فقط، حتى ولو ظلت في عليتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن، الرجاء ملاحظة تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الذي تدونه على العبوة، في حالة الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أمدية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٤٢٤٠٢٣٠٨٢.

انته من قبل سام -أون- م.ض، شارع ماعاقوبا ٢٥، بات - يام من أجل مختبرات رامام -ض، /ص.ب. ٤٠٠٣، القدس ٩١٠٠٣.

أقرت وزارة الصحة صحة هذه النشرة ومحتواها لجنة ورخص من قبلها في

كانون الثاني ٢٠١٠