

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

اقرأ/ي النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص من قبلها

فوريك حمل

أقراص

التركيب:

كل قرص يحتوي على: Ferrous Iron (as ferrous fumarate) 100 mg
Folic Acid 400 mcg

المواد غير الفعالة:

Lactose, Ascorbic Acid, Povidone, Microcrystalline Cellulose,
Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Sodium
Bicarbonate, Opadry OY-29020, Talc, Titanium Dioxide, Red
Lake No 3.

دواعي الإستعمال:

هذا الدواء مخصص للوقاية ولعلاج فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد وكذلك للمحافظة على نسبة حمض الفولي خاصة في فترة الحمل.

متى لا يجوز لك إستعمال المستحضر؟

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء إذا وجدت لديك حساسية لأحد مركباته.
لا يجوز إستعمال هذا الدواء في حالات فقر الدم الأخرى التي لا يرافقها نقص الحديد كما هو الحال في فقر الدم الإنحلالي.

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء قبل مراجعة الطبيب مقدماً:

عندما تكونين في فترة الحمل.

إذا كنت تعاني/ن أو إذا عانيت في الماضي من خلل في وظيفة الجهاز الهضمي (كالقرحة)، جهاز الدم (كفقر الدم الخبيث)، پورفيريا ولى المرضى الذين يتلقون الدم بشكل متكرر بالتسريب الوريدي.

تحذيرات:

لا يجوز لك إستعمال هذا الدواء في فترات متقاربة أو لفترة طويلة بدون إستشارة الطبيب.

يجب إجراء الفحوص الطبية أثناء فترة تناول هذا الدواء للدم.

يجب إبلاغ الطبيب عن أي حساسية لديك لطعام أو عقاقير خاصة للحديد وحمض الفولي قبل إستعمالك للدواء.

يجب إبلاغ الطبيب إذا لم يتحول لون البراز إلى الاسود أثناء فترة تناول هذا الدواء.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتعاطى/ن دواءً إضافياً أو إذا أنهيت العلاج الآن بدواء آخر، فيجب إعلام الطبيب المعالج، وذلك لتفادي الأخطار أو عدم النجاعة الناتجة عن التفاعلات بين العقاقير.

الأعراض الجانبية:

إضافة إلى التأثيرات الطبية المرغوبة للدواء، فقد تظهر أثناء فترة إستعماله بعض الأعراض الجانبية كالإمساك، إسهال، غثيان وتقيؤ.

الأعراض الجانبية التي تقتضي إهتماماً خاصاً:

آلام شديدة في البطن، ردود فعل البرجية: طفح جلدي مع تهيج، ضيق في التنفس (نادراً): توقف/ي عن العلاج وراجع/ي الطبيب.

أما إذا ظهرت لديك أعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ أي تغيير على شعورك العام، عليك عندئذ مراجعة الطبيب حالاً.

قد يسبب هذا الدواء تغييراً في لون البراز وأعراض كهذه لا تدعو إلى القلق.

الجرعة الدوائية:

الجرعة الدوائية الموصى بها في حالة عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:

لمعالجة فقر الدم:

١ - ٣ أقراص في اليوم.

للقاية من فقر الدم وللمحافظة على نسبة الحمض الفولي:

قرص واحد في اليوم.

لا تتجاوز/ي الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للإستعمال عادة لدى الرضع والأطفال دون عمر ٦ سنين.

إنتبه/ي!

لا يجوز تناول الدواء مع الشاي، القهوة أو البيض.

يجب الإنتظار ساعتين على الأقل بين تناول هذا الدواء وتناول الأدوية المضادة للحموضة، الحليب ومنتجاته، أو التتراسيكلينات (مضادات حيوية).

إرشادات الإستعمال:

بالإمكان شطر القرص إلى نصفين أو سحقه حالاً قبل ابتلاعه.

لا يجوز تخزين أقراص مشطوبة أو مسحوقة.

يلعب الدواء مع كأس من الماء.

يجب تناول هذا الدواء بعد وجبة الطعام.

تجنب/ي التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.

إذا أفرطت في تناول الجرعة الدوائية أو إذا بلغ الطفل/ة خطأ من هذا الدواء، عليك التوجه إلى المستشفى حالاً مصطحباً/ة عبوة الدواء.

لا تسبب/ي التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا تتناول/ي الدواء في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول/ين فيها دواء.

ضع/ي النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

التخزين: يجب حفظ الدواء في مكان بارد.

أغلق/ي العبوة بإحكام لمنع نفاذ الهواء والرطوبة إليها.

تبقى الأدوية صالحة لفترات محدودة فقط، حتى ولو ظلت في عبوتها الأصلية وتم حفظها بموجب تعليمات الخزن. الرجاء ملاحظة تاريخ إنتهاء صلاحية المستحضر المدونة على العبوة. في حالة الشك؛ عليك إستشارة الصيدلي الذي صرف لك هذا الدواء.

لا يجوز تخزين أدوية مختلفة في نفس العبوة.

رقم سجل الدواء: ١٢٥٢٤٣٠٤٧٨

المنتج:

سام- أون م.ض.، شارع هاعابودا ٢٥، بات - يام.

101080095/02