

## עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

קרא/י בעיון את העלון עד סופו  
בטרם תשתמש/י בתרופה  
פורמט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכנו נבדק ואושר על-ידו

## פוריק הריון

טבליות

### הרכב:

כל טבליה מכילה:

Ferrous Iron (as ferrous fumarate) 100 mg  
Folic Acid 400 mcg

### חומרים בלתי פעילים:

Lactose, Ascorbic Acid, Povidone, Microcrystalline Cellulose,  
Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Sodium  
Bicarbonate, Opadry OY-29020, Talc, Titanium Dioxide, Red  
Lake No 3.

### התוויות:

התרופה מיועדת למניעה ולטיפול באנמיה מחוסר ברזל ולשמירה  
על רמת חומצה פולית במיוחד בהריון.

### מתי אין להשתמש בתכשיר?

אין להשתמש אם ידועה לך רגישות לאחד ממרכיבי התרופה.  
אין להשתמש בתרופה זו במצבי אנמיה אחרים שאינם מלווים  
בחוסר ברזל כגון: אנמיה המוליטית.

### אין להשתמש בתרופה מבלי להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול:

אם הינך בהריון.  
אם הינך סובל/ת או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד: מערכת העיכול  
(כגון אולקוס), מערכת הדם [כגון אנמיה ממאירה (חוסר דם  
אובדיני)], מפורפריה ובחולים המקבלים עירוי דם חוזרים.

### אזהרות:

אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או תקופה ממושכת  
בלי להיוועץ ברופא.  
בתקופת הטיפול בתרופה זו יש לערוך בדיקות דם.  
אם הינך רגישה/ה למזון כלשהו או לתרופה כלשהי ובמיוחד לברזל  
ולחומצה פולית, עליך להודיע על-כך לרופא לפני נטילת התרופה.  
אם הינך נוטל/ת תרופה זו והצואה לא נהפכת לשחורה, עליך  
לפנות לרופא.

### תגובות בין-תרופתיות:

אם הינך נוטל/ת תרופה נוספת, או אם גמרת זה עתה טיפול  
בתרופה אחרת, עליך לדווח לרופא המטפל כדי למנוע סיכונים  
או אי-יעילות הנובעים מתגובות בין-תרופתיות.

### תופעות לוואי:

בנוסף לפעילות הרצויה של התרופה, בזמן השימוש בה עלולות  
להופיע השפעות לוואי, כגון: עצירות, שלשול, בחילה והקאות.

### תופעות לוואי המחייבות התייחסות מיוחדת:

כאבי בטן עזים, תגובה אלרגית: פריחה בעור עם גירויים, קוצר  
נשימה (נדיר): הפסקי/י הטיפול ופנה/י לרופא.  
בכל מקרה שבו הינך מרגישה/ה תופעות לוואי שלא צוינו בעלון  
זה, או אם חל שינוי בהרגשתך הכללית עליך להתייעץ עם הרופא  
מיד.  
תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה. בשינוי זה אין מקום  
לדאגה.

### מינון:

בהעדר הוראה אחרת מהרופא המינון המומלץ הוא:  
טיפול באנמיה: 3-1 טבליות ליום.  
למניעת אנמיה ולשמירה על רמת חומצה פולית: טבליה 1 ליום.  
אין לעבור על המנה המומלצת.  
תרופה זו אינה מיועדת בדרך-כלל לתינוקות ולילדים מתחת לגיל  
6 שנים.

### שימי לב:

אין ליטול תרופה זו עם תה, קפה או ביצים.  
יש לחכות פרק זמן של שעותיים לפחות בין נטילת תרופה זו  
לבין נטילת סותרים חומצה, חלב ומוצריו או סטראציקלינים  
(אנטיביוטיקה).

**אופן השימוש:** ניתן לחצות או לכתוש את הטבליות מיד לפני  
בליעתן. אין לאחסן טבליות חצויות או כתושות. בלוע את התרופה  
עם כוס מים. יש ליטול את התרופה אחרי ארוחה.

### מנע/י הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג  
ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע/י הרעלה. אם נטלת  
מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה/י מיד לחדר  
מיון של בית-חולים והבא/י אריזת התרופה איתך.  
אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!  
אין ליטול תרופות בחושר! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם  
שהינך נוטל/ת תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק/ה  
להם.

**אחסנה:** לשמור במקום קריר, סגור/י היטב ומנע/י חדירת אוויר  
ורטיבות.  
גם לפי תנאי האריזה/האחסנה המומלצים, תרופות נשמרות  
לתקופה מוגבלת בלבד. נא לשים לב לתאריך התפוגה של  
התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברופא שסיפק לך  
את התרופה.  
אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

**מס' רישום התרופה:** 1253430478

**יצרן:** סם-און בע"מ, רח' העבודה 25, בת-ים.

101080095/02

